专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024福建省湖里区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题及参考答案（轻巧夺冠）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.某患者需要注射维生素B

A：3/2支

B：1支

C：3/4支

D：1/2支

答案：D

2.患者,男,59岁,高血压病史5年,因头痛伴有恶心、呕吐就诊,MRI检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛,早期宜选用的药物()

A：缬沙坦

B：尼莫地平

C：氨氯地平

D：硝苯地平

答案：B

3.痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

A：别嘌醇

B：秋水仙碱

C：丙磺舒

D：阿司匹林

答案：C

4.心衰导致药物经肾排泄减少

A: 肾小管分泌减少

B: 肾血流量减少

C: 肾小管重吸收增加

D: 肾小球滤过减少

答案：B

5.百日咳、结核病、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎、传染性肝炎，可呈现

A: 血小板减少

B: 红细胞计数减少

C: 白细胞增多

D: 淋巴细胞增多

答案：D

6.下列药物中，驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

A: 金刚烷胺

B: 氟桂利嗪

C: 双氯芬酸

D: 哌替啶

答案：D

7.非磺酰脲类促胰岛素分泌剂

A: 罗格列酮

B: 格列吡嗪

C: 瑞格列奈

D: 伏格列波糖

答案：C

8.患者，女，48岁，身高158cm，体重72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清TSH水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

A: FT3下降、FT4升高

B: FT3升高、FT4下降

C: FT3、FT4下降

D: FT3、FT4升高

答案：C

9.（2018年真题）患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A: 立刻舌下含服硝酸甘油片

B: 立刻服用美托洛尔片

C: 立刻喝白开水200mL

D: 立刻口服糖水或糖块

答案：D

10.速效胰岛素的作用峰时为()。

A: 0.25～0.5小时

B: 0.6～1.5小时

C: 6～12小时

D: 1.5～4小时

答案：B

11.属于X级的药物是

A: 沙利度胺

B: 葡萄糖

C: 万古霉素

D: 阿莫西林

答案：A

12.雷洛昔芬能有效地抑制破骨细胞活性，降低骨转换至妇女绝经前水平，其正确的用法与用量是

A: 60mg，bid

B: 60mg，q4h

C: 60mg，qd

D: 60mg，tid

答案：C

13.在治疗蛔虫病的药物中，可能引起"蛔虫游走而口吐蛔虫"的是

A: 噻嘧啶

B: 甲苯咪唑

C: 三苯双脒

D: 枸橼酸哌嗪

答案：B

14.贫血患者常出现()

A: 嗜酸性粒细胞增多

B: 中性粒细胞增多

C: 血红蛋白减少

D: 血小板计数增多

答案：C

15.可减弱华法林抗凝作用的食物有

A：葡萄柚

B：韭菜

C：洋葱

D：大蒜

答案：B

16.饮食对粪外观的影响,食绿叶菜

A：酱色

B：红色

C：黑褐色

D：暗绿色

答案：D

17.属于 β 受体激动剂的是

A：美托洛尔

B：福莫特罗

C：乙酰胆碱

D：异丙托溴铵

答案：B

18.冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌症，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

A：25～50mg/d?

B：25～75mg/d?

C：150～300mg/d?

D: 75～150mg/d?

答案：D

19.杨某，男性，25岁，间断上腹痛2年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

A: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂?

B: PPI+克拉霉素+呋喃唑酮?

C: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁?

D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂?

答案：D

20.营养性巨幼细胞性贫血主要因为缺乏

A: 白细胞

B: 叶酸和(或)维生素B

C: 维生素C

D: 鞣酸

答案：B

21.属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是

A: 利托那韦

B: 依非韦伦

C: 利巴韦林

D: 齐多夫定

答案：B

22.（2016年真题）患者，男，70岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）。

A: 肝素
B: 阿司匹林
C: 氯吡格雷
D: 利伐沙班
答案：B

23.常用抗消化性溃疡药的合理应用应于早餐前30分钟服用的是（）
A: 质子泵抑制剂
B: 瑞巴派特
C: 吉法酯
D: 替普瑞酮
答案：A

24.以下抗生素中，最适宜小儿使用的是
A: 青霉素
B: 链霉素
C: 氯霉素
D: 米诺环素
答案：A

25.属于核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂的是
A: 恩夫韦替
B: 沙奎那韦
C: 奈韦拉平
D: 扎西他滨
答案：D

26.可治疗原发性痛经的药物是

A: 钙通道阻滞剂

B: 肾上腺糖皮质激素

C: 非甾体抗炎药

D: 前列腺素类似物

答案：C

27.敏感化作用的配伍用药是

A: 纳洛酮用于解救吗啡中毒

B: 应用地高辛与氢氯噻嗪

C: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性

D: 阿托品联用吗啡镇痛

答案：B

28.不能用于前列腺增生症治疗的药物是

A: 雄激素

B: a1受体阻断剂

C: 5-a还原酶抑制剂

D: 雄激素受体阻断剂

答案：A

29.用药期间饮酒可能出现“双硫仑样反应”的药物是（）

A: 头孢哌酮

B: 美罗培南

C: 克拉霉素

D: 万古霉素

答案：A

30.用量大时，会出现中毒症状，呼吸快而浅，血压上升等，严重时会因呼吸麻痹而死亡

A：蛋白同化激素

B：精神刺激剂

C：β-受体阻断剂

D：利尿剂

答案：B

31.容易缩短凝血酶原时间的药物是

A：普通肝素

B：口服避孕药

C：华法林

D：利伐沙班

答案：B

32.杨某，女，19岁，淋雨受凉后咳嗽、咯脓性痰并伴有胸痛，体温39℃，听诊肺部有湿啰音。WBC12×109／L。该患者对青霉素过敏。

A：左氧氟沙星

B：青霉素G

C：链霉素

D：利福霉素

答案：A

33.下述“药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的”中，不正确的是

A：减少病死率

B：缓解呼吸道症状

C：预防疾病进展

D：排痰化痰

答案：D

34.患者，女，22岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛1天就诊。查体：体温38.6℃，脉搏90次/分，呼吸24次/分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC11×109/L，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后2天，体温恢复正常，咳痰减少。

A: 副流感病毒

B: 铜绿假单胞菌

C: 鲍曼不动杆菌

D: 肺炎链球菌

答案：D

35.能诱发真菌或病毒感染、延缓创伤愈合、升高眼压和导致晶状体浑浊等风险，因此不应随意使用，除非患者是在眼病专科医师的密切监护下使用的结膜炎治疗药物是

A: 醋酸氢化可的松滴眼液

B: 碘苷滴眼液

C: 酞丁安滴眼液

D: 利福平滴眼液

答案：A

36.（2021年真题）关于儿童药动学和药效学特点的说法，错误的是（）

A: 儿重血脑界跑不完着，多种药物均能通过，有可能引发不良反应

B: 和成人相比，婴儿胃液PH低,对酸不稳定的药物易被破

C: 婴幼儿血浆白蛋白与药物的结合能力低于成人，血中游离药物浓度较高

D: 儿重内分泌系统不够稳定，长期使用糠皮质激表易导致发育迟缓

答案：B

37.女性，32岁，3年来月经量多，乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞7×10

A: 再生障碍性贫血

B: 溶血性贫血

C: 缺铁性贫血

D: 巨幼红细胞性贫血

答案：C

38.治疗过敏性结膜炎可选用的药物是()

A: 羟甲基纤维素钠滴眼液

B: 色甘酸钠滴眼液

C: 酞丁安滴眼液

D: 氧氟沙星滴眼液

答案：B

39.作用于有丝分裂M期，干扰微管合成的药物为

A: 丝裂霉素

B: 替尼泊苷

C: 紫杉醇

D: 卡培他滨

答案：C

40.实施"用药列表"，能有效地

A: 提高用药顺应性

B: 转变疾病预防和保健观念

C: 健康生活方式的教育

D: 识别及管理多重用药

答案：D

41.（2018年真题）患者,女,30岁,既往体健,无癫痫病史怀孕8个月,突然出现抽搐,从小腹开始,发展至全身,口唇发绀,意识丧失,诊断为子痫,应选用的治疗方法是（）

A: 5%氯化钙注射液静脉滴注

B: 50%葡萄糖注射液湿敷

C: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射

D: 50%硫酸镁溶液口服

答案：C

42.发现严重滥用药品的处方，应该

A: 拒绝调配处方

B: 调配处方并发药

C: 拒绝调配处方，依照有关规定报告

D: 依照处方调配药品

答案：C

43.某女性，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30次/分，Bp108次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 硝普钠

B: 多索茶碱

C: 硝苯地平

D: 西地兰

答案：D

44.治疗社区获得性肺炎时，由于我国的肺炎链球菌对其耐药率高，不单独使用的药物为

A：头孢唑林

B：青霉素

C：红霉素

D：莫西沙星

答案：C

45.患者,女,45岁,6个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁,在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗,症状控制较好,近3个月服用西咪替丁,患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱,该患者各地求医,服用各种药物,具体药物品种不详。围绕该病例,医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A：苯巴比妥

B：地西泮

C：卡马西平

D：丙戊酸钠

答案：D

46.依据规定，医师必须单独开具处方的药物是

A：中药饮片

B：生物制剂

C：中成药

D：化学药品

答案：A

47.可干扰乙醇代谢过程，导致双硫仑样反应的药物是

A：氟康唑

B：酮康唑

C：咪康唑

D：甲硝唑

答案：D

48.有关氰化物中毒的解救措施，错误的是

A：使用活性炭吸附

B：注射硫代硫酸钠

C：给予亚硝酸异戊酯吸入

D：注射亚硝酸钠

答案：A

49.降钙素属于

A：骨形成刺激剂

B：促进骨矿化剂

C：骨吸收抑制剂

D：激素替代剂

答案：C

50.以下所列药品中，进餐时服用可减少脂肪吸收的药品是

A：吉非贝齐

B：奥利司他（减肥药）

C：阿昔莫司

D：苯扎贝特

答案：B

51.口服氨苄西林吸收率比成人高1倍，即

A：药物中毒

B：药物吸收

C：药物代谢

D：药物分布

答案：B

52.口服补液盐(氯化钠3．5g、碳酸氢钠2．5g和葡萄糖20g，加水至1000ml)用于中度脱水腹泻病人，成人给予3400ml。问给予体重10kg的患儿口服补液盐多少克，应配制成多少毫升

A：22.19，850ml

B：20.89，800ml

C：24.79，950ml

D：12.69，485ml

答案：D

53.属于药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径的是

A：参与健康教育

B：处方调剂

C：药物信息服务

D：治疗药物监测

答案：D

54.下列药物中，药师需要提示患者随身携带的是

A：胰酶肠溶胶囊

B：甲硝唑片

C：高锰酸钾片

D：硝酸甘油片

答案：D

55.含有右美沙芬的抗感冒药禁用于

A：妊娠初期及哺乳期妇女

B：疲劳和生活规律紊乱者

C：患有心脏病、高血压、甲状腺功能亢进、青光眼、前列腺增生的患者

D：有血小板减少症、有出血倾向者、上消化道出血和(或)穿孔病史者

答案：A

56.（2019年真题）患者，男，78岁，因心房颤动服用华法林治疗2年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后INR升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是

A：氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高

B：氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高

C：氟康唑可抑制CYP2C9，导致华法林血药浓度升高

D：氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高

答案：C

57.患者，男，42岁，因“高热持续不退、盗汗、咳嗽、咳痰、咯血”就诊，经胸部CT、结核菌核酸检测，初步诊断为“肺结核”收入医院治疗。患者服用布洛芬并未缓解高热症状，在联合使用抗结核药的前提下应给予患者

A：每日5mg泼尼松

B：每日20～30mg泼尼松

C：每日酚妥拉明10～20mg

D：每日垂体后叶素8～10U

答案：B

58.慢性非特异性结肠炎患者服用美沙拉秦期间应定期监测

A：肾功能

B：呼吸功能

C：脾功能

D：肝功能

答案：A

59.常用于碱化尿液，促进毒性药物排泄的是

A：磺胺醋酰

B：麻黄碱

C：碳酸氢钠

D：苯巴比妥

答案：C

60.处方后记项下包括

A：主要实验室数据

B：对药物治疗的建设性意见与结果评价

C：临床诊断、费别

D：医师签名、药品金额

答案：D

61.服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

A：餐后1h

B：餐前

C：餐后

D：餐前0.5～1h

答案：D

62.若需要70%的乙醇1000ml，现有95%的乙醇应如何配制

A：取263.2ml95%的乙醇，加1000ml水

B：取736.8ml95%的乙醇，加水稀释至1000ml

C：取263.2ml95%的乙醇，加水稀释至1000ml

D：取736.8ml95%的乙醇，加1000ml水

答案：B

63.服用磺胺甲噁唑时

A：禁吸烟

B：宜少饮水

C：忌用热水送服

D：宜多饮水

答案：D

64.（2018年真题）患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A：门冬胰岛素餐前30~60min,皮下注射,tid

B：甘精胰岛素睡前30min,皮下注射,qd

C：普通胰岛素餐前30min,皮下注射,qd

D：低精蛋白锌胰岛素餐前30min,皮下注射

答案：B

65.Ⅰ期新药临床试验样本数要求查看材料

A：常见病≥12000例

B: 20～30例

C: ≥300例

D: 主要病种≥300例

答案：B

66.前记

A: 临床诊断、费别

B: 主要实验室数据

C: 医师签名、药品金额

D: 对药物治疗的建设性意见与结果评价

答案：A

67.血清丙氨酸氨基转移酶正常参考区间是

A: 男性＜40U/L

B: 成人＜50U/L

C: 男性11～50U/L

D: 成人＜40U/L

答案：D

68.患者，男，53岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是

A: 甲氧氯普胺片

B: 干酵母片

C: 乳酶生片

D: 多潘立酮片

答案：B

69.评判为超常处方的是

A: 黄连素用于细菌性腹泻
B: 二甲双胍用于糖尿病人
C: 无适应证用药
D: 单张门急诊处方超过5种药品
答案：C

70.关于非甾体抗炎药的叙述正确是
A: 出现疼痛症状可首选非甾体抗炎药
B: 发热时可首选非甾体抗炎药
C: 非甾体抗炎药联合应用糖皮质激素类药物是造成胃肠道损害的危险因素
D: 使用非甾体抗炎药引起的肾功能不全发生率高于氨基糖苷类抗生素引起的肾功能不全
答案：C

71.下列选项中，关于老年人药动学方面的改变的叙述，错误的是()。
A: 肝微粒体酶系的活性降低，肝脏代谢药物能力下降，药物血浆半衰期延长
B: 肝细胞合成白蛋白的能力降低，某些易与血浆蛋白结合的药物游离型浓度增高
C: 脂肪组织增加而总体液及非脂肪组织减少，某些药物分布容积减小
D: 胃酸分泌减少，一些酸性药物解离减少，吸收增加
答案：D

72.口服可治疗肝豆状核变性病的是
A: 二巯丁二钠
B: 青霉胺
C: 二巯丙醇

D: 依地酸钙钠

答案：B

73.患者，男，72岁，因“冠心病、高血压、2型糖尿病”长期用药治疗，服用药物包括阿司匹林肠溶片、马来酸依那普利片、辛伐他汀片、富马酸比索洛尔片、盐酸二甲双胍缓释片、格列美脲片、硝酸甘油片。近日患者出现一些药物不良反应症状，前来药店咨询药师。

A: 阿司匹林

B: 辛伐他汀

C: 盐酸二甲双胍

D: 富马酸比索洛尔

答案：A

74.当药品存在安全隐患，需要进行召回时，决定召回药品的名称、规格、生产商、召回范围、召回级别、主要执行者等事宜的相关人员应该是

A: 质量部人员

B: 业务院长

C: 药品质量安全管理小组成员

D: 药剂科负责人

答案：C

75.患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3～5min，休息后减轻。入院检查：体温37．8℃，心率130次／分，血压80／40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: 非ST段抬高型心肌梗死

B：无症状型心肌缺血型

C：稳定型心绞痛

D：冠状动脉粥样硬化型心脏病

答案：A

76.所有病情稳定并无禁忌证的心功能不全患者一经诊断均应立即使用

A：卡托普利

B：地高辛

C：坎地沙坦

D：美托洛尔

答案：D

77.下列属于合理处方的是

A：患者，男，72岁，患有活动性胃溃疡，因心肌梗死给予阿司匹林肠溶片

B：患者，男，35岁，行皮下脂肪瘤切除术（Ⅰ类手术切口），开具头孢哌酮-舒巴坦预防感染

C：患者，女，40岁，咳嗽数日，经实验室检查示白细胞和C-反应蛋白均正常，开具阿奇霉素治疗

D：患者，女，75岁，身高155cm，体重77kg，高脂血症病史10年，因胃癌术后难以进食，给予脂肪乳静脉营养补液，给药期间密切关注血三酰甘油水平

答案：D

78.（2019年真题）患者，男，47岁，2型糖尿病史，饮食不规律，近期因口服降糖药疗效不佳欲改为三餐前即刻使用胰岛素或胰岛素类似物控制血糖，应选用的药物是

A：普通胰岛素

B: 门冬胰岛素

C: 低精蛋白锌胰岛素

D: 精蛋白锌胰岛素

答案：B

79.镇咳作用强度为可待因的1/3,咳嗽较弱者宜选用，同时可使痉挛的支气管平滑肌松弛，降低气道阻力的是

A: 可待因

B: 羧甲司坦

C: 喷托维林

D: 苯丙哌林

答案：C

80.一般情况下，以洗胃方式解救经口中毒的有效时间是

A: 中毒后2～4小时以内

B: 中毒后4～6小时以内

C: 毒物经口进入体内4～6小时以内

D: 中毒后6～8小时以内

答案：C

81.消化性溃疡的用药注意事项中，服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用PPI，需补充

A: 维生素D3

B: 维生素B12

C: 维生素E

D: 维生素C

答案：B

82.高血压治疗药物选择时,ACEI类药物禁用于()

A：痛风患者

B：双侧肾动脉狭窄患者

C：心力衰竭患者

D：胃溃疡患者

答案：B

83.关于药物作用相加或增加疗效的举例,磺胺甲噁唑(SMZ)抑制二氢叶酸合成酶，甲氧苄啶(TMP)抑制二氢叶酸还原酶，二者联用使细菌的叶酸代谢受到双重阻断，抗菌作用增强，是属于

A：促进机体的吸收利用

B：延缓或降低抗药性

C：保护药品免受破坏

D：作用于不同的靶位

答案：D

84.糖尿病患者应慎用的强效利尿剂是

A：呋塞米

B：阿米洛利

C：甘露醇

D：氢氯噻嗪

答案：A

85.病例系列研究试验结果属于循证医学证据级别的

A：3级证据

B：4级证据

C：1级证据

D: 2级证据

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/077053056046010024