

2024 年河北省怀安县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题真题附答案【名师推荐】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 降低夜间的眼压作用强，尤其用于其他降眼压药不能耐受的患者的药物是

- A: 溴莫尼定
- B: 毛果芸香碱
- C: 噻吗洛尔
- D: 拉坦前列素

答案：D

2. （2017 年真题）慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是（）

- A: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- B: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- C: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- D: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

答案：D

3. 引起发冷、寒战、面部和四肢发绀，继而发热等输液反应的 DMARDs 是

- A: 环孢素
- B: 利妥昔单抗
- C: 氯喹

D: 硫唑嘌呤

答案: B

4. 急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂

A: 二巯丁二钠

B: 纳洛酮

C: 谷胱甘肽

D: 乙酰半胱氨酸

答案: B

5. 通过拮抗 α 受体而用于前列腺增生症治疗的药物是

A: 黄酮哌酯

B: 非那雄胺

C: 特拉唑嗪

D: 前列康

答案: C

6. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响, 妊娠早期服用甲氨蝶呤

A: 导致新生儿血钙过高

B: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

C: 可能致胎儿畸形

D: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

答案: C

7. 适用于阿司匹林哮喘和伴有过敏性鼻炎哮喘患者预防和维护治疗的药物是

A: 沙丁胺醇气雾剂

B: 茶碱片

C: 孟鲁司特钠咀嚼片

D: 异丙托溴铵气雾剂

答案: C

8. 患者,男,62 岁,临床使用青蒿素和乙胺嘧啶联合治疗疟疾,产生的药物相互作用属于()

A: 敏感化作用,药品不良反应增加

B: 增加靶器官药物浓度,药品不良反应减少

C: 拮抗作用,药品不良反应增加

D: 降低抗药性,疗效增加

答案: D

9. 关于非甾体抗炎药的叙述正确的是

A: 非甾体抗炎药联合应用糖皮质激素类药物是造成胃肠道损害的危险因素

B: 发热时可首选非甾体抗炎药

C: 使用非甾体抗炎药引起的肾功能不全发生率高于氨基糖苷类抗生素引起的肾功能不全

D: 出现疼痛症状可首选非甾体抗炎药

答案: A

10. 妊娠期妇女治疗眼疾不宜应用的药品是

A: 硫酸锌滴眼剂

B: 酞丁安滴眼剂

C: 醋酸可的松滴眼剂

D: 利福平滴眼剂

答案: B

11. 用于前列腺增生症的高选择性 α_1A 受体阻断剂是 ()

- A: 索利那新
- B: 托特罗定
- C: 坦索罗辛
- D: 特拉唑嗪

答案: C

12. 患者到药店购买"扑尔敏片", 药师应给予 ()

- A: 氯苯那敏片
- B: 阿昔洛韦片
- C: 奥司他韦片
- D: 更昔洛韦片

答案: A

13. 具有变形运动和吞噬功能, 可吞噬抗原抗体复合物或细菌的细胞为

- A: 中性粒细胞
- B: 嗜碱性粒细胞
- C: 淋巴细胞
- D: 嗜酸性粒细胞

答案: D

14. 妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常, 其中最容易受到药物影响, 可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是

- A: 妊娠 3~12 周
- B: 妊娠 28~32 周
- C: 妊娠 13~27 周
- D: 妊娠 1~2 周

答案：A

15. 治疗苯二氮

- A: 催吐、洗胃、硫酸钠导泻
- B: 呼吸抑制时给氧，必要时做人工呼吸
- C: 血液透析和血液灌流疗法
- D: 血压下降时，选用升压药如去甲肾上腺素

答案：C

16. 患者，男，58 岁，高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 160mmHg，心率 75 次/分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 特拉唑嗪
- B: 双氯芬酸
- C: 氢氯噻嗪
- D: 普萘洛尔

答案：C

17. 下列应用强心苷类药物治疗心力衰竭患者心律失常的描述，哪一项是错误的

- A: 可使心房扑动转为心房纤颤
- B: 用于治疗心房扑动
- C: 用于治疗心房纤颤
- D: 用于治疗阵发性室上性心动过速

答案：D

18. (2015 年真题) 过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是 ()。

- A: 骨骼发育不良或骨软化
- B: 骨质疏松症或骨折
- C: 间质性肾炎或肾结石
- D: 横纹肌溶解或肌痛

答案: C

19. 对于铁剂的使用，正确的为

- A: 待血红蛋白恢复正常后，即可停止服用
- B: 口服铁剂宜选用 3 价铁
- C: 为迅速纠正患者贫血症状，初始治疗用大剂量
- D: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收

答案: D

20. 排钾利尿药使心脏对强心苷感受性增强的机制是

- A: 拮抗作用
- B: 减少不良反应
- C: 敏感化作用
- D: 协同作用

答案: C

21. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

- A: 精神刺激剂
- B: β 受体阻断剂
- C: 钙通道阻断剂
- D: 利尿剂

答案: C

22. (2015 年真题) 患者，男，体检发现血清尿素氮升高，血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最有可能患有 ()。

- A: 血液疾病
- B: 肾脏疾病
- C: 肝脏疾病
- D: 心脏疾病

答案：B

23. 可能影响儿童骨骼发育的药物是 ()

- A: 诺氟沙星
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 阿莫西林
- D: 头孢克洛

答案：A

24. 下列药物不良事件中，属于假、劣药品事件的是

- A: “万络(罗非昔布)事件”
- B: “拜斯亭(西立伐他汀)事件”
- C: “亮菌甲素事件”
- D: “康泰克 PPA 事件”

答案：C

25. 应报告药品引起的严重、罕见或新的不良反应的是

- A: 上市 5 年以内的药品
- B: 上市 3 年以内的药品
- C: 国家重点监测的药品
- D: 上市 5 年以上的药品

答案：D

26. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停
- B: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- C: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强
- D: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5h

答案：B

27. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 莫沙必利
- B: 多潘立酮
- C: 复合消化酶胶囊
- D: 胰酶片

答案：A

28. 慢性痛风和痛风性肾病为抑制尿酸生成可选用

- A: 泼尼松龙
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 苯溴马隆

答案：C

29. 使用前应用原药进行皮试的药物是

- A: 阿奇霉素片
- B: 左氧氟沙星片
- C: 注射用头孢曲松钠
- D: 注射用阿莫西林

答案：C

30. “制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都需要参考循证医学的研究结果”表明循证医学实践能够

- A: 改变降脂治疗观念
- B: 有助于个体化给药
- C: 列为医药卫生行政决策的依据
- D: 有利于诊断特殊疾患

答案：C

31. WHO 推荐 12 岁以下儿童碘的摄入范围是

- A: 30~100 $\mu\text{g}/\text{d}$
- B: 50~120 $\mu\text{g}/\text{d}$
- C: 50~100 $\mu\text{g}/\text{d}$
- D: 30~120 $\mu\text{g}/\text{d}$

答案：B

32. 治疗干眼症人工泪液合理的起始应用剂量是每只眼

- A: 三滴，一日 4 次
- B: 一滴，一日 2 次
- C: 二滴，一日 4 次
- D: 一滴，一日 4 次

答案：D

33. 阿昔洛韦用于肾功能不全患者应（）

- A: 在危及生命时方可使用
- B: 避免应用
- C: 减量使用
- D: 加量使用

答案：C

34. 按照药品不良反应程度分级标准评判, 症状明显, 重要器官或系统功能有中度损害, 应评判为

- A: 弱轻度
- B: 轻度
- C: 中度
- D: 重度

答案：C

35. (2015 年真题) 患者, 女, 44 岁, 半年前诊断为支气管哮喘, 间断口服沙丁胺醇 4mg tid 治疗。没有规律用药治疗。近日, 因秋冬季节交替, 出现明显喘憋, 话不成句, 被紧急送往医院。

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
- C: 沙丁胺醇片
- D: 福莫特罗吸入剂

答案：B

36. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L ，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7\times 10^9/\text{L}$ ，血小板 $120\times 10^9/\text{L}$ ，血清铁 $300\mu\text{g/L}$ 。

- A: 缺铁性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 巨幼细胞性贫血
- D: 溶血性贫血

答案：A

37. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

- A: 临床治疗方案
- B: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）
- C: 涂片、培养鉴定
- D: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）

答案：A

38. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 氯化钾
- B: 卡马西平
- C: 奥美拉唑
- D: 红霉素

答案：D

39. 下列抗感冒药中，归属于处方药的是

- A: 含金刚烷胺的复方制剂

B: 含伪麻黄碱的复方制剂

C: 对乙酰氨基酚片

D: 奥司他韦片

答案：D

40. (2017 年真题) 治疗急性腹泻可选用 ()

A: 莫沙必利

B: 聚乙醇 4000

C: 阿苯达唑

D: 双八面体蒙脱石散

答案：D

41. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

A: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止

B: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液

C: 若症状不能改善，及时加用诺氟沙星

D: 应给予少量、多次、清淡饮食

答案：C

42. 少数人用后可出现视力降低和辨色困难

A: 西咪替丁

B: 硝酸甘油

C: 金刚烷胺

D: 布洛芬

答案：D

43. (2018 年真题) 患者, 女, 67 岁, 有高血压病史, 右手抖动行走缓慢 4 年, 诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗, 症状一度好转后又反复加重, 随后采用加大复方左旋多巴剂量, 并加用苯海索。患者同时服用氨氯地平、缬沙坦等药物控制血压近日出现运动症状波动, 伴有异动症。导致该不良反应的药物是 ()

A: 苯海索

B: 左旋多巴

C: 氨氯地平

D: 苧丝肼

答案：B

44. 既无兴奋、镇静作用, 又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

A: 帕罗西汀

B: 阿米替林

C: 氟伏沙明

D: 丙咪嗪

答案：C

45. 患者, 男, 48 岁, 近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状, 就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

A: 刺激性干咳

B: 水电解质失衡

C: 心律失常

D: 二重感染

答案：A

46. 患者，男，34 岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物而致昏迷，送入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制。可选用的解救药物是

- A: 二巯丙醇
- B: 纳洛酮
- C: 亚甲蓝
- D: 维生素 K

答案：B

47. 患者，男，72 岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热 1 天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88 次 / 分，R22 次 / 分，BP112 / 77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A: 维生素 B6
- B: 右雷佐生
- C: 美司钠
- D: 苯海拉明

答案：D

48. 在配制静脉输液时，不宜用氯化钠注射液溶解的药品是

- A: 盐酸万古霉素
- B: 两性霉素 B
- C: 青霉素
- D: 维生素 K

答案：B

49. 对口腔黏膜有麻醉作用，产生麻木感，需整片吞服，不可咀嚼的镇咳药是

- A: 可待因
- B: 色甘酸钠
- C: 苯丙哌林
- D: 右美沙芬

答案：C

50. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予

- A: 有机硫类
- B: 间羟胺
- C: 地西泮
- D: 阿托品

答案：D

51. 能有效抑制肠道内胆固醇的吸收，禁用于妊娠期和哺乳期的是（）

- A: 普罗布考
- B: 他汀类
- C: 依折麦布
- D: 烟酸类

答案：C

52. 可待因属于

- A: 利尿剂
- B: β 受体阻断剂
- C: 麻醉药品
- D: 精神刺激剂

答案：C

53. 若需要 70%的乙醇 1000ml，现有 95%的乙醇应如何配制

- A: 取 263.2ml95%的乙醇，加水稀释至 1000ml
- B: 取 263.2ml95%的乙醇，加 1000ml 水
- C: 取 736.8ml95%的乙醇，加水稀释至 1000ml
- D: 取 736.8ml95%的乙醇，加 1000ml 水

答案：C

54. 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是

- A: 阿米替林
- B: 文拉法辛
- C: 吗氯贝胺
- D: 氟西汀

答案：C

55. (2017 年真题) 下列药物中适宜在睡前服用的是 ()

- A: 美洛昔康
- B: 多潘立酮
- C: 辛伐他汀
- D: 泼尼松

答案：C

56. “嗜酸性粒细胞增多”可能提示的疾病是

- A: 病毒感染性腹泻
- B: 铅、铋中毒
- C: 过敏性疾病如荨麻疹
- D: 感染性疾病如肺结核

答案：C

57. 为了减少胃黏膜刺激、适宜餐中服用的是

- A: 二甲双胍
- B: 维生素 C
- C: 多潘立酮
- D: 普伐他汀

答案：A

58. 以下治疗荨麻疹的抗过敏药中，属于过敏活性物质阻释剂的药物是

- A: 酮替芬
- B: 异丙嗪
- C: 赛庚啶
- D: 苯海拉明

答案：A

59. 当创伤应激严重时，由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

- A: NPC5: 5
- B: 150kcal:1gN
- C: NPC7:3
- D: 100kcal:1gN

答案：A

60. 用体重计算年长儿童的剂量时，一般应选择

- A: 剂量的 1/3
- B: 剂量的 1/2
- C: 剂量的上限
- D: 剂量的下限

答案：D

61. 长期应用苯二氮

- A: 戒断症状
- B: 毒性反应
- C: 后遗效应
- D: 首剂效应

答案：A

62. 维持心脏、神经及消化系统正常功能所必需，缺乏可出现脚气病的是

- A: 维生素 D
- B: 维生素 A
- C: 维生素 C
- D: 维生素 B1

答案：D

63. 胃食管反流病患者应避免使用的药物是

- A: 特拉唑嗪
- B: 美托洛尔
- C: 阿司匹林
- D: 阿仑膦酸钠

答案：D

64. 临终关怀是对于预期寿命少于几个月的慢性病终末期患者的一项特殊疗护项目

- A: 6
- B: 10
- C: 12

D: 5

答案: A

65. 维生素 B

A: 清晨

B: 餐前

C: 餐中

D: 餐后

答案: D

66. 患者，女性，62 岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

A: 3.0~4.0

B: 2.0~3.5

C: 2.0~3.0

D: 2.0~4.0

答案: C

67. 以下抗高血压药物中，属于利尿药的是

A: 缬沙坦

B: 维拉帕米

C: 氨氯地平

D: 氨苯蝶啶

答案: D

68. 患者，女，55 岁，因家庭变故，情绪低落，晨起后较严重，近三个月有自杀倾向就诊，诊断为抑郁症，患者既往有高血压、冠心病史 5 年，目前服用卡托普利片、硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙片。本次就诊，医师处方文拉法辛缓释片 150mgqdpo，谷维素片 10mg tidpo 治疗，患者用药后出现血压升高，可能导致该患者血压升高的药物是

- A: 卡托普利片
- B: 硝酸异山梨酯
- C: 文拉法辛缓释片
- D: 谷维素片

答案：C

69. 真性红细胞增多症

- A: 淋巴细胞增多
- B: 红细胞沉降率减慢
- C: 白细胞增多
- D: 白细胞减少

答案：B

70. 营养性巨幼细胞性贫血只要因为缺乏（）

- A: 叶酸和（或）维生素 B12
- B: 白细胞
- C: 鞣酸
- D: 维生素 C

答案：A

71. 单核细胞正常参考区间是

- A: 0.03~0.08
- B: 0~0.01

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 0.20~0.40

D: 0.005~0.05

答案: A

72. 菌群失调性腹泻常见的病因是

- A: 外界的各种刺激，如受寒、过食辛辣食物等
- B: 直肠或结肠溃疡、肿瘤或炎症
- C: 细菌、真菌、病毒、寄生虫感染
- D: 肠道正常细菌的数量或比例失去平衡

答案：D

73. 可导致体重增加的抗癫痫药是

- A: 苯妥英钠
- B: 卡马西平
- C: 丙戊酸钠
- D: 拉莫三嗪

答案：C

74. (2021 年真题) 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用
- B: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用
- C: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药
- D: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用

答案：D

75. 下列药学服务的对象中，不属于药学服务的特殊人群是

- A: 住院患者
- B: 特殊体质者

C: 小儿、老人

D: 血液透析者

答案: A

76. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

A: 急性肾盂肾炎

B: 急迫性尿失禁

C: 膀胱炎

D: 压力性尿失禁

答案: A

77. 妊娠早期妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

A: 辛伐他汀

B: 甲氨蝶呤

C: 苯妥英钠

D: 沙利度胺

答案: D

78. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

A: 伪麻黄碱

B: 右美沙芬

C: 苯海拉明

D: 愈创木酚甘油醚

答案: B

79. 感冒伴随咳嗽的临床表现是

- A: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰
- B: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血
- C: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月
- D: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

答案：D

80. 肝功能不全患者宜选用的药物是

- A: 肾毒性小、经肝代谢的药物
- B: 经肝肾双途径消除的药物
- C: 经肝肠循环消除的药物
- D: 肝毒性小、经肾代谢的药物

答案：D

81. 关于口腔溃疡药物治疗的说法，错误的是（）

- A: 补充复合维生素 B 和维生素 C 有利于促进溃疡面愈合
- B: 复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷，一日 3 次，稍加按摩。
- C: 氯己定如含漱液，每次 15-20ml，一日 2~3 次含漱
- D: 西地碘含片，一次 6mg 一日 4 次含服

答案：D

82. 最容易受光线影响而变质的药品是

- A: 抗生素胶囊剂
- B: 注射用抗生素
- C: 胰岛素制剂
- D: 氨基酸注射剂

答案：D

83. 服用磺胺甲噁唑不宜同食

- A: 葡萄柚汁
- B: 咖啡
- C: 高蛋白食物
- D: 食醋

答案：D

84. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 布洛芬
- B: 糖皮质激素
- C: 阿司匹林
- D: 抗菌药物

答案：B

85. 冠心病患者同时伴有阵发性和持续性房颤，为维持其窦性心律，应首选的药物是

- A: 胺碘酮
- B: 多非利特
- C: 普罗帕酮
- D: 索他洛尔

答案：A

86. 胰岛素制剂适宜

- A: 不宜冷冻的药品

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 与其他药品分库贮存的药品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/077062020052010024>