

2023-24 年广东省廉江市《执业药师之西药学专业二》考试题库及解析答案

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 某患儿高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。关于奥司他韦预防用药的说法，正确的建（）

- A: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg
- B: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg
- C: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg
- D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

答案：B

2. 典型不良反应为皮肤毒性，属于酪氨酸激酶抑制剂的药物是（）

- A: 氟尿嘧啶
- B: 顺铂
- C: 奥沙利铂
- D: 吉非替尼

答案：D

3. 治疗勃起功能障碍药的是

- A: 他达拉非
- B: 左炔诺孕酮
- C: 达那唑

D: 氯地孕酮

答案: A

4. 血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

A: 依那普利

B: 地高辛

C: 米力农

D: 多巴酚丁胺

答案: A

5. 很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是

A: 维生素 C

B: 精氨酸

C: 维生素 B2

D: 维生素 AD

答案: C

6. 氨基糖苷类的主要排泄途径是

A: 主要经肾脏排泄

B: 主要经肝脏清除

C: 经肝、肾双途径清除

D: 主要经呼吸道排泄

答案: A

7. 寻常痤疮、鱼鳞病及银屑病可选用()

A: 林旦霜

B: 阿达帕林

C: 酮康唑

D: 维 A 酸

答案: D

8. (2021 年真题) 通过直接抑制凝血因子 Xa 而发挥作用的抗凝血药物
()

A: 氯吡格雷

B: 依诺肝素

C: 华法林

D: 利伐沙班

答案: D

9. 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是 ()

A: 低蛋白血症

B: 糖尿病

C: 重症肌无力

D: 癫痫

答案: C

10. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是

A: 抑制 Ca^{2+} 外流

B: 促进 K^{+} 外流

C: 抑制 Na^{+} 内流

D: 促进 Ca^{2+} 内流

答案: C

11. 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是 ()

A: 曲伏前列素

- B: 甘露醇
- C: 噻吗洛尔
- D: 毛果芸香碱

答案：D

12. (2019 年真题) 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是 ()

- A: 还原型谷胱甘肽
- B: 多烯磷脂酸胆碱
- C: 甘草酸二铵
- D: 葡醛内酯

答案：B

13. (2017 年真题) 为避免引起大面积中毒性表皮坏死松解症，服用前提倡做人体白细胞抗原等位基因检测的抗癫痫药是 ()

- A: 丙戊酸钠
- B: 卡马西平
- C: 氟硝西洋
- D: 托吡酯

答案：B

14. 甲睾酮的作用不包括哪一项 ()

- A: 促进男性性器官的发育与成熟
- B: 抗雌激素作用
- C: 抑制腺垂体分泌促性腺激素
- D: 抑制蛋白质的合成

答案：D

15. 仅在体内有凝血作用的药物是

- A: 尿激酶
- B: 肝素
- C: 华法林
- D: 噻氯匹啶

答案：C

16. 不属于氨基糖苷类的是

- A: 异烟肼
- B: 庆大霉素
- C: 新霉素
- D: 妥布霉素

答案：A

17. 下述哪种药物与氨基糖苷类抗生素合用可能出现呼吸抑制或呼吸停止

- A: 多潘立酮
- B: 奥美拉唑
- C: 西咪替丁
- D: 硫糖铝

答案：C

18. 大环内酯类的主要清除途径是

- A: 主要经肝脏清除
- B: 主要经肾脏排泄
- C: 主要经呼吸道排泄
- D: 经肝、肾双途径清除

答案：A

19. 促胃肠动力药是()

- A: 熊去氧胆酸
- B: 甲氧氯普胺
- C: 阿托品
- D: 肾上腺素

答案: B

20. 下列药物属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是

- A: 硫酸亚铁
- B: 阿司匹林
- C: 替罗非班
- D: 双嘧达莫

答案: C

21. 法莫替丁可用于治疗

- A: 心肌梗死
- B: 急慢性胃炎
- C: 十二指肠穿孔
- D: 十二指肠溃疡

答案: D

22. 双香豆素与维生素 K

- A: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- B: 产生协同作用
- C: 与其竞争结合血浆蛋白
- D: 竞争性对抗

答案：D

23. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下,请结合问题作答

。

- A: 螺内酯
- B: 贝那普利
- C: 呋塞米
- D: 比索洛尔

答案：B

24. 下列药物不属于大环内酯类的是

- A: 阿奇霉素
- B: 大观霉素
- C: 罗红霉素
- D: 泰利霉素

答案：B

25. 四环素联用抗凝药需要

- A: 增加麦角中毒的风险
- B: 口服吸收减少
- C: 调整抗凝血药的剂量
- D: 肝毒性增加

答案：C

26. 通过选择性抑制 5-HT 再摄取, 增加突触间隙 5-HT 浓度, 从而增强 5-HT 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 阿米替林
- B: 度洛西汀

C: 舍曲林

D: 吗氯贝胺

答案: C

27. 关于链激酶的叙述不正确的是

A: 对各种早期栓塞有溶解作用

B: 是 β 溶血链球菌产生的一种蛋白质

C: 链球菌感染可增强其作用

D: 可促使纤溶酶原激活形成纤溶酶

答案: C

28. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的是

A: 长春瑞滨

B: 吉西他滨

C: 甲氨蝶呤

D: 巯嘌呤

答案: C

29. 患者，男，45岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀2年，加重1周"之主诉入院。患者2年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

A: 缓解腹胀

B: 治疗肝硬化

C: 预防消化道出血

D: 治疗胃溃疡

答案: D

30. 属于 DPP-4 抑制剂的药物是

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 那格列奈
- B: 伏格列波糖
- C: 阿格列汀
- D: 利拉鲁肽

答案：C

31. (2017 年真题) 可引起双硫仑样反应 ()

- A: 米诺环素
- B: 甲硝唑
- C: 哌拉西林
- D: 左氧氟沙星

答案：B

32. (2021 年真题) 抗原性及变态反应风险最高的溶栓药物是 ()

- A: 替奈普酶
- B: 尿激酶
- C: 重组链激酶
- D: 瑞替普酶

答案：C

33. 治疗阴道滴虫病的首选药是 ()。

- A: 噻嘧啶
- B: 吡喹酮
- C: 阿苯达唑
- D: 甲硝唑

答案：D

34. 对于丝裂霉素注意事项的描述，错误的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 长期应用可抑制卵巢及睾丸功能，造成闭经或精子缺乏
- B: 溶解后尽快使用，尽量避免同低 pH 的注射液配伍
- C: 老年患者及肾功能不全者慎用
- D: 只需要在用药期间密切监测血常规、肾功能

答案：D

35. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

- A: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎
- B: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿
- C: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在
- D: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

答案：C

36. 作用机制为直接改变破骨细胞的形态学，从而抑制其功能，首先阻止破骨细胞的前体细胞黏附于骨组织，进而对破骨细胞的数量和活性产生直接的影响，该药物是

- A: 雷洛昔芬
- B: 降钙素
- C: 骨化三醇
- D: 阿仑膦酸钠

答案：D

37. 患者，男，70 岁。进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示胃多发性溃疡(A

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 替米沙坦
- B: 埃索美拉唑钠
- C: 美托洛尔
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

38. (2015 年真题) 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是 ()。

- A: 孟鲁司特
- B: 沙美特罗
- C: 多索茶碱
- D: 噻托溴铵

答案：B

39. 茚地那韦的作用靶点是

- A: 神经氨酸酶
- B: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶
- C: 脱氧核糖核酸聚合酶
- D: HIV-1 反转录酶

答案：B

40. 在妊娠期，尤其是妊娠末期或分娩期不宜应用，易发生“灰婴综合征”的药物是 ()

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 多西环素
- D: 四环素

答案：A

41. 顺铂

- A: 干扰 RNA 转录
- B: 直接破坏 DNA 结构和功能
- C: 影响蛋白质合成和功能
- D: 干扰核酸生物合成

答案：B

42. (2017 年真题) 维 A 酸软膏治疗痤疮时,合理的用法是 ()

- A: 一日一次,晨起使用
- B: 一日一次,睡前使用
- C: 一日二次,早晚使用
- D: 一日一次,固定时间使用

答案：B

43. 强心苷的心脏毒性反应中最常见的心律失常是

- A: 房颤
- B: 二联律
- C: 室性期前收缩
- D: 房性期前收缩

答案：C

44. 属于合成的麻醉性镇痛药的是

- A: 美沙酮
- B: 吗啡
- C: 布洛芬
- D: 可待因

答案：A

45. (2017 年真题) 可以引起牙齿黄染的药物是 ()

- A: 庆大霉素
- B: 加替沙星
- C: 多西环素
- D: 甲砒霉素

答案: C

46. (2018 年真题) 长期大剂量使用, 会降低阿司匹林对心血管的保护作用, 应避免合用的药物是 ()

- A: 布洛芬
- B: 贝那普利
- C: 格列齐特
- D: 阿托伐他汀

答案: A

47. 卡泊三醇治疗银屑病的机制是

- A: 通过角蛋白表达正常化, 促进角朊细胞末端分化
- B: 可抑制表皮细胞的有丝分裂, 使皮肤增生速率恢复正常
- C: 与维 A 酸细胞核受体有较高亲和力
- D: 能抑制皮肤角质形成细胞的过度增生和诱导其分化, 从而使银屑病表皮细胞的增生和分化得到纠正

答案: D

48. 患者, 女, 60 岁。凌晨突发脚痛, 查体尿酸水平偏高, 临床诊断为高尿酸血症, 医生处方秋水仙碱胶囊, 塞来昔布胶囊, 碳酸氢钠治疗。

。

- A: 选择长期口服给药

- B: 选择注射与口服并用
- C: 选择短期口服给药
- D: 选择注射给药

答案：C

49. (2020 年真题) 服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

- A: 头孢呋辛
- B: 左氧氟沙星
- C: 克林霉素
- D: 磺胺甲噁唑

答案：D

50. 以下药物治疗高血压时，给药次数为一日 2 次给药的是

- A: 硝苯地平控释片
- B: 非洛地平缓释片
- C: 氨氯地平片
- D: 硝苯地平缓释片

答案：D

51. 患者，男性 35 岁，大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是

- A: 氯霉素
- B: 庆大霉素
- C: 哌拉西林
- D: 林可霉素

答案：C

52. 阿托品 2mg 时，表现出的中毒症状为()

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 口干、心率加快、瞳孔轻度散大
- B: 心悸、显著的口干、瞳孔扩大，有时出现视物模糊
- C: 轻微的心率减慢，略有口干及少汗
- D: 语言不清、烦躁不安、皮肤干燥发热

答案：B

53. (2020 年真题) 口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

- A: 昔多福韦
- B: 泛昔洛韦
- C: 伐昔洛韦
- D: 喷昔洛韦

答案：C

54. 青霉素常见的不良反应

- A: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退
- B: 细胞缺氧、酸中毒、休克
- C: 过敏反应
- D: 锥体外系反应

答案：C

55. (2021 年真题) 属于短效避孕药，但其埋植剂可作为长效避孕药使用的药物是 ()

- A: 左炔诺孕酮
- B: 孕二烯酮
- C: 去氧孕烯
- D: 氯地孕酮

答案：A

56. 具有利胆作用的药物是()

- A: 熊去氧胆酸
- B: 甲氧氯普胺
- C: 肾上腺素
- D: 阿托品

答案: A

57. 氢氯噻嗪的药理作用是

- A: 抑制远曲小管 Na^+-Cl^- -共转运子的功能
- B: 与醛固酮受体结合
- C: 提高血浆渗透性，产生组织脱水作用
- D: 抑制近曲小管碳酸酐酶活性

答案: A

58. 患者，男，35岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁
- B: 驱钩虫+亚叶酸钙
- C: 输血+注射右旋糖酐铁
- D: 驱钩虫+口服铁剂

答案: D

59. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是()

- A: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂
- B: 肾功能不全者可以使用
- C: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- D: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24 小时尿量及尿颜色

答案：B

60. (2020 年真题) 患者，女，68 岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 雷贝拉唑
- C: 法莫替丁
- D: 奥美拉唑

答案：D

61. 与第二代溶栓酶相比，瑞替普酶的作用优势不包括()

- A: 血浆半衰期长，栓塞开通率高，给药方便
- B: 全身纤溶活性大于链激酶、阿替普酶
- C: 给药较方便，可以为抢救患者赢得时间
- D: 具有较强的、特异的纤维蛋白选择性

答案：B

62. 具有成瘾性的中枢性镇咳药是()。

- A: 苯丙哌林
- B: 右美沙芬
- C: 氯化铵
- D: 可待因

答案：D

63. 氨基糖苷类药的主要作用靶点是

- A: 细胞内膜 PBP
- B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

C: 核糖体的 50S 亚基

D: 核糖体的 30S 亚基

答案: D

64. 考来替泊的降脂作用机制主要是

A: 抑制细胞对 LDL 的修饰

B: 阻滞胆汁酸在肠道的重吸收

C: 增加脂蛋白酶活性

D: 抑制脂肪分解

答案: B

65. 氨茶碱的主要平喘机制为()

A: 激活鸟苷酸环化酶

B: 抑制磷酸二酯酶

C: 抑制腺苷酸环化酶

D: 直接舒张支气管

答案: B

66. (2020 年真题) 属于肝药酶诱导剂，与华法林合用会减弱后者抗凝作用的药物是

A: 氯苯那敏

B: 丙戊酸钠

C: 苯妥英钠

D: 唑吡坦

答案: C

67. 抑制排卵避孕药的较常见的不良反应是()

A: 肾功能损害

- B: 多毛、痤疮
- C: 子宫不规则出血
- D: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌

答案：C

68. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

- A: 罗红霉素
- B: 红霉素
- C: 万古霉素
- D: 克拉霉素

答案：C

69. 关于双胍类药物的作用特点描述，错误的是

- A: 不与蛋白结合，不被代谢，尿中排出
- B: 促进组织摄取葡萄糖
- C: 抑制胰高血糖素的分泌
- D: 不会降低正常的血糖

答案：C

70. 可能发生不可逆性骨髓功能抑制，应避免重复疗程使用的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 多西环素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案：A

71. 起效缓慢，可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是

()

- A: 罗格列酮
- B: 利拉鲁肽
- C: 瑞格列奈
- D: 艾塞那肽

答案：A

72. 用于治疗慢性功能性便秘，也可用于高氨血症的治疗的是

- A: 开塞露
- B: 酚酞
- C: 乳果糖
- D: 聚乙二醇 4000

答案：C

73. 属于丙烯胺类的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 制霉菌素
- C: 卡泊芬净
- D: 特比萘芬

答案：D

74. 增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性而降低血糖的是()

- A: 那格列奈
- B: 瑞格列奈
- C: 罗格列酮
- D: 阿卡波糖

答案：C

75. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 非诺贝特
- B: 阿昔莫司
- C: 依折麦布
- D: 阿托伐他汀

答案：A

76. 属于前列腺素 FP 受体激动剂的是

- A: 曲伏前列素
- B: 四环素
- C: 1%碘甘油
- D: 9%硼酸冰片滴耳液

答案：A

77. 辅助治疗不孕症的维生素是

- A: 烟酸
- B: 维生素 B2
- C: 维生素 B6
- D: 维生素 E

答案：D

78. 患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多西他赛的描述，错误的是

- A: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同
- B: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成
- C: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物
- D: 在相当剂量下，抗肿瘤作用比紫杉醇高 1 倍

答案：A

79. (2021 年真题) 兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是 ()

- A: 麻黄碱滴鼻液
- B: 赛洛唑啉滴鼻液
- C: 羟甲唑啉鼻喷剂
- D: 呋麻滴鼻液

答案：D

80. 多柔比星用药后 1~2 日可出现

- A: 绿色尿
- B: 黄色尿
- C: 红色尿
- D: 橙色尿

答案：C

81. (2018 年真题) 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 高检出率的医疗机构, 进行人工瓣膜置换术时, 为预防 MRSA 感染, 可选用 ()

- A: 青霉素 G
- B: 头孢唑林
- C: 氨曲南
- D: 万古霉素

答案：D

82. 患者女性, 30 岁。以肺结核收治入院, 给予抗结核治疗, 链霉素肌肉注射后, 10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状, 继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 链霉素引起的肾毒性

- B: 链霉素引起的过敏性休克
- C: 链霉素引起的神经毒性
- D: 链霉素引起的神经肌肉阻滞作用

答案：B

83. 以下泻药中，半乳糖血症患者禁用的是

- A: 液状石蜡
- B: 乳果糖
- C: 酚酞
- D: 硫酸镁

答案：B

84. 兼具抑菌作用、抑制痛觉神经和刺激腺体分泌的鼻用制剂是

- A: 异丙托溴铵吸入剂润德教育
- B: 复方薄荷脑滴鼻液
- C: 鲑鱼降钙素鼻喷剂
- D: 氟替卡松鼻喷剂

答案：B

85. 抗瘤谱较广，恶性淋巴瘤疗效显著，还可治疗自身免疫性疾病的药物是()

- A: 塞替派
- B: 丝裂霉素
- C: 环磷酰胺
- D: 奥沙利铂

答案：C

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

86. 属于 α_1 受体阻断药，用于治疗良性前列腺增生症的是 ()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/077113124056010024>