

临床执业医师试题库

第一部分

以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 伤寒病的肠道病变特点是

- A. 病变好发于结肠黏膜层及黏膜下层
- B. 不累及肠系膜淋巴结
- C. 形成与肠长轴平行的椭圆形溃疡
- D. 溃疡愈合后形成瘢痕引起肠狭窄
- E. 病变愈复后不会再次复发

【正确答案】： C

2. 下述哪种因素与血栓形成无关

- A. 血管内膜损伤
- B. 血流缓慢
- C. 涡流形成
- D. 血小板数量增多或黏性增加
- E. 纤维蛋白溶解酶增加

【正确答案】： E

3. 下述哪种坏死属于液化性坏死

- A. 乙型脑炎引起的脑坏死
- B. 心肌梗死
- C. 肠梗死
- D. 淋巴结干酪样坏死
- E. 脚坏疽

【正确答案】： A

4. 关于血管壁玻璃样变性，下述哪项是错误的

- A. 常见于高血压病
- B. 常见于肾、脑、脾、视网膜细动脉
- C. 血管壁变硬、管腔狭窄
- D. 可引起组织缺血
- E. 玻璃样物质由免疫球蛋白和基底膜样物质构成

【正确答案】： E

5. 槟榔肝是指

- A. 肝瘀血及肝脂肪变性
- B. 肝瘀血
- C. 肝硬化
- D. 肝脂肪变性
- E. 肝萎缩

您所选的答案：【正确答案】： A

6. 急性普通型肝炎的病变特点是

- A. 肝细胞广泛变性，坏死轻微
- B. 肝细胞广泛变性，坏死严重
- C. 肝细胞广泛变性，Kupffer 细胞增生活跃

- D.肝细胞广泛变性，炎细胞浸润明显
- E.肝细胞广泛变性，淤胆明显

【正确答案】： A

7.下述哪项是肉芽组织不具备的功能

- A.机化凝血块和坏死组织
- B.包裹异物
- C.抗感染和保护创面
- D.分解、液化坏死物
- E.填补伤口及组织缺损

您所选的答案：【正确答案】： D

8.急性链球菌感染后肾小球肾炎属于

- A.弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎
- B.……弥漫性新月体性肾小球肾炎
- C.弥漫性膜性肾小球肾炎
- D.弥漫性膜性增生性肾小球肾炎
- E.轻微病变性肾小球肾炎

【正确答案】： A

9.关于原发性肺结核病的描述，哪项错误

- A.多见于儿童
- B.肺内原发灶多位于上叶下部或下叶上部近肺膜处
- C.结核菌易侵入淋巴管播散
- D.原发综合征是其病变特点
- E.多数患者须经积极适当的治疗才能痊愈

【正确答案】： E

10.引起肺动脉栓塞的血栓栓子主要来自

- A.二尖瓣
- B.主动脉瓣
- C.三尖瓣
- D.下肢深静脉
- E.肠系膜下静脉

【正确答案】： D 来源:考试大-临床执业医师

11.弥漫性新月体性肾小球肾炎中形成新月体的细胞是

- A.肾小球球囊壁层上皮细胞
- B.肾小球球囊壁层上皮细胞和单核巨噬细胞
- C.肾小球球囊脏层上皮细胞和单核巨噬细胞
- D.肾小球系膜细胞和内皮细胞
- E.肾小球系膜细胞

【正确答案】： B

12.良、恶性肿瘤最主要的区别是

- A.肿瘤呈浸润性生长
- B.生长迅速
- C.出现转移
- D.体积较大
- E.有出血坏死

【正确答案】: C

13.下列有关急性炎症的描述,哪项是错误的

- A.起病急骤
- B.病变持续时间短
- C.以变质性变化为主
- D.浸润炎症细胞常以中性粒细胞为主
- E.炎症局部血管通透性增高

【正确答案】: C

14.瘀血时扩张充盈的血管主要是

- A.动脉
- B.静脉
- C.小动脉和毛细血管
- D.小静脉和毛细血管
- E.毛细血管、小动脉和小静脉

【正确答案】: D

15.下列有关白细胞渗出的描述,哪项是错误的

- A.肿瘤坏死因子(TNF)可促进内皮细胞及白细胞黏附分子的表达,影响白细胞粘着
- B.白细胞伸出伪足,以阿米巴运动方式从内皮细胞缝隙游出
- C.炎症的不同阶段,游出的白细胞种类不同
- D.红细胞漏出也是主动过程
- E.趋化因子的作用是有特异性的

【正确答案】: D

16.下列有关化脓性炎症的描述,哪项不准确

- A.有大量中性粒细胞渗出即为化脓性炎
- B.脓性渗出物称为“脓液”
- C.脓细胞(脓球)即变性坏死的中性粒细胞
- D.化脓性炎中均伴有不同程度的组织坏死
- E.蜂窝织炎和脓肿均为化脓性炎

【正确答案】: A

17.下列哪一项不符合大叶性肺炎

- A.多由肺炎双球菌引起
- B.病变多累及一个大叶
- C.纤维素性炎症
- D.可合并肺肉质变
- E.易并发脓毒败血症导致死亡

【正确答案】: E

18.下述哪项不符合固缩性坏死

- A.常表现为单个细胞或小灶状坏死
- B.各种损伤性刺激改变遗传信息的转录和翻译,形成死亡蛋白
- C.核酸内切酶被激活,引起染色质凝集
- D.凋亡小体形成
- E.引起强烈的炎症反应

【正确答案】: E

19.关于坏死,下述哪项是正确的

- A.坏死是指活体局部组织、细胞死亡后出现的形态学改变
- B.坏死是指机体死亡后组织、细胞出现的形态学改变
- C.坏死是指局部组织、细胞的死亡
- D.坏死是指机体内细胞的程序性死亡
- E.坏死是可复性改变

【正确答案】： A

20.假膜性炎的特征是

- A.在浆膜发生的纤维素性炎
- B.在黏膜发生的纤维素性炎
- C.容易发生机化
- D.以上都不是
- E.以上都是

【正确答案】： B

21.下列有关浆液性炎的描述，哪项是错误的

- A.经常发生于疏松组织、浆膜、黏膜等处
- B.在疏松组织形成炎性积液
- C.在浆膜腔形成的积液，液体来自血管渗出及间皮细胞分泌
- D.在黏膜又称“卡他性炎”
- E.渗出液中含有少量白细胞和纤维素

【正确答案】： B

22.哪项不是继发性肺结核病的病变特点

- A.病变多从肺尖部开始
- B.患者对结核分枝杆菌有一定的免疫力
- C.围绕坏死灶易形成结核结节
- D.全身粟粒型结核病极少见
- E.病变在肺内主要通过淋巴管蔓延

【正确答案】： E

23.流行性乙型脑炎的主要病理变化不包括

- A.蛛网膜下腔积脓
- B.神经细胞变性坏死
- C.淋巴细胞和单核细胞浸润形成血管套
- D.软化灶形成
- E.小胶质细胞结节形成

【正确答案】： A

24.下列哪项反映大叶性肺炎的病变实质

- A.肺的化脓性炎症
- B.肺的出血性炎症
- C.肺的肉质变
- D.肺泡的纤维素性炎症
- E.以上都不是

【正确答案】： D

25.坏死的主要形态学标志是

- A.胞浆红染
- B.核浓缩、核破碎、核溶解

- C.间质崩解呈颗粒状
- D.核肿大
- E.核内假包含体形成

【正确答案】: B

26.下述关于风湿性心内膜炎的叙述中,哪一项是正确的

- A.瓣膜赘生物内有细菌
- B.瓣膜赘生物粘连不牢固
- C.受累瓣膜容易发生穿孔、断裂
- D.受累瓣膜以三尖瓣多见
- E.赘生物由血小板和纤维素组成

【正确答案】: E

27.下列哪种增生不属于内分泌性增生

- A.地方性甲状腺肿
- B.乳腺增生症
- C.肝细胞结节状增生
- D.前列腺增生症
- E.子宫内膜增生症

【正确答案】: C

28.关于细胞水肿,下述哪项是正确的

- A.细胞浆内出现大小不等的圆形空泡
- B.线粒体、内质网无明显改变
- C.由于能量供应不足,细胞膜上的钠泵受损,导致细胞内水分增多
- D.原因消除后,水肿细胞不能恢复正常
- E.主要由病毒感染引起

【正确答案】: C

29.关于萎缩,下述哪项是正确的

- A.萎缩细胞的细胞器减少
- B.萎缩的器官不伴有细胞数目减少
- C.萎缩的器官功能正常
- D.萎缩的器官不能恢复原状
- E.萎缩属不可复性改变

【正确答案】: A

30.下列关于风湿病的叙述中哪一项是不正确的

- A.风湿病是累及全身结缔组织的变态反应性疾病
- B.以心脏病变对患者危害最大
- C.风湿性心内膜炎引起的慢性心瓣膜病严重影响心脏功能
- D.风湿性关节炎常可导致关节畸形
- E.皮下结节和环形红斑对临床诊断风湿病有帮助

【正确答案】: D 来源:考试大-临床执业医师

31.下列哪种肿瘤与遗传因素关系最密切

- A.胃癌
- B.肺癌
- C.肾癌
- D.黑色素瘤

E.视网膜母细胞瘤

【正确答案】: E

32.下列何种情况与胃消化性溃疡无关

A.幽门螺旋杆菌感染

B.溃疡直径通常在 2cm 以下

C.常反复再发

D.溃疡底部正常胃壁结构被破坏

E.患者胃酸分泌减少

【正确答案】: E

33.下列哪一项不符合萎缩

A.癌症晚期的心脏

B.老年人的心脏

C.肾积水的肾实质

D.脑积水的脑实质

E.高血压病的左心室

【正确答案】: E

34.癌和肉瘤的转移特性是

A.两者均常有淋巴道和血道转移

B.两者都首先转移于淋巴结

C.肉瘤常有种植性转移

D.肉瘤常由淋巴道转移，而癌常由血道转移

E.以上都不是

【正确答案】: E 来源:考试大-临床执业医师

第二部分

1、关于子宫的描述，正确的是（ B ）

A、成年女子的子宫长约 7~8cm，宽约 4~5cm，厚约 4~5cm

B、宫体与宫颈之间最狭窄的部分为子宫峡部

C、幼年时宫体和宫颈的比例是 2：1

D、子宫峡部上端是组织学内口

E、子宫峡部下端为解剖学内口

2、不发生周期性变化的组织是（ B ）

A、阴道粘膜上皮

B、卵巢生发上皮

C、子宫内膜

D、宫颈粘膜

E、输卵管粘膜

3、足月妊娠时的羊水量约为（ B ）

A、100ml

B、800ml

C、600ml

D、400ml

E、300ml

- 4、正常脐带内含有（ B ）
- A、一条脐动脉，一条脐静脉
 - B、两条脐动脉，一条脐静脉
 - C、两条脐动脉，两条脐静脉
 - D、一条脐动脉，两条脐静脉
 - E、两条脐动脉
- 5、孕妇开始知觉胎动的时间是（ B ）
- A、妊娠 15～17 周
 - B、妊娠 18～20 周
 - C、妊娠 21～22 周
 - D、妊娠 23～24 周
 - E、妊娠 27 周以上
- 6、初产妇第一产程活跃期延长是指活跃期超过（ C ）
- A、4 小时
 - B、6 小时
 - C、8 小时
 - D、10 小时
 - E、12 小时
- 7、初产妇第一产程活跃期停滞是指进入活跃期后宫口不再扩张超过（ C ）
- A、1 小时
 - B、1 小时 30 分
 - C、2 小时
 - D、2 小时 30 分
 - E、3 小时
- 8、硫酸镁中毒时最早出现的是（ D ）
- A、呼吸加快
 - B、尿量减少
 - C、呼吸减慢
 - D、膝反射消失
 - E、心率加快
- 9、心脏病孕妇容易发生心衰的时期是（ D ）
- A、妊娠 20～22 周
 - B、妊娠 24～26 周
 - C、妊娠 28～30 周
 - D、妊娠 32～34 周
 - E、妊娠 36～38 周
- 10、妊娠合并急性病毒性肝炎时，昏迷前期口服新霉素是为了（ B ）
- A、预防感染
 - B、减少游离氨及其他毒素的形成
 - C、消除肠道内感染灶
 - D、控制重症肝炎进展
 - E、抑制需氧菌和厌氧菌
- 来源:考试大-临床执业医师
- 11、单臀先露的两下肢姿势是（ D ）
- A、髋关节屈曲，膝关节屈曲

- B、髋关节直伸，膝关节直伸
- C、髋关节直伸，膝关节屈曲
- D、髋关节屈曲，膝关节直伸
- E、以上都不是

12、抬头跨耻征阳性的初产妇于临产后检查，不可能出现的是（ C ）

- A、子宫收缩力异常
- B、胎位异常
- C、胎头衔接
- D、胎膜早破
- E、出现病理缩复环

13、与病理缩复环关系最密切的是（ E ）

- A、双胎妊娠
- B、先兆子痫
- C、子宫收缩过强
- D、胎盘早剥
- E、嵌顿性肩先露

14、在子宫内的胎儿缺氧早期表现为（ D ）

- A、胎动减弱
- B、胎动次数减少
- C、胎动增强
- D、胎动频繁
- E、以上都不是

15、正常阴道中优势菌群是（ A ）

- A、乳酸杆菌
- B、棒状杆菌
- C、大肠杆菌
- D、类杆菌
- E、梭状杆菌

16、宫颈糜烂的分度依据（ C ）

- A、糜烂深度
- B、糜烂形状
- C、糜烂面积
- D、糜烂位置
- E、糜烂性质

17、子宫内膜结核最可靠的诊断依据是（ B ）

- A、月经血结核菌培养
- B、子宫内膜病理活检
- C、宫腔镜检查
- D、子宫输卵管碘油造影
- E、盆腔 X 线片见孤立钙化点

18、卵巢浆液性肿瘤来源于（ A ）

- A、卵巢的生发上皮，向输卵管上皮分化
- B、卵巢的生发上皮，向宫颈粘膜分化
- C、卵巢的生发上皮，恶变

- D、卵巢的生发上皮，发生逆转现象
E、卵巢的生发上皮，向子宫内膜分化
- 19、对放射治疗最敏感的卵巢恶性肿瘤是（ A ）
A、无性细胞瘤
B、内胚窦瘤
C、间质细胞瘤
D、畸胎瘤
E、两性母细胞瘤
- 20、宫颈癌最常见的病理类型是（ E ）
A、鳞腺癌
B、腺癌
C、恶性腺癌
D、粘液腺癌
E、鳞状细胞癌 来源:考试大-临床执业医师
- 21、易发生蒂扭转的卵巢囊肿是（ A ）
A、皮样囊肿
B、巧克力囊肿
C、粘液性囊腺瘤
D、浆液性囊腺瘤
E、滤泡囊肿
- 22、最常见的子宫肌瘤类型是（ A ）
A、肌壁间肌瘤
B、浆膜下肌瘤
C、粘膜下肌瘤
D、宫颈肌瘤
E、阔韧带肌瘤
- 23、子宫肌瘤发生红色样变常见于（ A ）
A、妊娠期
B、月经中期
C、绝经前期
D、红斑狼疮治疗期
E、生育期
- 24、子宫内膜癌的诊断方法应是（ E ）
A、细胞学图片
B、磁共振成像
C、血清 CA125 测定
D、淋巴造影
E、分段诊刮
- 25、完全性葡萄胎的恶变率，国内外报道有异，我国为（ B ）
A、10.5%
B、14.5%
C、20.5%
D、30.5%
E、35%

26

B)

A、子宫肌层

B、卵巢

C、宫颈

D、直肠子宫陷凹

E、宫底韧带

27、应用高效孕激素和假孕疗法治疗子宫内膜异位症效果较差的是 (E)

A、卵巢巧克力囊肿

B、子宫直肠陷凹病灶

C、膀胱的子宫内膜异位

D、远处转移的子宫内膜

E、子宫肌腺病

28、关于带铜 V 型宫内节育器，错误的是 (D)

A、是我国常用的宫内节育器之一

B、其形状更接近宫腔形态

C、带器妊娠率低

D、出血发生率低

E、脱落率低

29、输卵管绝育术的作用是 (C)

A、抑制排卵

B、杀灭精子

C、阻止精子与卵子相遇

D、降低宫颈粘液的粘稠度

E、降低精子存活率

30、生后第一年身高增长约 (E)

A、35cm

B、32cm

C、30cm

D、27cm

E、25cm 来源:考试大-临床执业医师

31、出生时新生儿的头围约 (B)

A、35cm

B、34cm

C、33cm

D、32.5cm

E、31cm

32、1~2 岁幼儿 1 年中身高约增长 (C)

A、5cm

B、7cm

C、10cm

D、12cm

E、13cm

33、恒牙骨化开始的年龄是 (A)

A、新生儿

B 1 岁

C、2 岁

D、3 岁

E、4 岁

34、我国规定 1 岁内必须完成的计划免疫是（ A ）

A、卡介苗

B、乙脑疫苗

C、流脑疫苗

D、流感疫苗

E、甲肝疫苗

35、1 岁以内婴儿基础代谢，每日每公斤约需（ C ）

A、80kcal

B、66kcal

C、55kcal

D、44kcal

E、30kcal

36、不能为机体提供能量的营养素是（ D ）

A、糖类

B、淀粉类

C、蛋白质类

D、维生素类

E、脂肪类

37、重度营养不良患儿调整饮食，每日开始供给的热量应是（ B ）

A、30kcal/kg

B、40kcal/kg

C、50kcal/kg

D、60kcal/kg

E、70kcal/kg

38、维生素 D 缺乏性佝偻病可靠的早期诊断指标是（ D ）

A、血清钙浓度降低

B、血清磷浓度降低

C、血清碱性磷酸酶增高

D、血 1, 25-(OH)₂D₃ 降低

E、血 PTH 降低

39、维生素 D 缺乏性手足搐搦症发生惊厥是由于血清中（ D ）

A、钾离子浓度降低

B、钠离子浓度降低

C、氯离子浓度降低

D、钙离子浓度降低

E、磷离子浓度降低

40、早产儿的胎龄应是（ D ）

A、>25 周至<37 足周

B、>26 周至<37 足周

C、>27 周至<38 足周

D >28 周至<37 足周

E、>28 周至<38 足周

41、正常足月儿的皮肤外观特点是（ D ）

A、肤色苍白，皮下脂肪丰满

B、肤色稍黄，皮下脂肪少

C、肤色红润，皮下脂肪少

D、肤色红润，皮下脂肪丰满

E、肤色稍黄，毳毛少

42、新生儿溶血症的换血量约为婴儿全血量的（ C ）

A、1 倍

B、1.5

C、2 倍

D、2.5 倍

E、3 倍

43、鉴别非典型苯丙酮尿症，需进行（ B ）

A、guthrie 细菌生长抑制试验

B、尿蝶呤分析

C、尿有机酸分析

D、尿三氯化铁试验

E、尿 2，4-二硝基苯肼试验

44、麻疹出疹一般在发热后的（ B ）

A、1~2 天

B、3~4 天

C、5~6 天

D、7~8 天

E、7~10 天

45、麻疹病人解除隔离的指标是（ C ）

A、隔离至热退

B、皮疹完全消退后

C、出疹后 5 天

D、出疹后 10~14 天

E、出疹后 3~4 天

46、猩红热的皮疹出现在发热后（ B ）

A、12 小时之内

B、12~48 小时

C、49~60 小时

D、61~72 小时

E、大于 72 小时

47、小儿初次感染结核菌至产生变态反应的时间是（ E ）

A、48~72 小时

B、4~6 天

C、1~2 周

D、2.5~3 周

E、4~8 周

48

C)

- A、<3 月
- B、3 月~5 月
- C、6 月~2 岁
- D、3 岁~4 岁
- E、5 岁~6 岁

49、婴儿腹泻重度脱水的主要诊断依据是 (B)

- A、皮肤弹性差
- B、哭无泪，尿量少
- C、眼眶及前囟凹陷
- D、外周循环衰竭
- E、精神萎靡

50、小儿符合中度等渗性脱水的是 (D)

- A、失水量占体重的 6% ， 血清钠 155mmol/L
- B、失水量占体重的 3% ， 血清钠 135mmol/L
- C、失水量占体重的 7% ， 血清钠 120mmol/L
- D、失水量占体重的 8% ， 血清钠 140mmol/L
- E、失水量占体重的 11% ， 血清钠 140mmol/L 来源:考试大-临床执业医师

51、咽-结合膜热的病原体为 (D)

- A、流感病毒
- B、合胞病毒
- C、柯萨奇病毒
- D、腺病毒
- E、EB 病毒

52、支原体肺炎应用抗生素的疗程应是 (D)

- A、体温正常后停药
- B、症状基本消失后
- C、1 周
- D、2~3 周
- E、4~6 周

53、婴幼儿患呼吸道感染的主要原因是 (D)

- A、呼吸浅表
- B、呼吸频率快
- C、呈腹式呼吸
- D、呼吸道粘膜缺少 SIgA
- E、鼻腔短小，狭窄，粘膜血管丰富

54、法洛四联征不应出现的症状是 (B)

- A、蹲踞
- B、贫血
- C、突然晕厥
- D、杵状指(趾)
- E、活动耐力下降

55、诊断小儿肾病综合征的必备条件是 (E)

- A、大量蛋白尿，高脂血症

B

C、大量蛋白尿，明显水肿

D、低蛋白血症，明显水肿

E、低蛋白血症，大量蛋白尿

56、早产儿使用铁剂预防贫血起始的月龄是（ B ）

A、1 个月

B、2 个月

C、3 个月

D、4 个月

E、5 个月

57、易并发硬膜下积液的化脓性脑膜炎的病原菌是（ D ）

A、脑膜炎双球菌、肺炎链球菌

B、溶血性链球菌、脑膜炎双球菌

C、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌

D、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌

E、流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌

58、先天性甲状腺功能低下分类为（ B ）

A、原发性、继发性、散发性

B、散发性、地方性

C、碘缺乏性、非碘缺乏性

D、遗传性、非遗传性

E、碘缺乏性、非碘缺乏性、混合性

59、8 岁患儿，胸骨左缘第 3、4 肋间听到响亮而粗糙的收缩期杂音，应考虑为（ A ）

A、室间隔缺损

B、主动脉瓣狭窄

C、二尖瓣关闭不全

D、动脉导管未闭

E、肺动脉瓣狭窄 来源:考试大-临床执业医师

第三部分

单选题(每题的备选答案中只有一个最佳答案。)

1、 RB 基因属于抑癌基因，最初是在哪种肿瘤细胞中发现的

A.视网膜母细胞瘤

B.神经鞘膜瘤

C.黑色素瘤

D.脑膜瘤

E.肾母细胞瘤

[答案]: A

2、 以下哪一种不是癌基因产物

A.生长因子类似物

B.化学致癌物质

C.结合 GTP 的蛋白质

D.结合 DNA 的蛋白质

E.

[答案]: B

3、临床上确诊的各类肿瘤患者中，半数以上可以检出某基因结构或功能缺陷，这个基因是

A.p16

B.p53

C.p21

D.p105

E.p35

[答案]: B

4、成熟红细胞的主要能量来源是:

A.糖醛酸途径

B.脂肪酸 β 氧化

C.糖的有氧氧化

D.糖酵解

E.磷酸戊糖途径

[答案]: D

5、血液中作为代谢终产物存在的物质是

A.乳酸

B.尿酸

C.谷氨酰胺

D.丙氨酸

E.甘氨酸

[答案]: B

6、血浆胶体渗透压的大小主要取决于

A.清蛋白浓度

B.球蛋白浓度

C.葡萄糖浓度

D.脂类的含量

E.NA⁺, Cl⁻等无机离子含量

[答案]: A

7、治疗贫血的关键是促进血红蛋白的合成，下面的物质中影响血红蛋白合成的物质是

A.铁离子

B.钙离子

C.氨基酸

D.葡萄糖

E.铅

[答案]: E

8、血浆中的非蛋白氮的检测可以用于辅助诊断，下列物质中不属于非蛋白氮的是

A.尿素

B.肌酐

C.肌酸

D.尿酸

E.尿卟啉原

[答案]: E

9、 将血浆蛋白置于 pH 值为 8.6 的缓冲液中进行醋酸纤维薄膜电泳，泳动最快的是

- A. γ -球蛋白
- B. 清蛋白
- C. α_1 -球蛋白
- D. α_2 -球蛋白
- E. β -球蛋白

[答案]: B

10、 血浆蛋白质中不包括:

- A. 清蛋白
- B. 球蛋白
- C. 胆红素
- D. 纤维蛋白原
- E. 某些功能酶

[答案]: C 来源:考试大-临床执业医师

11、 参加生物转化的有关氧化酶是

- A. 加单氧酶系、胺氧化酶
- B. 细胞色素 B
- C. 细胞色素氧化酶(aa_3)
- D. 细胞色素 C
- E. 转氨酶

[答案]: A

12、 体内生物转化中最常见的结合反应是非营养物质与

- A. 硫酸结合
- B. 葡萄糖醛酸结合
- C. 乙酰基结合
- D. 甲基结合
- E. 谷胱甘肽结合

[答案]: B

13、 胆汁中含量最多的有机成分是:

- A. 胆色素
- B. 胆汁酸
- C. 胆固醇
- D. 磷脂
- E. 粘蛋白

[答案]: B

14、 属于游离型初级胆汁酸的是

- A. 鹅脱氧胆酸
- B. 脱氧胆酸
- C. 石胆酸
- D. 甘氨酸胆酸
- E. 牛磺鹅脱氧胆酸

[答案]: A

解析: 由肝细胞合成的胆汁酸称为初级胆汁酸, 包括游离型的胆酸、鹅脱氧胆酸及它们与甘氨酸和牛磺酸的结合产物。故 A 项符合。

15、 下列物质不属于胆色素的是

- A.胆素
- B.胆碱
- C.胆素原
- D.胆红素
- E.胆绿素

[答案]: B

16、 游离胆汁酸与牛磺酸结合形成结合型胆汁酸，其中的牛磺酸可由下列哪种氨基酸代谢转变而来

- A.色氨酸
- B.谷氨酸
- C.半胱氨酸
- D.甘氨酸
- E.天冬氨酸

[答案]: C

解 析: 在体内半胱氨酸可以转变为牛磺酸，牛磺酸可以与游离型胆汁酸结合成为结合型胆汁酸。故 C 项符合。

17、 女，中年，有肝炎史，血清 A/G 倒置，因为

- A.肝合成清蛋白减少
- B.清蛋白水解增多
- C.清蛋白从尿中排出
- D. γ 球蛋白合成增多
- E. γ 球蛋白破坏减少

[答案]: A

18、 肝脏生物转化作用的主要方式大致可分为氧化、还原、水解与结合 4 种反应。结合反应是体内最主要的生物转化方式。葡萄糖醛酸是肝中最多见的结合物，结合反应时其直接供体是:

- A.葡萄糖
- B.葡萄糖醛酸
- C.二磷酸尿苷葡萄糖(UDPG)
- D.二磷酸尿苷葡萄糖醛酸(UDPGA)
- E.三磷酸尿苷葡萄糖醛酸(UTPGA)

[答案]: D

19、 在肝细胞内由胆固醇转变为胆汁酸的过程很复杂，需经过羟化、加氢及侧链氧化断裂等许多酶促反应才能完成。其限速酶是:

- A. 3α 羟化酶
- B. 12α 羟化酶
- C. 7α 羟化酶
- D.还原酶
- E.水解酶

[答案]: C

20、 体内一种胆红素与重氮试剂反应慢或需加人酒精后才与试剂起反应，产生紫红色化合物。对该胆红素的描述错误的是:

- A.属于间接胆红素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077132042154006152>