

北京住院医师内科 I 阶段《神经内科必看考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 39 岁男性, 发作时先觉胃部一股气体上升, 并有咀嚼、吞咽动作, 喃喃自语, 走动, 似在找东西, 呼唤无反应, 持续约 4 分钟。发作类型是 () A. 强直-阵挛性发作

- B. 失神发作
- C. 复杂部分性发作
- D. 脑缺血发作
- E. 假性发作

2、单项选择题: 男患, 18 岁, 家住农村, 家中畜养牛、羊、猪。近 1 个月反复出现抽搐, 发作间期如常。头颅 CT 检查可见散在直径约 0.5~1.0cm 大小不等的圆形或类圆形低密度和高低混杂密度影及数个钙化灶。该患者最可能的诊断是 () A. 脑脓肿

- B. 脑肿瘤
- C. 脑膜炎
- D. 脑囊虫病
- E. 脑炎

3、单项选择题: 眼肌型肌营养不良与重症肌无力的主要鉴别依据是 ()。A. 肌电图

- B. 血清肌酶
- C. 四肢近端肌无力且感觉无异常
- D. 肌肉活检
- E. 家族史

4、单项选择题: 关于重症肌无力的阐述哪项是错误的 ()。A. 用抗胆碱酯酶药物有效

- B. 部分或全身骨骼肌易疲劳
- C. 腾喜龙试验阴性
- D. 活动后加重, 休息后减轻和晨轻暮重
- E. 是自身免疫性疾病

5、单项选择题: 患者, 男性, 50 岁, 因四肢无力诊断为重症肌无力, 患者长期口服新斯的明治疗, 症状控制可, 近日自服某药物, 致症状加重, 可能为下面哪种药物 ()。A. 醋酸泼尼松

- B. 阿莫西林
- C. 普萘洛尔
- D. 维生素 B1
- E. 新康泰克

6、单项选择题: 进行性脊肌萎缩的首发症状最常见为 ()。A. 一手或双手小肌肉萎缩、无力

- B. 下肢肌肉萎缩、无力
- C. 肌张力降低
- D. 腱反射亢进
- E. 大小便失禁

7、单项选择题：患者男性，65岁。晨醒后发现左肢乏力、言语含糊，次日乏力加重，不能行走。核磁共振检查示右侧基底节区有一T1低信号、T2高信号病灶。既往有糖尿病史多年，平时血糖控制差。最可能的诊断是（ ）。A. 脑栓塞

- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 短暂性脑缺血发作

8、单项选择题：下列哪项不符合小舞蹈病（ ）。A. 成年发病

- B. 有风湿热表现
- C. 舞蹈样动作
- D. 可有共济失调
- E. 常有精神症状

9、单项选择题：男患，21岁，因“发热、头痛伴恶心、呕吐2天”入院。神经系统查体无阳性体征。腰穿检查：脑脊液压力180mmH₂O，脑脊液无色透明，糖、氯化物正常，蛋白0.65g/L，白细胞68×10⁶/L，淋巴细胞94%，单核细胞6%。该患者最可能的诊断是（ ）。A. 带状疱疹病毒性脑炎

- B. 病毒性脑膜炎
- C. 单纯疱疹病毒性脑炎
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 结核性脑膜炎

10、单项选择题：脊髓空洞症痛温觉障碍常分布为（ ）。A. 短上衣样

- B. 偏侧半身
- C. 周围型
- D. 单肢型
- E. 交叉型

11、单项选择题：女患，15岁，因“头痛、呕吐伴寒战、高热2天”入院。查体：体温40℃，脑膜刺激征阳性。头颅CT：未见异常。血常规：白细胞16.7×10⁹/L，中性粒细胞90%。腰穿：脑脊液压力240mmH₂O，脑脊液外观灰白色混浊，糖1.9mmol/L，氯化物114mmol/L，蛋白2.8g/L，白细胞7200×10⁶/L，中性粒细胞92%，淋巴细胞6%，单核细胞2%，该患者最可能的诊断是（ ）。A. 单纯疱疹病毒性脑炎

- B. 结核性脑膜炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 新型隐球菌脑膜炎
- E. 病毒性脑膜炎

12、单项选择题：原发性三叉神经痛的哪支发生率最高（ ）。A. 第2支

- B. 第2、3支
- C. 第1、2支
- D. 第1、3支
- E. 第3支的运动支

13、单项选择题：椎-基底动脉血栓形成不出现以下哪个症状（ ）。A. 眩晕

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/078025127107006063>