

2024 年安徽省《执业药师之西药学专业二》 考试必背 200 题完整版及参考答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2015 年真题）阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致的不良反应是（ ）。

- A: 便秘
- B: 胆绞痛
- C: 躁狂
- D: 低血压

答案：D

2. 不宜口服给药的是

- A: 硝酸甘油
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 胍乙啶

答案：A

3. 噻嗪类利尿药中，属于水溶性的药物是（ ）

- A: 氢氟噻嗪
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氯噻嗪
- D: 苄噻嗪

答案：C

4. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 尿激酶
- B: 瑞替普酶
- C: 链激酶
- D: 阿替普酶

答案：C

5. 治疗青光眼宜选用

- A: 碘苷滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 氯霉素滴眼剂
- D: 托吡卡胺滴眼剂

答案：B

6. 对于丝裂霉素注意事项的描述，错误的是

- A: 长期应用可抑制卵巢及睾丸功能，造成闭经或精子缺乏
- B: 只需要在用药期间密切监测血常规、肾功能
- C: 老年患者及肾功能不全者慎用
- D: 溶解后尽快使用，尽量避免同低 pH 的注射液配伍

答案：B

7. 禁用于妊娠期高血压疾病者的是

- A: 氯化钠
- B: 氯化钙
- C: 氯化钾
- D: 硫酸镁

答案：A

8. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

- A: 尽量选择三价铁
- B: 选择适宜的病期、疗程和监测
- C: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离
- D: 注意预防铁负荷过重

答案：A

9. 对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

- A: 庆大霉素
- B: 红霉素
- C: 阿昔洛韦
- D: 咪康唑

答案：D

10. β -内酰胺类抗生素的抗菌机制是

- A: 抑制蛋白质合成的全过程
- B: 抑制细菌细胞壁的合成
- C: 影响胞浆膜的通透性
- D: 影响叶酸代谢

答案：B

11. (2018 年真题) 中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是()

- A: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药
- B: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

C: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案: C

12. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者, 在服用镇咳药的同时, 应及时联合应用的药品是

A: 泼尼松龙

B: 多索茶碱

C: 羧甲司坦

D: 左氧氟沙星

答案: C

13. 属于抗孕激素药, 用于终止早孕的是

A: 左炔诺孕酮

B: 黄体酮

C: 甲地孕酮

D: 米非司酮

答案: D

14. 患者, 女, 54 岁, 诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后, 病理示: 右乳浸润性导管癌 II 级, 同侧腋下淋巴结 1/18, 免疫组化: ER(-), PR(-), Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多西他赛的描述, 错误的是

A: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同

B: 在相当剂量下, 抗肿瘤作用比紫杉醇高 1 倍

C: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成

D: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

答案：A

15. 毛果芸香碱的作用特点不包括

A: 收缩睫状肌，使小梁网眼张开

B: 减少房水生成

C: 开放前房角降低眼压

D: 缩小瞳孔，拉紧虹膜

答案：B

16. 下列关于抗 M 胆碱药作用特点的描述中，错误的是

A: 不同药物作用效能基本一致

B: 作用时间短

C: 使用眼膏剂可减少药物全身吸收

D: 可散大瞳孔，麻痹睫状肌

答案：A

17. 有关奎尼丁药理作用的叙述，正确的是

A: 可使正常窦房结自律性降低明显

B: 竞争性拮抗 N 受体，有抗胆碱作用

C: 直接作用于心肌，中度抑制 Na^+ 内流

D: 可缩短动作电位时程

答案：C

18. (2018 年真题) 因抑制血管内皮的前列腺素的生成, 使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是 ()

A: 双氯芬酸

- B: 吲哚美辛
- C: 塞来昔布
- D: 阿司匹林

答案：C

19. 仅用于绝经后妇女,不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是()

- A: 阿仑磷酸钠
- B: 骨化三醇
- C: 雷洛昔芬
- D: 阿法骨化醇

答案：C

20. (2017 年真题)可引起双硫仑样反应 ()

- A: 甲硝唑
- B: 哌拉西林
- C: 米诺环素
- D: 左氧氟沙星

答案：A

21. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0. 5g，一日 3 次；阿卡波糖 0. 1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 高钾血症
- B: 高尿酸血症
- C: 高钠血症
- D: 高镁血症

答案：B

22. 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素（NA）再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 吗氯贝胺
- B: 阿米替林
- C: 舍曲林
- D: 度洛西汀

答案：D

23. 下列关于 5 α -还原酶抑制剂的描述，错误的是()

- A: 与 α 1 受体阻断药相比，更易引起性功能障碍
- B: 对膀胱颈和平滑肌没有作用
- C: 可引起前列腺上皮细胞萎缩
- D: 作用是不可逆的

答案：D

24. 对四环素不敏感的病原体是()

- A: 肺炎支原体
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 螺旋体
- D: 肺炎衣原体

答案：B

25. 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162/80mmHg，心率 72 次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 双氯芬酸
- B: 碳酸钙 D
- C: 辛伐他汀
- D: 氨基葡萄糖

答案：A

26. 肾结石患者禁用的药物是()

- A: 苯溴马隆
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 非布索坦

答案：A

27. 临床上用于控制子痫发作的是

- A: 卡巴西平
- B: 硫酸镁
- C: 苯妥英钠
- D: 苯巴比妥

答案：B

28. 通过影响疟原虫红内期的超微结构，阻断了疟原虫营养摄取的药物是

- A: 吡喹酮
- B: 乙胺嘧啶
- C: 奎宁
- D: 青蒿素

答案：D

29. (2015 年真题) 辅助治疗不孕症的维生素是 ()。

- A: 维生素 B2
- B: 烟酸
- C: 维生素 E
- D: 维生素 B5

答案: C

30. 以下泻药中，半乳糖血症患者禁用的是

- A: 乳果糖
- B: 硫酸镁
- C: 液状石蜡
- D: 酚酞

答案: A

31. 长期使用糖皮质激素不会导致

- A: 高血压
- B: 糖尿病
- C: 骨质疏松
- D: 高钾血症

答案: D

32. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

- A: 他莫昔芬
- B: 氯丙嗪
- C: 维生素 C
- D: 红霉素

答案: A

33. 通过抑制 GABA 的降解或促进合成而达到抗癫痫作用的药物是

- A: 二苯并氮革类
- B: 脂肪酸类
- C: 乙内酰脲类
- D: γ -氨基丁酸类似物

答案：B

34. 治疗普通型奈瑟球菌脑膜炎是()

- A: 柳氮磺吡啶
- B: 磺胺嘧啶
- C: 磺胺米隆
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：B

35. 治疗轻度或中度原发性或肾性高血压宜选用

- A: 硝苯地平
- B: 肼屈嗪
- C: 普萘洛尔
- D: 卡托普利

答案：D

36. 硫脲类最重要的不良反应是

- A: 粒细胞下降
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 血管神经性水肿
- D: 甲状腺素

答案：A

37. 以下药物中，不属于眼用局麻药的是()

- A: 丁卡因
- B: 奥布卡因
- C: 阿托品
- D: 利多卡因

答案：C

38. 属于润滑性泻药的是

- A: 甘油（开塞露）
- B: 酚酞
- C: 乳果糖
- D: 聚乙二醇 4000

答案：A

39. 耐青霉素酶青霉素类的是

- A: 苯唑西林
- B: 氨苄西林
- C: 哌拉西林
- D: 青霉素 V

答案：A

40. NSAID 镇痛抗炎的作用机制是

- A: 抑制环氧酶
- B: 抑制 MAO
- C: 对抗前列腺素的作用
- D: 减少前列腺素的释放

答案：A

41. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 阿卡波糖
- B: 艾塞那肽
- C: 瑞格列奈
- D: 罗格列酮

答案：A

42. (2016 年真题) 服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血，需同时联合使用的药品是

- A: 维生素 B2
- B: 维生素 B1
- C: 维生素 B12
- D: 依诺肝素

答案：C

43. 关于乙酰半胱氨酸的说法，错误的是()

- A: 对痰液较多的患者，乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效
- B: 乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键，使浓痰易于咳出
- C: 乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类四环素类药物的抗菌活性
- D: 乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救

答案：A

44. 复方地芬诺酯是

- A: 微生态制剂
- B: 吸附剂
- C: 抗分泌药

D: 抗动力药

答案：D

45. 抑制 H^+ , K^+ -ATP 酶活性的药物是

A: 雷尼替丁

B: 哌仑西平

C: 奥美拉唑

D: 氢氧化铝

答案：C

46. 属于促分泌药，通过刺激肠液分泌，促进排便的药物是()

A: 番泻叶

B: 欧车前

C: 多库酯钠

D: 利那洛肽

答案：D

47. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A: 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液，情况稳定后可更换为口服补液盐治疗

B: 口服补液盐使用方便、价格低廉，发生腹泻时如能口服，应尽早使用

C: 口服补液盐是复方制剂，I、II 代表不同的配方

D: 口服补液盐 II 是等渗性口服补液盐

答案：D

48. 代谢产物为选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂的药物是

- A: 阿糖腺苷
- B: 干扰素
- C: 阿昔洛韦
- D: 奥司他韦

答案：D

49. (2015 年真题) 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是 ()。

- A: 雷尼替丁
- B: 双氯芬酸
- C: 硝苯地平
- D: 格列齐特

答案：B

50. 可引起前庭功能失调 (眩晕) 的抗菌药物是

- A: 哌拉西林
- B: 米诺环素
- C: 甲硝唑
- D: 左氧氟沙星

答案：B

51. 组胺 H

- A: 雷尼替丁 > 西咪替丁 > 法莫替丁
- B: 雷尼替丁 > 法莫替丁 > 西咪替丁
- C: 法莫替丁 > 雷尼替丁 > 西咪替丁

D: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁

答案: C

52. 使用氨基己酸可导致

A: 高胆红素血症

B: 肺动脉高压

C: 支气管痉挛

D: 血栓形成

答案: D

53. 下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

A: 妥布霉素

B: 新霉素

C: 卡那霉素

D: 链霉素

答案: B

54. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

A: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用

B: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小

C: 可使用大环内酯类药物如红霉素

D: 依诺沙星可抑制茶碱代谢

答案: C

55. 对红霉素的描述，下列不正确的是()

A: 属繁殖期杀菌剂

B: 抗菌谱与青霉素相似但略广

C: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

D: 具有肝脏毒性

答案：A

56. 局部抗炎作用较弱的长效糖皮质激素是

A: 氢化可的松

B: 地塞米松

C: 倍他米松

D: 泼尼松

答案：B

57. 强心苷中毒最早出现的症状是

A: 眩晕、乏力和视力模糊

B: 厌食、恶心和呕吐

C: 房室传导阻滞

D: 色视

答案：B

58. 关于复方氢氧化镁的叙述，下列哪项是正确的

A: 口服易吸收

B: 不影响排便

C: 对溃疡面有保护作用

D: 中和胃酸作用强而迅速

答案：D

59. 可使维生素 B6 在体内的活性降低的是

A: 异烟肼

B: 雌激素

C: 糖皮质激素

D: 丙磺舒

答案: B

60. 属于孕激素类的是()

A: 己烯雌酚

B: 甲羟孕酮

C: 睾酮

D: 他莫昔芬

答案: B

61. 患者，男，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟呼吸急促、面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

A: 青霉素本身诱导机体发生变态反应

B: 青霉素的降解产物诱导机体发生变态反应

C: 青霉素加速抗原抗体结合

D: 青霉素促进机体释放组胺、白三烯等致敏原

答案: B

62. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

A: 异维 A 酸

B: 过氧苯甲酰

C: 维 A 酸

D: 阿达帕林

答案: A

63. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润行导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是()

- A: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用
- B: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星
- C: 典型不良反应为骨髓抑制和心脏毒性
- D: 属于蒽环类抗肿瘤药物

答案：B

64. 下述关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是()

- A: 可导致皮肤干燥
- B: 为强还原剂，极易分解
- C: 可杀灭痤疮丙酸杆菌
- D: 可分解出新生态氧而发挥作用

答案：B

65. 属于留钾利尿药的是

- A: 布美他尼
- B: 依他尼酸
- C: 托拉塞米
- D: 依普利酮

答案：D

66. 目前治疗肺孢子菌病首选的药物是

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 卡泊芬净
- C: 氟曲南

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 特比萘芬

答案: A

67. 治疗绝经后妇女的骨质疏松症可选用 ()

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 依降钙素
- C: 阿法骨化醇
- D: 阿仑膦酸钠

答案：D

68. 下列属于短效糖皮质激素的是

- A: 氢化可的松
- B: 甲泼尼龙
- C: 泼尼松龙
- D: 泼尼松

答案：A

69. 长期服用呋塞米易发生的不良反应是 ()

- A: 低尿酸血症
- B: 低钾血症
- C: 高氯血症
- D: 高钠血症

答案：B

70. 可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

- A: 西妥昔单抗
- B: 贝伐单抗
- C: 利妥昔单抗
- D: 英夫利昔单抗

答案：C

71. 孟鲁司特的作用机制是

- A: 阻断 M 受体
- B: 抑制磷酸二酯酶
- C: 阻断 α 受体
- D: 阻断白三烯受体

答案：D

72. 能使凝血因子 I 降解为纤维蛋白单体的药物是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 卡巴克络
- C: 蛇毒血凝酶
- D: 甲苯氢醌

答案：C

73. 患者,男,64 岁因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院,血压 203/110mmHg,该患者宜首选(如果疗程超过 72 小时需密切监测血中硫酸盐水平)的降压药物是

- A: 贝那普利
- B: 硝普钠
- C: 美托洛尔
- D: 氨氯地平

答案：B

74. 治疗慢性心力衰竭,ACEI 和()联合有协同作用。

- A: β 受体阻断剂
- B: 人促红素
- C: 噻嗪类利尿剂

D: 留钾利尿剂

答案：A

75. 患者，女性，62 岁，有高血压病史 14 年，伴变异性心绞痛，最近频繁发生阵发性室上性心动过速，宜选用

A: 维拉帕米

B: 尼莫地平

C: 硝苯地平

D: 普萘洛尔

答案：A

76. 可用于治疗伤寒的药物是

A: 氟喹诺酮类

B: 氨基糖苷类

C: 青霉素类

D: 四环素类

答案：A

77. 糖尿病患者应慎用的高效能利尿剂是()

A: 乙酰唑胺

B: 阿米洛利

C: 呋塞米

D: 氢氯噻嗪

答案：C

78. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

A: 可诱发闭角型青光眼

B: 可给予拟胆碱类药物解毒

C: 滴眼后不应压迫泪囊

D: 哺乳期慎用

答案: C

79. 控制哮喘急性发作的首选药是

A: 磷酸二酯酶抑制剂

B: M 胆碱受体阻断剂

C: β 受体激动剂

D: 白三烯受体阻断剂

答案: C

80. 在妊娠期，尤其是妊娠末期或分娩期不宜应用，易发生"灰婴综合征"的药物是()

A: 四环素

B: 多西环素

C: 青霉素

D: 氯霉素

答案: D

81. 竞争性抑制胃肠道的 α 葡萄糖苷酶活性, 减慢肠道内多糖、寡糖或双糖的降解从而延缓单糖的吸收, 可降低餐后血糖的药物是 ()

A: 吡格列酮

B: 格列吡嗪

C: 伏格列波糖

D: 二甲双胍

答案: C

82. (2020 年真题) 患者，男，60 岁。入院诊断为：高胆固醇血症、支原体肺炎。医师拟选用克拉霉素治疗支原体肺炎，同时需进行调血脂治疗，不宜与克拉霉素合用的调血脂药是

- A: 氟伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 非诺贝特
- D: 辛伐他汀

答案：D

83. 属于硝基呋喃类的是()

- A: 夫西地酸
- B: 甲硝唑
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 呋喃妥因

答案：D

84. 应用阿托品治疗肠痉挛引起口干、心悸、排尿困难是药物的

- A: 毒性反应
- B: 副作用
- C: 继发反应
- D: 变态反应

答案：B

85. 多日化疗所致恶心及呕吐的药物预防方案是

- A: 建议用单一药物，如地塞米松、5-HT₃ 受体阻断剂或多巴胺受体阻断剂(如甲氧氯普胺)预防呕吐
- B: 在化疗期间每日使用 HT₃ 受体阻断剂，地塞米松应连续使用至化疗结束后 2~3 天，必要时可以考虑加入阿瑞匹坦

C: 推荐第 1 天采用 5-HT₃ 受体阻断剂联合地塞米松，第 2 和第 3 天继续使用地塞米松

D: 推荐化疗前用三药方案，包括单剂量 5-HT₃ 受体阻断剂、地塞米松和 NK-1 受体阻断剂

答案：B

86. 对肾功能影响较小的抗高血压药是

A: 利血平

B: 肼屈嗪

C: 胍乙啶

D: 卡托普利

答案：B

87. 糖尿病合并轻中度肾功能不全者可选用()

A: 格列齐特

B: 胰岛素

C: 格列吡嗪

D: 格列喹酮

答案：D

88. ACEI 与()联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用。

A: 人促红素

B: 噻嗪类利尿剂

C: 留钾利尿剂

D: β 受体阻断剂

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

89. 肝素过量可选用的拮抗药是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/078035026046007022>