

# 病案分析

郭某某，14岁，未婚。


初诊：1983年2月2日。12岁月经初潮，周期尚准，量中无痛。13岁一次剧烈运动后饮冷至今经量减少，此后每转腹痛。末次月经1月1日，近日腹胀隐痛，舌淡红，苔薄腻，脉沉细。

诊断？ 理法方药？

痛 经



# 月经周期



# 痛经



概念

---



病因病机

---



诊断及鉴别诊断

---



辩证论治

---

# 概念



妇女凡在经期或行经前后出现**周期性**小腹疼痛，或痛引腰骶，甚至**剧痛**晕厥，称为痛经。

痛经的分类

**原发性痛经**

**继发性痛经**

指生殖器官无器质性病变的痛经，多见于青年妇女，又称功能性痛经。

育龄妇女。

# 思考

- 
- 1.所有的经期女生都会痛经吗？
  - 2.那什么样女生更容易出现痛经呢？


# 病因病机



中医病因病机

虚-不荣则痛



实-不通则痛




西医发病机理



# 病因病机



# 病因病机







## 原发性痛经

- 1、前列腺素释放增多，使子宫平滑肌收缩，产生下腹痉挛性绞痛，当子宫平滑肌过度收缩造成子宫供血不足，甚至引起子宫缺血，导致厌氧物质积贮，刺激疼痛神经元而发生痛经
- 2、精神、神经因素的影响

诊断要点

```
graph TD; A[诊断要点] --- B[病史]; A --- C[症状]; A --- D[检查];
```

病史

症状

检查

# 诊断要点

---

## 1. 病史

经行小腹疼痛, 伴随月经周期规律性发作  
可伴不孕、盆腔炎、或宫腔手术史。

## 2. 症状

- 腹痛多发生于行经第1~2天或经期前1~2天
- 可呈阵发性痉挛性或胀痛下坠感，疼痛可引及全腹或腰骶部，或外阴、肛门坠痛
- 严重者可出现面色苍白、出冷汗、手足发凉等晕厥现象。
- 疼痛程度虽有轻有重，但一般无腹肌紧张或反跳痛
- 偶有经行腹痛延续至经净或于经净后1~2天始发病的。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/078057125077006054>