

2024 河北省《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题完整题库（各地真题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭(肌酐清除率 $<30\text{ml/min}$)时可作为首选治疗的利尿药为()

- A: 噻嗪类利尿药
- B: 碳酸酐酶抑制剂
- C: 袢利尿药
- D: 留钾利尿药

答案：C

2. 有关维生素 K 的描述，错误的是

- A: 对于应用链激酶所致出血有特效
- B: 维生素 K
- C: 天然维生素 K 为脂溶性
- D: 参与凝血因子的合成

答案：A

3. 痛风急性发作时首选的药物是

- A: 秋水仙碱
- B: 苯溴马隆
- C: 非布司他
- D: 碳酸氢钠

答案：A

4. 属于耐酸耐酶的青霉素类药物是()

- A: 丙匹西林
- B: 阿莫西林
- C: 甲氧西林
- D: 青霉素

答案：C

5. 羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂简称为他汀类药，其与羟甲基戊二酰辅酶 A 的结构相似，且对羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶（HMG—CoA 还原酶）的亲合力更大，对该酶产生竞争性的抑制作用，结果使血总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL）和载脂蛋白（Apo）B 水平降低，对动脉粥样硬化和冠心病的防治产生作用。

- A: 阿托伐他汀
- B: 瑞舒伐他汀
- C: 普伐他汀
- D: 辛伐他汀

答案：D

6. 布美他尼属于下列哪类利尿药

- A: 保钾利尿药
- B: 碳酸酐酶抑制药
- C: 强效利尿药
- D: 中效利尿药

答案：C

7. 维生素 B12 主要用于治疗的疾病是

- A: 慢性失血性贫血
- B: 缺铁性贫血

C: 巨幼细胞性贫血

D: 再生障碍性贫血

答案：C

8. 肾功能不全者不需要调整剂量的药物是

A: 红霉素

B: 氯霉素

C: 青霉素

D: 罗红霉素

答案：A

9. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

A: 碘化钾

B: 普萘洛尔

C: 特布他林

D: 利多卡因

答案：B

10. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

A: 肝功能

B: 尿量

C: 肾功能

D: 电解质

答案：D

11. 使用多塞平治疗无效时可换用的抗抑郁药是

- A: 阿米替林
- B: 氯米帕明
- C: 丙米嗪
- D: 吗氯贝胺

答案：D

12. 在肠内吸收水分后膨胀形成胶体，使肠内容物变软，体积增大，反射性增加肠蠕动而刺激排便的是

- A: 甘油
- B: 乳果糖
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 酚酞

答案：C

13. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC3.

$0 \times 10^{12} / L$ ，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，

MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 服用铁剂时可以喝果汁，但不能喝牛奶
- B: 口服型铁剂服用时间还根据个体反应而定
- C: 维生素 C 与本品同服，有利于吸收
- D: 进食促进铁剂的吸收

答案：D

14. 抗血小板药西洛他唑属于

- A: 维生素 K 拮抗剂
- B: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 整合素受体阻断剂

答案：C

15. 下列有关奎尼丁的叙述，不正确的是

- A: 抑制 Na⁺内流和 K⁺外流
- B: 可用于强心苷中毒
- C: 可用于治疗心房扑动和心房颤动
- D: 具有抗胆碱和仅受体阻断作用

答案：B

16. 与肝素相比，华法林的作用特点不包括

- A: 口服有效，应用方便
- B: 作用持久
- C: 价格便宜
- D: 起效快

答案：D

17. 不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

- A: 甲苯磺丁脲
- B: 二甲双胍
- C: 苯乙双胍
- D: 阿卡波糖

答案：B

18. 可用于防治泌尿系统结石的是

- A: 氯化钠
- B: 氯化钾
- C: 氯化钙
- D: 枸橼酸钾

答案：D

19. 以下药物肾结石患者禁用的是

- A: 非布司他
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 苯溴马隆

答案：D

20. 抗炎效能最大的糖皮质激素是

- A: 地塞米松
- B: 氢化可的松
- C: 氟氢可的松
- D: 甲泼尼龙

答案：A

21. 胃肠道不良反应较轻的是

- A: 硫酸亚铁片
- B: 琥珀酸亚铁胶囊
- C: 硫酸亚铁缓释片
- D: 硫酸亚铁糖浆

答案：C

22. 慢性外耳道炎时局部滴用，促使耳道干燥，可选用

- A: 3%硼酸乙醇
- B: 赛洛唑啉
- C: 伪麻黄碱
- D: 2%酚甘油

答案：A

23. 主要治疗躁狂症，对躁狂和抑郁交替发作的双相情感性精神障碍有很好的治疗和预防的药物是

- A: 阿立哌唑
- B: 利培酮
- C: 碳酸锂
- D: 氯氮平

答案：C

24. 双香豆素与维生素 K

- A: 产生协同作用
- B: 竞争性对抗
- C: 与其竞争结合血浆蛋白
- D: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

答案：B

25. (2019 年真题) 注射用奥沙利铂的溶媒选择要求是 ()

- A: 5%葡萄糖注射液稀释
- B: 先用氯化钠注射液溶解，再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- C: 氯化钠注射液稀释
- D: 先用乳酸钠注射液溶解，再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释

答案：A

26. (2016 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是

- A: 乳酸脱氢酶
- B: 尿淀粉酶
- C: 肌酸激酶
- D: 碱性磷酸酶

答案：C

27. 对地高辛轻度中毒者可及时停药及使用

- A: 苯妥英钠
- B: 氯化钾、葡萄糖注射液
- C: 利尿剂
- D: 阿托品

答案：C

28. 严格控制用药剂量和用药时间可以避免产生

- A: 继发反应
- B: 变态反应
- C: 毒性反应
- D: 副作用

答案：C

29. 主要作用于聚合态的微管，抑制微管解聚

- A: 氟尿嘧啶
- B: 顺铂
- C: 高三尖杉酯碱

D: 紫杉醇

答案：D

30. 以下哪项不是糖皮质激素的不良反应

A: 诱发癫痫

B: 伤口愈合缓慢

C: 电解质紊乱

D: 心律失常

答案：D

31. 下述关于甘油的描述，错误的是

A: 属于润滑性泻药

B: 属于渗透性泻药

C: 用于便秘的治疗

D: 妊娠期妇女慎用

答案：B

32. 阿昔洛韦的作用靶点是

A: 神经氨酸酶

B: 脱氧核糖核酸聚合酶

C: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

D: HIV-1 反转录酶

答案：B

33. 用于疥疮和阴虱病的药物是()

A: 林旦

B: 硼酸

C: 过氧苯甲酰

D: 维 A 酸

答案：A

34. 雷尼替丁与硫糖铝合用

A: 可升高合用药物的血浆药物浓度

B: 出现呼吸抑制或停止

C: 使后者药效降低

D: 减慢药物代谢速度

答案：C

35. 下列钙通道阻滞剂中可用于治疗心律失常的是

A: 维拉帕米

B: 拉西地平

C: 左旋氨氯地平

D: 硝苯地平

答案：A

36. 可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

A: 葡萄糖注射液

B: 二磷酸果糖注射液

C: 乳酸钠注射液收售，

D: 门冬氨酸钾镁注射液

答案：B

37. (2021 年真题) 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

A: 双嘧达莫

B: 氯吡格雷

C: 利伐沙班

D: 替格瑞洛

答案: C

38. 小剂量用于妊娠期妇女预防胎儿神经管畸形的是

A: 叶酸

B: 烟酸

C: 维生素 B12

D: 维生素 B6

答案: A

39. 属于促凝血因子合成的药物是()

A: 卡巴克络

B: 蛇毒血凝酶

C: 甲苯氢醌

D: 鱼精蛋白

答案: C

40. 属于选择性 5-HT

A: 甲氧氯普胺

B: 莫沙必利

C: 多潘立酮

D: 昂丹司琼

答案: B

41. 对小肠和结肠平滑肌无明显作用的促胃肠动力药是

A: 伊托必利

- B: 西沙比利
- C: 多潘立酮
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

42. 应用华法林时，为掌握好剂量，应测定

- A: 出血时间
- B: 部分凝血活酶时间
- C: 凝血酶原时间
- D: 凝血时间

答案：C

43. 奥美拉唑属于

- A: M 受体拮抗药
- B: H₂ 受体拮抗药
- C: H⁺, K⁺-ATP 酶抑制剂
- D: 胃泌素受体拮抗药

答案：C

44. 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

- A: 金刚烷胺
- B: 更昔洛韦
- C: 恩替卡韦
- D: 阿昔洛韦

答案：C

45. 主要抑制排卵的短效口服避孕药是()

- A: 苯丙酸诺龙

B: 丙酸睾酮

C: 复方炔诺酮

D: 炔诺酮

答案: C

46. 可拮抗维生素 B6 或增加维生素 B6 经肾脏排泄，引起贫血或周围神经炎的是

A: 雌激素

B: 丙磺舒

C: 糖皮质激素

D: 异烟肼

答案: D

47. 可用于烧伤及伤后感染的是

A: 磺胺米隆

B: 磺胺嘧啶

C: 磺胺甲噁唑

D: 柳氮磺吡啶

答案: A

48. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是()

A: 维生素 K

B: 硫酸鱼精蛋白

C: 氨甲苯酸

D: 维生素

答案: B

49. 下列属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断药的是()

- A: 阿司匹林
- B: 双嘧达莫
- C: 氯吡格雷
- D: 阿替普酶

答案：C

50. 需尽快建立一个肠道正常菌群，宜用

- A: 双歧杆菌
- B: 酪酸菌
- C: 地芬诺酯
- D: 双歧三联活菌胶囊

答案：D

51. 与碳酸氢钠等碱性药物并用，能引起尿液及粪便变色的是

- A: 乳果糖
- B: 开塞露
- C: 酚酞
- D: 聚乙二醇 4000

答案：C

52. 应用强心苷或停用后 7 日内禁用

- A: 枸橼酸钾
- B: 氯化钾
- C: 氯化钠
- D: 氯化钙

答案：D

53. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 服药过程中适当补充维生素 B12
- B: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- C: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- D: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水

答案：D

54. 氯化钾的禁忌证是

- A: 急、慢性肾功能不全
- B: 急性脱水
- C: 应用强心苷类药
- D: 妊娠期高血压疾病

答案：A

55. (2015 年真题) 服用时必须保持坐位或立位、空腹、服后 30 分钟内不宜进食和卧床的药品是 ()。

- A: 依降钙素
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 雷洛昔芬
- D: 依普黄酮

答案：B

56. 是第一个 P2Y₁₂ 拮抗剂，可抑制血小板聚集的是 ()

- A: 噻氯匹定
- B: 华法林
- C: 尿激酶
- D: 肝素

答案：A

57. (2017 年真题) 治疗青光眼宜选用 ()

- A: 氯霉素滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 碘苷滴眼剂

答案：B

58. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 格雷司琼
- C: 阿瑞吡坦
- D: 甲地孕酮

答案：B

59. 袢利尿药中，静脉给药维持时间最长的是 ()

- A: 依他尼酸
- B: 布美他尼
- C: 托拉塞米
- D: 呋塞米

答案：C

60. 红霉素的抗菌作用机制

- A: 影响胞浆膜通透性
- B: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性
- C: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- D: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

答案：C

61. 下列属于非选择性 β 受体阻断剂的是

- A: 比索洛尔
- B: 普萘洛尔
- C: 阿替洛尔
- D: 美托洛尔

答案：B

62. 不属于氟喹诺酮类的药物是

- A: 依诺沙星
- B: 莫西沙星
- C: 环丙沙星
- D: 小檗碱

答案：D

63. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是（）

- A: 马普替林
- B: 吗氯贝胺
- C: 帕罗西汀
- D: 度洛西汀

答案：C

64. 属于 DPP-4 抑制剂的药物是

- A: 那格列奈
- B: 伏格列波糖
- C: 利拉鲁肽
- D: 阿格列汀

答案：D

65. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案正确的是

- A: 鼓膜穿孔前用无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用 2%酚甘油滴耳序贯治疗
- B: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- C: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道以防止进一步感染
- D: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

答案：B

66. 金刚烷胺与阿托品合用

- A: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- B: 增加肾毒性
- C: 可增加抗胆碱不良反应的危险
- D: 增加锥体外系不良反应的风险

答案：C

67. (2021 年真题) 患者，男，65 岁。患有 2 型糖尿病，长期服用降糖药，同时长期服用阿司匹林肠溶片 (100mg/d) 预防心脑血管疾病。近期拟行髋关节置换手术，为减少出血风险，宜采取的措施是 ()。

- A: 无需停用阿司匹林，也无需加用其他药物预防出血
- B: 停用阿司匹林 7-10 天后，再行手术
- C: 无需停用阿司匹林，在手术日加用维生素 K1 预防出血
- D: 停用阿司匹林 3 天后，再行手术

答案：B

68. (2016 年真题) 属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是

- A: 噻吗洛尔
- B: 乙酰唑胺
- C: 毛果芸香碱
- D: 甘露醇

答案: A

69. 属于抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶，阻碍核酸合成的抗疟药物是

- A: 奎宁
- B: 乙胺嘧啶
- C: 青蒿素
- D: 吡喹酮

答案: B

70. 硫脲类药物的不良反应不包括()

- A: 发热
- B: 过敏反应
- C: 粒细胞减少
- D: 诱发甲亢

答案: D

71. 头孢类药物作用机制

- A: 干扰细菌核酸代谢
- B: 抑制细菌细胞壁合成
- C: 抑制细菌蛋白质合成
- D: 抑制细菌糖代谢

答案: B

72. (2016 年真题) 属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是

- A: 阿瑞吡坦
- B: 托烷司琼
- C: 甲氧氯普胺
- D: 维生素 B6

答案: A

73. (2018 年真题) 可用于治疗非何杰金 (非霍奇金) 淋巴瘤的单克隆抗体是 ()

- A: 西妥昔单抗
- B: 贝伐珠单抗
- C: 利妥昔单抗
- D: 曲妥珠单抗

答案: C

74. 羟甲唑啉滴鼻剂使用期间, 可能发生的不良反应是

- A: 鼻衄
- B: 流量
- C: 血压下降
- D: 心率加快

答案: D

75. 主要用于控制疟疾症状的药物是

- A: 吡喹酮
- B: 乙胺嘧啶
- C: 甲硝唑
- D: 氯喹

答案：D

76. 可以与青霉素 G 混合的是

- A: 维生素 C
- B: 葡萄糖注射液
- C: 生理盐水
- D: 维生素 B 族

答案：C

77. 布地奈德皮下给药的效能约为皮质醇的

- A: 40 倍
- B: 100 倍
- C: 25 倍
- D: 15 倍

答案：A

78. 抗酸作用较强、慢而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多的是

- A: 三硅酸镁
- B: 氢氧化镁
- C: 碳酸钙
- D: 氢氧化铝

答案：C

79. 用于阵发性室上性心动过速的钙通道阻滞药是

- A: 维拉帕米
- B: 胺碘酮
- C: 苯妥英钠
- D: 利多卡因

答案：A

80. 易导致牙齿黄染的药品是

- A: 头孢哌酮
- B: 加替沙星
- C: 多西环素
- D: 庆大霉素

答案：C

81. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的调节血脂药是()

- A: 烟酸
- B: 辛伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 依折麦布

答案：B

82. 作用机制是表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的是

- A: 枸橼酸他莫昔芬
- B: 巯嘌呤
- C: 吉非替尼
- D: 紫杉醇

答案：C

83. 下述利尿药中，不宜与氨基糖苷类抗生素合用的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 氨苯蝶啶
- D: 呋塞米

答案：D

84. 为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片中含有

- A: 维生素 B6
- B: 雌二醇
- C: 去氧孕烯
- D: 炔雌醇

答案：A

85. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是()

- A: 维拉帕米
- B: 胺碘酮
- C: 地尔硫
- D: 美托洛尔

答案：B

86. 有肾功能不全史的患者解热镇痛应慎用布洛芬，其主要原因是用药后可能发生

- A: 急性肾衰竭
- B: 重度肝损伤
- C: 过敏反应
- D: 尿潴留和水肿

答案：D

87. (2017 年真题) 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/078127057042007022>