北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试答案》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：Perthes 病最多发于（　）。A. 4～8 岁男孩

B. 8～12 岁女孩

C. 2～4 岁儿童

D. 4～8 岁女孩

E. 8～12 岁男孩

2、单项选择题：人工髋关节置换时，髋臼前倾角应为（　）。A. 40～50

B. 大于 60

C. 小于 40

D. 40～60

E. 10～15

3、单项选择题：尺神经损伤后出现爪状畸形的机制是（　）。A. 指深屈肌腱的尺侧半由尺神经供应，尺神经损伤后 3、4 指深屈肌腱功能障碍出现爪状

B. 示指及中指不呈爪状是因为支配二指的指深屈肌受正中神经支配

C. 主要是因为手内肌的损伤，出现掌指关节过伸，指间关节屈曲所致

D. 主要是因为手内肌的损伤，出现掌指关节屈曲，指间关节过伸所致

E. 以上说法均不正确

4、单项选择题：女性肘关节提携角为（　）。A. 1～5

B. 6～9

C. 10～15

D. 16～19

E. 20～25

5、单项选择题：有关腰间盘突出症的表现，下列哪项不正确（　）。A. 可以没有外伤史

B. 可以没有腱反射的改变

C. 不会有排尿困难

D. 疼痛可因咳嗽加重

E. 健侧下肢直腿抬高也可引起疼痛

6、单项选择题：男，6 岁，左小腿近端痛 1 个月，进行性加重，各方面检查提示左胫骨上端骨肉瘤，外周血化验中发现哪一条最支持诊断（　）。A. 本周蛋白（+）

B. 血沉加快

C. 血中碱性磷酸酶升高

D.血中白细胞计数升高

E.血中酸性磷酸酶升高

7、单项选择题：病人膝关节轻度屈曲时胫骨前方受到外力，伤后膝关节疼痛、肿胀，X线片发现胫骨平台前方有游离骨块，前抽屉试验阳性，常用的手术内固定方法是（　）。A.螺钉固定

B.钢丝固定

C.克氏针固定

D.摘除游离骨块

E.以上都不是

8、单项选择题：骨髓瘤可采取的治疗方法为（　）。A.放射治疗

B.化学治疗

C.手术治疗

D.放射治疗+手术治疗

E.化学治疗+手术治疗

9、单项选择题：男孩，8岁，左大腿下端肿痛。查体：体温39.5℃，局部皮温高，深压痛，穿刺抽出少量脓性液体，进一步治疗中，下列哪项是最关键的（　）。A.联合应用大剂量抗生素

B.患肢制动

C.全身支持疗法，注意水电解质平衡

D.局部减压引流

E.避免外伤骨折

10、单项选择题：男性，28岁，腰背痛10年，开始时腰骶部疼痛向双臀部放射。曾在县医院诊断为腰椎间盘突出症。后腰骶部痛减轻，背痛加重，并逐渐出现驼背畸形，双髋活动部分受限，上三楼后气喘、呼吸困难。查体：脊柱活动明显受限，肺活量明显减少，Thomas征阳性，床边试验阳性，血液检查RF（-），HLA-B27（+），AS0200U，ESR54mm/h。初步诊断应首先考虑（　）。A.类风湿性关节炎

B.DISH病

C.强直性脊柱炎

D.脊柱结核

E.肥大性脊柱炎

11、单项选择题：下列叙述中错误的是（　）。A.锁骨骨折最常发生在儿童

B.儿童骨骼韧性强，骨膜厚而坚韧，不易发生粉碎性骨折

C.儿童时期关节囊强度明显高于干骺端骨骺的强度，因而很少发生肘关节脱位

D.儿童肢体外伤时进行对侧相应部位X线片检查是可取的，因可能有先天畸形和不规则骨骺板的存在会引起混淆

E.斜颈的原因是颈椎先天性畸形

12、单项选择题：判断脊柱骨折脱位是否并发脊髓损伤，最重要的检查是（　）。A.X线片

B.CT

C.MRI

D.神经系统查体

E.腰穿做奎肯试验及脑脊液生化检查

13、单项选择题：有关周围神经药物注射伤的机制，以下哪项不正确（　）。A.针刺可造成直接损伤

B.针刺可引起神经束内血肿压迫损伤

C.药物的毒性作用可引起神经粘连变性

D.药物注入神经束内导致压力升高压迫损伤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/085120120023011201