

2024 年陕西省临渭区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库及答案（名校卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 大剂量应用甲氨蝶呤后，可用（）进行解救

- A: 亚叶酸钙
- B: 苯溴马隆
- C: 别嘌醇
- D: 丙磺舒

答案：A

2. 引起女性男性化、男性乳房胀痛的是

- A: 十一酸睾酮
- B: 多沙唑啉
- C: 非那雄胺
- D: 舍尼通

答案：A

3. 可选择性地抑制虫体肌肉中的琥珀酸脱氢酶，使延胡索酸不能还原为琥珀酸，从而影响虫体肌肉的无氧代谢，减少能量产生，同时当虫体与之接触时，能使神经肌肉去极化，肌肉发生持续收缩而致麻痹的药物是

- A: 左旋咪唑
- B: 阿苯达唑
- C: 哌嗪

D: 甲苯咪唑

答案：A

4. 治疗膀胱过度活动症宜选用

A: 尼莫地平

B: 利血平

C: 坦洛新

D: 托特罗定

答案：D

5. 链霉素属于

A: β -内酰胺类

B: 氨基糖苷类

C: 四环素类

D: 酰胺醇类

答案：B

6. 铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

A: 血红蛋白

B: 巨核细胞计数

C: 网织红细胞计数

D: 血清铁蛋白

答案：B

7. 下列抗结核药物中也可以用于治疗麻风病的是()

A: 利福平

B: 吡嗪酰胺

C: 异烟肼

D: 链霉素

答案：A

8. 可使人体对维生素 B

A: 雌激素

B: 丙磺舒

C: 糖皮质激素

D: 异烟肼

答案：B

9. 下列从作用机制讲不属于抗血小板药物的是

A: 噻氯匹定

B: 氯吡格雷

C: 双嘧达莫

D: 氨甲环酸

答案：D

10. 口服可用于肠道感染的药物是

A: 奈替米星

B: 链霉素

C: 妥布霉素

D: 庆大霉素

答案：D

11. 在常用剂量下，非那雄胺可使血清前列腺特异抗原(PSA)水平下降的幅度为

A: 0.6

B: 0.5

C: 0.1

D: 0.25

答案: B

12. 属于人体必需、人体不能合成或合成速度不能满足人体需要

A: 赖氨酸

B: 复方氨基酸(18AA)

C: 复方氨基酸注射液(3AA)

D: 精氨酸

答案: A

13. (2021 年真题) 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

A: 利伐沙班

B: 氯吡格雷

C: 替格瑞洛

D: 双嘧达莫

答案: A

14. 戒断症状是 5-HT 再摄取抑制剂较常见的不良反应，产生的原因是

A: 长期服用脑内 5-HT 受体数目减少

B: 长期服用使脑内 5-HT 受体敏感性下调

C: 长期服用致 5-HT、NE、DA 分解增加

D: 长期服用药物对 5-HT 受体无亲和力

答案: B

15. 儿童使用强效激素制剂，连续不应超过

A: 2 周

B: 3~5 天

C: 5~7 天

D: 3 天

答案：A

16. 儿童使用强效激素制剂，连续使用不应超过

A: 1 周

B: 2 周

C: 4 周

D: 3 周

答案：B

17. (2020 年真题) 患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

A: 氨氯地平

B: 赖诺普利

C: 吲达帕胺

D: 普萘洛尔

答案：D

18. 伊曲康唑属于()

A: 丙烯胺类抗真菌药

B: 多烯类抗真菌药

C: 棘白菌素类抗真菌药

D: 唑类抗真菌药

答案：D

19. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

- A: 胃溃疡
- B: 肾绞痛
- C: 痛风
- D: 骨关节炎

答案：D

20. 渗透性泻药()

- A: 地芬诺酯
- B: 硫酸镁
- C: 甘油
- D: 乳果糖

答案：D

21. 甲羟孕酮口服用于功能失调性子宫出血(功血)止血的用法用量是

- A: 口服，一次 10~20mg，每 4~8 小时一次，连用 2~3 日；血止后每隔 3 日递减 1/3 剂量，直至维持量每日 100mg，连续用药至血止后 21 日停药
- B: 口服一日 4~8mg，连服 5~10 日
- C: 一日 30mg，连服 6 个月
- D: 于月经后半周期(撤退性出血的第 16~25 日)开始口服，一次 10mg，一日 1 次，连用 10~14 日，酌情应用 3~6 个周期

答案：A

22. 应用本品时可能发生耐药菌的过度繁殖的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 多西环素
- C: 青霉素

D: 四环素

答案：B

23. 用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是()。

A: 苯酚溶液

B: 酚甘油滴耳液

C: 高锰酸钾溶液

D: 过氧乙酸溶液

答案：B

24. 与细菌核蛋白体的 30s 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成的是

A: 万古霉素

B: 四环素

C: 青霉素

D: 林可霉素

答案：B

25. 伏格列波糖的降糖作用机制是

A: 提高靶组织对胰岛素的敏感性

B: 直接补充胰岛素

C: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶

D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：C

26. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌等的作用均很强的头孢类药物是

A: 第二代头孢菌素

B: 第一代头孢菌素

C: 第四代头孢菌素

D: 第三代头孢菌素

答案: C

27. 不明原因的腹痛、阑尾炎、胃肠道梗阻患者禁用()

A: 甘油

B: 硫酸镁

C: 乳果糖

D: 聚乙二醇 4000

答案: C

28. 目前仍用作一线抗结核药的是

A: 二氯沙奈

B: 链霉素

C: 青蒿素

D: 甲硝唑

答案: B

29. 患者，女，30 岁。近期出现乏力、心动过速，考虑为“甲亢”，遵医嘱服用药物后出现皮疹或皮肤瘙痒及白细胞减少的是

A: 左甲状腺素

B: 甲巯咪唑

C: 丙硫氧嘧啶

D: 地塞米松

答案: B

30. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 嗜酸乳杆菌
- B: 粪肠球菌
- C: 双歧杆菌
- D: 梭状芽孢杆菌

答案：D

31. 属于长效糖皮质激素的是

- A: 泼尼松龙
- B: 地塞米松
- C: 甲羟孕酮
- D: 尼尔雌醇

答案：B

32. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

- A: 盐酸洛哌丁胺胶囊
- B: 双歧三联活菌胶囊
- C: 双八面体蒙脱石散
- D: 地衣芽孢杆菌胶囊

答案：A

33. 无抗结核作用的是

- A: 异烟肼
- B: 乙胺丁醇
- C: 吡嗪酰胺
- D: 红霉素

答案：D

34. 可用维生素 B6 防治的异烟肼的不良反应是

- A: 周围神经炎
- B: 肝损伤
- C: 过敏反应
- D: 胃肠道反应

答案：A

35. 全身用药毒性大，仅局部用的抗病毒药是()

- A: 金刚烷胺
- B: 阿糖腺苷
- C: 阿昔洛韦
- D: 碘苷

答案：D

36. 阿托品用于全麻前给药的目的是()

- A: 增强麻醉效果
- B: 减少麻醉药的用量
- C: 减少呼吸道腺体分泌
- D: 预防心动过缓

答案：C

37. 硝酸甘油的药理作用不包括

- A: 扩张容量血管
- B: 增加心率
- C: 减少回心血量
- D: 增加心室壁张力

答案：D

38. 散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

- A: 左氧氟沙星滴眼液
- B: 复方托吡卡胺滴眼液
- C: 毛果芸香碱滴眼液
- D: 碘苷滴眼液

答案：B

39. 属于贝丁酸类调节血脂药是()。

- A: 依折麦布
- B: 阿托伐他汀
- C: 阿昔莫司
- D: 非诺贝特

答案：D

40. 以下属于袪利尿药的禁忌证的是()

- A: 高血糖
- B: 高钾血症
- C: 高血压
- D: 对试验剂量无反应的无尿者

答案：D

41. 以多酶或辅酶形式参与体内新陈代谢及重要的生化反应的是

- A: 维生素
- B: 葡萄糖
- C: 脂肪乳
- D: 果糖

答案：A

42. 下列药物中属于缩瞳药的是

- A: 托吡卡胺
- B: 硫酸阿托品
- C: 毛果芸香碱
- D: 氢溴酸后马托品

答案：C

43. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 3 周
- B: 2 周
- C: 1 周
- D: 4 周

答案：B

44. 糖皮质激素的禁忌证不包括()

- A: 创伤或手术恢复期
- B: 妊娠初期和产褥期
- C: 严重的高血压、糖尿病
- D: 角膜炎、虹膜炎

答案：D

45. 丙磺舒与水杨酸盐和阿司匹林合用()

- A: 代谢加速而导致意外怀孕
- B: 子宫内膜突破性出血

C: 抑制排酸作用

D: 代谢加快而失效

答案：C

46. 患者，女性，62 岁，有高血压病史 14 年，伴变异性心绞痛，最近频繁发生阵发性室上性心动过速，宜选用

A: 普萘洛尔

B: 维拉帕米

C: 硝苯地平

D: 尼莫地平

答案：B

47. 属于破坏 DNA 的铂类化合物的抗肿瘤药物是

A: 顺铂

B: 紫杉醇

C: 依托泊苷

D: 来曲唑

答案：A

48. (2018 年真题) 对 β -内酰胺类抗菌药物过敏的患者，I 类切口围术期预防应用抗菌药物时，可选用 ()

A: 万古霉素

B: 青霉素 G

C: 氨曲南

D: 头孢唑林

答案：C

49. 能竞争 DNA 聚合酶的抗病毒药是

- A: 拉米夫定
- B: 碘苷
- C: 阿昔洛韦
- D: 利巴韦林

答案：C

50. 一般来讲，复方己酸羟孕酮注射液的注射时间与剂量是

- A: 第二次及以后于月经来潮第 5 日每月注射 1 支
- B: 第一次于月经来潮第 5 日注射 1 支
- C: 第二次及以后于月经来潮后 10~12 日每月注射 1 支
- D: 第一次于月经来潮后 10~12 日注射 2 支

答案：C

51. 洋地黄的主要适应症不包括

- A: 阵发性室上性心动过速
- B: 房室传导阻滞
- C: 急、慢性充血性心力衰竭
- D: 心房扑动

答案：B

52. 下列情况不应首选红霉素的是()

- A: 支原体肺炎
- B: 白喉带菌者
- C: 肠道痢疾杆菌感染
- D: 军团菌肺炎

答案：C

53. 长期大量服用维生素 E 会出现

A: 颅内压增高、夜尿增多、毛发干枯或脱落、皮肤干燥或瘙痒、体重减轻

B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重下降、肝脏肿大、肾脏损害、骨硬化

C: 视物模糊、乳腺肿大、类流感样综合征、胃痉挛

D: 头痛、眼花、烦躁、心律失常、妇女经血不止

答案: C

54. 兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是 ()

A: 羟甲唑啉鼻喷剂

B: 赛洛唑啉滴鼻液

C: 呋麻滴鼻液

D: 麻黄碱滴鼻液

答案: C

55. 下列关于过氧化氢的用法及注意事项，叙述错误的是

A: 遇光稳定，不易变质

B: 遇氧化物或还原物即迅速分解并产生泡沫

C: 妊娠及哺乳期妇女慎用

D: 避免皮肤及黏膜接触高浓度溶液

答案: A

56. 可用于鼻部血管收缩的肾上腺素 α 受体激动药是

A: 桃金娘油

B: 复方薄荷油

C: 羟甲唑啉

D: 西地碘

答案: C

57. 氨曲南的作用特点不包括

- A: 低毒，与青霉素类及头孢菌素类无交叉过敏
- B: 血浆半衰期较短
- C: 时间依赖性抗菌药物
- D: 可用于治疗脑膜炎

答案：D

58. 高钠血症是指

- A: 血钠 $>135\text{mmol/L}$
- B: 血钠 $>130\text{mmol/L}$
- C: 血钠 $>140\text{mmol/L}$
- D: 血钠 $>145\text{mmol/L}$

答案：D

59. 在妊娠期，尤其是妊娠末期或分娩期不宜应用，易发生"灰婴综合征"的药物是()

- A: 四环素
- B: 氯霉素
- C: 青霉素
- D: 多西环素

答案：B

60. 林旦不应与碱性物质或铁器接触。口诀：“碱淡淡铁旦旦”。

- A: 克罗米通
- B: 阿达帕林
- C: 莫匹罗星
- D: 林旦

答案：D

61. 下述可用于治疗甲氨蝶呤引起的巨幼红细胞性贫血的是

- A: 叶酸+维生素 B
- B: 亚叶酸钙
- C: 维生素 B
- D: 叶酸

答案：B

62. 属于头孢三代的是

- A: 头孢呋辛
- B: 头孢唑林
- C: 头孢曲松
- D: 拉氧头孢

答案：C

63. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

- A: 具有吸附、收敛的作用
- B: 属于抗动力药
- C: 不良反应少，可用于治疗儿童的急、慢性腹泻
- D: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环

答案：B

64. 慢性外耳道炎时局部滴用，促使耳道干燥，可选用

- A: 伪麻黄碱
- B: 赛洛唑啉
- C: 2%酚甘油
- D: 3%硼酸乙醇

答案：D

65. 利福平对多种革兰阳性球菌，特别是()具有强大抗菌作用

- A: 流感杆菌
- B: 大肠埃希菌
- C: 变形杆菌
- D: 耐药金黄色葡萄球菌

答案：D

66. 主要抑制排卵的短效口服避孕药是()

- A: 复方炔诺酮
- B: 炔诺酮
- C: 苯丙酸诺龙
- D: 丙酸睾酮

答案：A

67. 不得与碱性物质或铁器接触的是()

- A: 苯甲酸苄酯
- B: 克罗米通
- C: 阿达帕林
- D: 林旦霜

答案：D

68. 以下通过增加组织与肝脏对胰岛素的敏感性而降糖的是()

- A: 吡格列酮
- B: 利拉鲁肽
- C: 瑞格列奈
- D: 二甲双胍

答案：A

69. 对 G

- A: 第一代头孢菌素
- B: 第四代头孢菌素
- C: 第二代头孢菌素
- D: 第三代头孢菌素

答案：A

70. 适用于各型疟疾，但主要用于抗氯喹恶性疟治疗和凶险型恶性疟的急救的药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 蒿甲醚
- C: 奎宁
- D: 双氢青蒿素

答案：B

71. 属于抗雌激素类的抗肿瘤药是

- A: 炔雌醇
- B: 阿那曲唑
- C: 他莫昔芬
- D: 氟他胺

答案：C

72. 未确诊的腹痛、炎症性器质性肠病、肠梗阻、肠穿孔患者禁用()

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 乳果糖
- C: 甘油

D: 硫酸镁

答案：A

73. 抗胆碱 M 受体药的药理作用不包括

A: 解除毛细血管痉挛

B: 扩张支气管

C: 收缩胃肠平滑肌

D: 抑制腺体分泌

答案：C

74. 属于雌激素受体拮抗剂的抗肿瘤药是

A: 丙酸睾酮

B: 炔雌醇

C: 他莫昔芬

D: 阿那曲唑

答案：C

75. 加重洋地黄中毒的易感因素为

A: 低钾血症

B: 甲状腺功能减退症

C: 伴有房颤的心功能不全

D: 低镁血症

答案：B

76. 氯霉素抗菌谱广，而最主要的不良反应是()

A: 对肝脏严重损害

B: 二重感染

C: 对造血系统的毒性

D: 胃肠道反应

答案：C

77. (2016 年真题) 抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反应 ()

A: 急性肝衰竭

B: 急性肾衰竭

C: 胰腺坏死

D: 肺部纹理加重

答案：B

78. 布地奈德口服给药的效能约为皮质醇的

A: 40 倍

B: 15 倍

C: 100 倍

D: 25 倍

答案：D

79. 通过阻断血管紧张素 II 受体而治疗慢性心功能不全的药物是 ()

A: 地高辛

B: 氯沙坦

C: 美托洛尔

D: 氨力农

答案：B

80. 可降低同型半胱氨酸水平的维生素是

A: 叶酸

B: 泛酸钙

C: 维生素 B

D: 烟酸

答案: A

81. 长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是()。

A: 地西泮

B: 唑吡坦

C: 苯巴比妥

D: 佐匹克隆

答案: C

82. 关于青霉素不良反应的说法不正确的是

A: 可引起接触性皮炎、血清病样反应等

B: 局部刺激症状如注射部位疼痛、硬结较常发生

C: 可发生过敏性休克、荨麻疹、血管神经性水肿等

D: 有明显的肾毒性和耳毒性

答案: D

83. 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是()。

A: CYP286

B: CYP2D6

C: CYP2C19

D: CYP2E1

答案: C

84. (2018 年真题) 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 普通胰岛素注射液
- B: 精蛋白锌胰岛素注射液
- C: 甘精胰岛素注射液
- D: 预混胰岛素注射液

答案：A

85. 下述保肝药在静脉滴注时必须用不含电解质的溶液稀释的是

- A: 还原型谷胱甘肽
- B: 门冬氨酸钾镁
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 复方甘草酸苷

答案：C

86. 长期合用下列哪个药物能使口服避孕药的主要成分炔诺酮和炔雌醇的代谢加快，血液中的药物浓度降低而导致避孕失败()

- A: 四环素
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 利福平
- D: 氨苄西林

答案：C

87. 作用机制是抗代谢的是

- A: 巯嘌呤
- B: 紫杉醇
- C: 吉非替尼
- D: 枸橼酸他莫昔芬

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/085121201302012033>