

## 《急救护理学》选择试题（附答案）

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、现在我国医院主要采用五级分类分诊法,此分诊法要求分诊护士具有较强的综合能力,下列陈述中最适合做分诊护士的是

- A、具有急诊临床护理工作经验,与病人沟通适时有时没有耐心
- B、接受急诊分诊培训,具有急诊护理工作经验、专科知识和沟通技能
- C、具有 2 年的急诊临床工作经验,善于观察,善于提问
- D、具有外科临床护理工作经验 15 年,善于沟通,在急诊科工作 3
- E、具备急诊工作相关经历以及专科知识,处理突发事件时常感到压力大

正确答案：B

2、下列哪项不是急诊患者心理反应

- A、怀疑和依赖
- B、焦虑和忧郁
- C、安静和沉默
- D、否认和冷漠
- E、恐惧和愤怒

正确答案：C

3、地震时释放的能量以弹性波的形式从震源向四面八方传播,这种因地震而产生的介质波动叫

- A、弹性波
- B、扩散波
- C、烈度波
- D、地震波
- E、震动波

正确答案：D

4、使用创可贴包扎伤口的描述错误的是

- A、创可贴具有止疼、保护伤口的作用
- B、应将创可贴的一端对准伤口贴上
- C、创可贴具有止血、消炎的作用
- D、使用时应选择规格合适的创可贴
- E、创可贴具有良好透气性

正确答案：B

5、患者女性,51 岁。因 ARDS 入院。入院后行呼吸机辅助呼吸,主机运行每\_\_1\_\_小时进行一次大检修

A、3000

B、5000

C、1000

D、4000

E、2000

正确答案：B

6、患者女性,65岁。以“心前区压榨样疼痛3小时”就诊,入院后突然出现心搏骤停,心脏复苏时应首选下列哪种药物

A、碳酸氢钠

B、肾上腺素

C、氯化钙

D、异丙肾上腺素

E、利多卡因

正确答案：B

7、患者,女性,22岁,误服1059农药,来院急诊,洗胃清除毒物应的洗胃液是

A、2%~4%碳酸氢钠

B、1%盐水

C、1:15000~1:20000高锰酸钾

D、0.9%生理盐水

E、温开水

正确答案：C

8、在院外急救现场,搬运患者需要遵守原则,以下说法错误的是

A、有直升机,可直接转运,无需原地检伤

B、对昏迷或有窒息症状的伤员,肩要垫高,头后仰,面部偏向一侧或侧卧位,保持呼吸道畅通

C、搬运过程中严密观察伤员的面色,呼吸及脉搏等,必要时及时抢救

D、呼吸心跳骤停者,应先行复苏术,然后再搬运

E、一般伤员可用担架、木板等搬运

正确答案：A

9、患者,男性,66岁。因肺心病急性发作入院,监测发现肺动脉楔压( )>18mmHg,则支持的诊断是

A、高血压

B、左心功能不全

- C、ARDS
- D、右心功能不全
- E、支气管哮喘

正确答案：B

10、下列不是洪涝灾害的特点的是

- A、严重的洪涝灾害会直接引起人员伤亡和财产损失
- B、主要集中在中、东部地区
- C、多发生在我国七大江河及其支流的中下游地区
- D、不会诱发山崩、滑坡、泥石流等
- E、大多发生在七、八、九三个月

正确答案：D

11、热射病患者降温时,应将患者肛温降至

- A、36℃左右
- B、39° C 左右
- C、30° C 左右
- D、35° C 左右
- E、38° C 左右

正确答案：E

12、中毒患者出现下列哪种情况不应给予利尿

- A、休克
- B、黄疸
- C、心功能衰竭
- D、昏迷
- E、惊厥

正确答案：A

13、开放性气胸的急救首选

- A、胸腔闭式引流
- B、镇痛
- C、清创
- D、无菌敷料紧急封闭伤口
- E、穿刺抽气

正确答案：D

14、患者男,47岁。车祸后来院,心电图示:室性心律失常。急救首选的药物是

- A、碳酸氢钠
- B、阿托品
- C、洛贝林
- D、利多卡因
- E、肾上腺素

正确答案：D

15、关于简易呼吸器的清洁,下列哪项说法正确

- A、将简易呼吸器顺序拆开,所有部件均可拆卸,直接冲洗
- B、简易呼吸器所有的配件均可用戊二醛消毒
- C、简易呼吸器所有的配件均可用高压蒸汽消毒
- D、简易呼吸器所有的配件均可用环氧乙烷消毒
- E、任何清洁剂均可使用

正确答案：B

16、某男,突发交通事故后送往急诊室,意识丧失,双下肢开放性骨折,呼吸 22/min,心率 58/min,血压 89/60mmHg,身上无任何证件,护士处理不正确的是( )

- A、处置同时通知派出所
- B、协助医生处理骨折
- C、处置同时通知保卫处
- D、先处理后再补办手续
- E、等待家属办理手续后再处理

正确答案：E

17、患者,女,52岁。自服有机磷农药 1 小时余,品种不详。在当地医院洗胃、应用解毒剂后入院,入科时神志呈深昏迷状态,瞳孔等大等圆约 6mm 大小,对光反射消失,面色灰暗,口唇紫绀,全身湿冷,无恶心、呕吐、流涕,双肺呼吸音低,心率快,频发早搏,血氧饱和度低,大便失禁。入科后即给心电监护,经口气管插管,呼吸机辅助呼吸,建立外周静脉通路,保留导尿、胃管,予 400ml 温水洗胃 4 次,体温不升,给予保暖。查体:T35°C, P135 次/分, R14 次/分, BP95/60mmHg, SpO<sub>2</sub>65%。在治疗过程中出现阿托品中毒,应立即给予( )

- A、输液及毛果芸香碱
- B、阿托品
- C、利他林
- D、西地兰

E、速尿

正确答案：A

18、当怀疑患者有心跳呼吸骤停时,为迅速确诊,首先应

A、测血压

B、数呼吸

C、触颈、股动脉搏动

D、听心音

E、做心电图

正确答案：C

19、某女,19岁,口服敌敌畏收入院。临床使用解磷定的注意事项包括

A、禁与碱性药物配伍

B、维持时间短

C、注射过快可致呼吸衰竭

D、可避光保存

E、粉针难溶

正确答案：A

20、患者女,60岁。因一氧化碳中毒天入院。查体:深迷,呼吸尚规则,余无异常。纠正该患者脑缺氧最有效的氧疗方法是

A、低流量低浓度持续给氧

B、高流量吸氧

C、酒精湿化吸氧

D、高压氧舱吸氧

E、面罩加压给氧

正确答案：D

21、CO中毒时最先受损的器官是

A、肝脏

B、肺部

C、肾脏

D、心、脑

E、胃肠道

正确答案：D

22、患者,男性,29岁,被毒蛇咬伤右足,伤口局部红肿、疼痛、出血不止。为减少毒素吸收,处理正确的是

A、切开冲洗

- B、吮吸排毒
- C、压迫止血
- D、局部热敷
- E、局部冷敷

正确答案：E

23、患者张某,已经安置气管插管 72 小时,护士准备为他更换维持人工气道的方式,其理由是气管内插管气囊压力过高,充气时间过长,易导致

- A、气道漏气
- B、咳嗽反射
- C、气道阻塞
- D、气管插管滑落
- E、气道黏膜溃疡坏死

正确答案：E

24、患者,男,54 岁,C4~C6 骨折伴颈髓损伤。机械通气期间,呼吸机通气不足报警。引起通气不足报警的原因不包括

- A、分泌物过多
- B、机械故障
- C、呼吸机脱离
- D、氧气压力不足
- E、人工气道漏气

正确答案：A

25、骨折现场急救的次序最好的是

- A、包扎伤口-妥善固定-初步检查平稳运送
- B、平稳运送-包扎伤口-妥善固定-初步检查
- C、妥善固定-初步检查-包扎伤口-平稳运送
- D、妥善固定-包扎伤口-初步检查平稳运送
- E、初步检查包扎伤口-妥善固定-平稳运送

正确答案：E

26、患者,男性,36 岁,建筑工地作业时从高空坠落,现患者昏迷,检查见右腹部开放性伤口伴大量出血,右前臂畸形,现场急救应首先( )

- A、迅速转运至医院
- B、止血
- C、建立静脉通道
- D、全身仔细检查

E、固定骨折处

正确答案：B

27、面部广泛损伤或烧伤多采用的三角巾包扎方法为

A、8字包扎

B、帽式包扎

C、螺旋反折包扎

D、风帽式包扎

E、面具式包扎

正确答案：E

28、患者,男,40岁。思维活动困难、言语不连贯、定向力障碍,可有幻觉、错觉、记忆模糊是指

A、深昏迷

B、嗜睡

C、意识模糊

D、浅昏迷

E、昏睡

正确答案：C

29、我国建立有洪涝灾害预防和预警机制,根据防汛特征水位,将暴雨对应划分预警等级,通常由重到轻分为 0)级别,分别对应( )颜色三四,红橙黄蓝

A、四三二一,红橙黄蓝

B、一二三四,红橙黄蓝

C、蓝红橙黄,四三二个

D、红橙黄蓝,一二三四

E、一二三四,红绿黄黑

正确答案：B

30、患者,男,25岁。在打球时突感呼吸困难,伴右侧胸闷及胸痛。体格检查:气管移向左侧,右侧胸廓呼吸运动减弱,叩诊呈鼓音。患者最可能的诊断是

A、支气管哮喘

B、COPD

C、肺水肿

D、肺栓塞

E、气胸

正确答案：E

31、女,54岁。以“发热,呼吸困难3天”为主诉入院,入院诊断:急性呼吸衰竭,拟无创正压机械通气。如患者出现躁动,可考虑使用

- A、纳洛酮
- B、阿托品
- C、可拉明
- D、肾上腺素
- E、氯羟甲基安定

正确答案：E

32、某患者,因车祸伤,呼吸28次/分,心率120次/分,血压80/46mmHg,需快速补液并监测CVP,导管放置期间,不可能出现的并发症是

- A、血管损伤
- B、血栓
- C、呼吸衰竭
- D、血气胸
- E、出血

正确答案：C

33、女性患者,45岁。误服巴比妥类药物中毒,急送医院。宜选择下列哪种洗胃溶液

- A、0.1%的硫酸铜溶液
- B、5%的醋酸溶液
- C、2%~4%碳酸氢钠溶液
- D、2.5%的醋酸溶液
- E、1:15000~1:20000高锰酸钾溶液

正确答案：E

34、患者,男,41岁,因割腕自杀,失血性休克收入院,快速大量扩容,现输入新鲜冻干血浆400ml。需在多少分钟内输完

- A、10
- B、30
- C、90
- D、120
- E、60

正确答案：B

35、使用三角巾包扎腹部的描述,下列错误的是

- A、三角巾顶角朝下
- B、拉紧底角至腰背部打结
- C、顶角经会阴拉至臀上方同底角余头打结
- D、底边横放于脐部并外翻 10cm 宽
- E、顶角绕大腿一周打结

正确答案：E

36、应用绷带包扎法时,用于头和断肢端的包扎方法是

- A、环形法
- B、螺旋反折法
- C、螺旋法
- D、回返法
- E、“8”字形法

正确答案：D

37、高温对人体各系统影响,下列描述错误的是

- A、出现急性呼吸窘迫综合症
- B、DIC
- C、出现脑水肿、脑疝
- D、心律失常
- E、较少发生肝衰竭

正确答案：E

38、患者女性,62 岁。因胆道结石、胆道感染致休克,以下哪个脏器缺血发生最早也最明显

- A、肺
- B、胃肠道
- C、心脏
- D、肾脏
- E、脑

正确答案：B

39、前臂损伤时采用纱布绷带包扎的方法是

- A、蛇形包扎
- B、环形包扎
- C、螺旋反折包扎
- D、回返包扎
- E、螺旋形包扎

正确答案：C

40、女性, 33 岁, 在烈日下进行体力活动 3 小时, 出现大量出汗、口渴, 并有胸闷、心悸、恶心等症状, 腋温 38℃, 脉搏 106 次/分, 血压 12.0/6.7kPa\_\_1\_\_, 此时第一步抢救措施为

- A、冰水浸浴
- B、口服大量清凉饮料
- C、冰袋降温
- D、5%葡萄糖盐水 500ml 快速静脉滴入
- E、转移至通风、阴凉处

正确答案：E

41、患者女性, 54 岁, 夏季在农田干农活时出现恶心、心慌、头晕四肢无力等症状, 家属发现后急送入院, 护士遵医嘱为患者进行降温治疗, 应将患者病室温度调至

- A、20° C~25° C
- B、22° C~25° C
- C、18° C~24
- D、18° C~20°
- E、20° ~22° C

正确答案：A

42、开放性损伤的主要特点是

- A、功能障碍
- B、肿胀
- C、疼痛
- D、出血
- E、伤口

正确答案：E

43、患者李某某, 男, 46 岁, 司机, 高中文化, 糖尿病病史 16 年, 近期曾“感冒”, 昨起出现极度口渴、厌食、恶心, 呼吸加速, 晚上出现四肢厥冷、脉细速、血压下降, 随即意识不清。护理意识不清患者的过程中, 下列护理措施不妥的是

- A、作好口腔护理, 以防呼吸道感染
- B、预防褥疮, 温水擦背
- C、为防坠床, 床边可加栏杆
- D、预防舌后坠, 抬高头部

E、预防呼吸道感染, 定时翻身拍背

正确答案: D

44、患者, 女, 25 岁。患者 2 小时前因心搏骤停后实施现场复苏, 恢复心跳呼吸后被 120 送入医院急诊室。立即开放外周静脉通路, 首选

A、下肢静脉

B、腋静脉

C、面静脉

D、肘前静脉

E、中心静脉置管

正确答案: D

45、关于溺水的现场救护正确的是

A、均应实施心肺复苏

B、可给予 5%GS 静滴

C、首先进行人工呼吸

D、首先保持呼吸道通畅

E、首先实施电除颤

正确答案: D

46、男, 15 岁, 被毒蛇咬伤右足, 伤口局部红肿疼痛、出血不止。为减少毒素吸收, 处理正确的是

A、压迫止血

B、切开冲洗

C、局部热敷

D、局部冷敷

E、持续绑扎

正确答案: D

47、患者男, 9 岁。心跳呼吸骤停, 在为患者行心肺复苏时使用简易呼吸器, 在复苏过程中有微弱的自主呼吸, 则在什么时候挤压皮囊

A、任何时候都可

B、吸气与呼气间隔时

C、吸气时

D、呼气时

E、停止呼吸气囊使用

正确答案: C

48、次/分, 肝大, 肝颈回流征阳性, 双下肢浮肿。诊断为慢性支气管炎、

慢性肺源性心脏病,准备性有创性动脉血压监测。行动脉血压监测时,如测得数值和患者病情不符应

- A、通知医生
- B、选择其他动脉重新穿刺
- C、调整患者体位
- D、更换压力传感器
- E、调整传感器位置

正确答案: E

49、男性,68岁。因车祸致肝脾破裂、多发肋骨骨折、肾挫伤入院,既往有“冠心病”病史20余年,急诊行“肝脾破裂修补术”,术后入CU监护治疗。此患者的心电监护示波异常,诊断为房颤,主要诊断依据是

- A、QRS波宽 $>0.15$
- B、异常Q波出现
- C、ST段抬高
- D、P波消失
- E、ST段压低

正确答案: D

50、患者,男,15岁。突然意识模糊抽搐,以下有关抽搐与惊厥的评估错误的是( )

- A、抽搐与惊厥时伴脑膜刺激症多见于脑膜脑炎、脑膜炎、蛛网膜下腔出血等
- B、抽搐与惊厥时伴瞳孔缩小多见于癫痫大发作
- C、抽搐与惊厥时伴发热多见于感染和小儿高热惊厥
- D、抽搐与惊厥时伴高血压多见于子痫、高血压脑病、肾病综合症
- E、破伤风在伤后约一周左右突然发作惊厥,牙关紧闭、苦笑面容、角弓反张(腰背肌强直向后)

正确答案: B

51、现场检伤分类时第三优先抢救的伤员颜色标记为

- A、绿色
- B、黄色
- C、黑色
- D、红色
- E、蓝色

正确答案: A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/085212232143011104>