2023 年同等学历申硕考试《影像医学与核医学》模拟考试卷一

[单选题]1. 下列 X 线防护物质中，最理想的防护物是

A. 铁

B. 铅

C（江南博哥）. 铜

D. 铝

E. 建筑材料

参考答案：B

[单选题]2. 计算机 X 线摄影（CR）系统的空间分辨力

A. 不如 X 线胶片的空间分辨力高

B. 比 X 线胶片高

C. 与 X 线胶片相同

D. 没有可比性

E. 不相关

参考答案：A

[单选题]3. 关于高千伏摄影的优缺点哪个是错误的

A. 影像显示层次丰富

B. 提高照片清晰度

C. 缩短 X 线管寿命

D. 缩短曝光时间

E. 曝光宽容度扩大

参考答案：C

[单选题]4. 诊断缩窄性心包炎较可靠的 X 线征象是

A. 心脏搏动减弱

B. 心缘僵直，弧形消失

C. 心包钙化

D. 间质性肺水肿

E. 以上都不是

参考答案：C

[单选题]5. 正常成人右下肺动脉主干直径一般为

A. ≤5mm

B. ≤10mm

C. ≤15mm

D. ≤20mm

E. ≤25mm

参考答案：C

[单选题]6. 下述肺部病变 X 线描述，哪项错误

A. 癌性空洞，常有液平

B. 大叶性肺炎，渗出性改变
C. 肺大量纤维化，纵隔常向患侧移位
D. 肺内浅淡模糊影，渗出性病变
E. 初染肺结核易经淋巴管播散，空洞少见

参考答案：A

[单选题]7. 下述哪种疾病的特征影像是反“S”征
A. 右上肺中央型肺癌
B. 右下肺周围型肺癌
C. 右下肺脓肿
D. 左下叶背段结核球
E. 左上肺错构瘤

参考答案：A

[单选题]8. 下列病变多见于骨干的是
A. 骨囊肿
B. 骨巨细胞瘤
C. 尤因肉瘤
D. 软骨肉瘤
E. 以上都不是

参考答案：C

[单选题]9. 在病理状态下才能在 X 线摄片上见到的影像是
A. 骨膜
B. 骨皮质
C. 骨松质
D. 营养管
E. 以上都是

参考答案：A

[单选题]10. 下述为食管癌的基本 X 线征象，错误的是
A. 黏膜皱襞紊乱、破坏
B. 不规则腔内充盈缺损
C. 管壁僵直，蠕动消失
D. 纵隔内软组织肿块
E. 恶性溃疡龛影

参考答案：D

[单选题]11. 下列哪种伪影是由致密结构或金属引起的
A. 环状伪影
B. 条纹状伪影
C. 放射状伪影
D. 图像杂乱伪影

E.以上都不是

参考答案：C

[单选题]12.肝岛 CT 表现不包括

A.胆囊床附近最常见

B.脂肪肝基础上呈相对高密度

C.边界清楚，形态各异

D.具有占位效应

E.增强后无早期异常强化

参考答案：D

[单选题]13.肝局灶性结节增生的英文缩写为

A.HME

B.NFM

C.FMH

D.HNB

E.FNH

参考答案：E

[单选题]14.肝癌的特征性 CT 表现为

A.门脉增宽、脾肾分流出现

B.病灶早期强化，强化持续时间很短

C.边缘不清，灶内有气体或增强出现坏死

D.灶周有水肿带、边缘强化，出现“牛眼”征

E.边缘清晰无强化

参考答案：B

[单选题]15.有关马方综合征描述，错误的是

A.蜘蛛指为特征性改变

B.常染色体显性遗传病

C.多见于年轻人

D.硬脊膜膨出少见

E.体型瘦长、脊柱侧弯、鸡胸

参考答案：D

[单选题]16.肺内恶性肿块的特征不包括

A.小泡征

B.分叶征

C.双轨征

D.血管纠集征

E.兔耳征

参考答案：C

[单选题]17.声门型喉癌好发于

A.前联合处
B.声带前、中 1/3 处
C.声带中段
D.声带中、后 1/3 处
E.后联合处
参考答案：B
[单选题]18.胆总管扩张分五型，最常见的是
A.Ⅰ型：胆总管囊状或梭形扩张
B.Ⅱ型：胆总管单发憩室，胆总管正常
C.Ⅲ型：胆总管下端在十二指肠壁内扩张并突人肠腔
D.Ⅳ型：多发囊肿，肝内和肝外囊肿或多发肝外囊肿
E.Ⅴ型：单发或多发肝内胆管囊肿，即 Caroli 病
参考答案：A
[单选题]19.有关胆囊腺肌增生症的说法，错误的是
A.胆囊黏膜层和肌层过度增生导致胆囊壁增厚
B.胆囊腔缩小
C.胆囊浓缩和收缩功能正常
D.罗一阿窦与胆囊不相通
E.罗一阿窦一般 2～3mm 大小
参考答案：D
[单选题]20.下列哪项不是肾囊肿的典型 CT 表现
A.圆形或椭圆形，外表光滑
B.与肾实质分界锐利，清楚
C.囊肿壁很薄，不能目测
D.囊内密度均匀，接近水
E.注射对比剂后有增强
参考答案：E
[单选题]21.“肾血管平滑肌脂肪瘤”行 CT 平扫，最常表现为
A.脂肪密度
B.软组织密度
C.混杂密度
D.均匀高密度
E.水样密度
参考答案：C
[单选题]22.关于前列腺的说法正确的有
A.后方借直肠膀胱陷凹与直肠壶腹相邻
B.位于膀胱颈和尿生殖膈之间
C.尿道自前列腺底的前部穿人

D. 射精管自前列腺底的后部穿人
E. 周围有前列腺囊和鞘包裹
参考答案：D
[单选题]23. 关于“气肿性膀胱炎”的叙述，下列哪项是错误的
A. 女性多见
B. 大肠埃希菌最常见
C. 糖尿病
D. 尿潴留
E. 膀胱内通常为氮气
参考答案：E
[单选题]24. 类风湿关节炎主要病理改变常见于
A. 关节软骨
B. 关节滑膜
C. 关节盘
D. 关节韧带
E. 关节面
参考答案：B
[单选题]25. 恶性肿瘤中不常有骨膜反应的是
A. 纤维肉瘤
B. 原发网状细胞肉瘤
C. 尤因肉瘤
D. 骨肉瘤
E. 溶骨性骨转移瘤
参考答案：E
[单选题]26. 关于脑实质脑囊虫病的 CT 表现，错误的是
A. 周围可有水肿
B. 囊泡内可见小结节状致密囊虫头节影
C. 脑室系统扩大
D. 多发散在小圆形低密度影
E. 一般不强化
参考答案：C
[单选题]27. 下述序列中最快速的 MR 成像法是
A. EPI 序列
B. 快速 GRE 成像序列
C. SSFP 序列
D. 失相位 GRE 脉冲序列
E. GRASS 脉冲序列
参考答案：A

[单选题]28.在 SE 序列中，TE 是指
A.90°脉冲到 180°脉冲间的时间
B.90°脉冲到信号产生的时间
C.180°脉冲到信号产生的时间
D.第一个 90°脉冲至下一个 90°脉冲所需的时间
E.质子完成弛豫所需要的时间
参考答案：B
[单选题]29.侧脑室前角外侧是
A.尾状核体部
B.尾状核头部
C.内囊前肢
D.苍白球
E.尾状核尾部
参考答案：B
[单选题]30.常需与桥小脑角脑膜瘤鉴别的肿瘤是
A.皮样囊肿
B.听神经瘤
C.小脑胶质瘤
D.海绵状血管瘤
E.化学感受器瘤
参考答案：B
[单选题]31.大多数前列腺癌发生在
A.中央带
B.外周带
C.移行带
D.尿道周围腺体
E.无一定规律
参考答案：B
[单选题]32.上纵隔肿物在透视下可见到扩张性的是
A.胸腺瘤
B.畸胎瘤
C.胸主动脉瘤
D.淋巴结转移
E.气管囊肿
参考答案：C
[单选题]33.肾上腺营养不良主要发生在
A.儿童
B.青年女性

C. 青春期
D. 中年
E. 老年
参考答案：A
[单选题]34. 眼外肌从眶尖的腱环向前行附于
A. 角膜
B. 虹膜
C. 巩膜
D. 视网膜
E. 脉络膜
参考答案：C
[单选题]35. 眼及眶部 CT 扫描的最佳方式是
A. 横断面扫描+冠状面扫描
B. 横断面扫描
C. 横断面扫描+矢状扫描
D. 横断面扫描+重叠扫描
E. 横断面扫描+薄层扫描
参考答案：A
[单选题]36. 下列哪项不必进行 CT 增强扫描，也可作出诊断
A. 鉴别纵隔内结构
B. 鉴别血管、肿块、淋巴结
C. 大血管畸形
D. 肺肿块合并肺不张
E. 畸胎瘤
参考答案：E
[单选题]37. CT 示 L4 椎体后缘有一局限性软组织密度影，硬膜外脂肪层消失，硬膜囊受压、变形，神经根增粗。诊断为
A. 神经纤维瘤
B. 神经根囊肿
C. 椎间盘突出
D. 椎间盘膨出
E. 椎小关节病
参考答案：C
[单选题]38. 关于肝血管瘤的描述，下列哪项不正确
A. 肝最常见的良性病变之一
B. 平扫多呈低密度
C. 增强扫描从病灶周边部开始强化
D. 病灶边缘增强的密度与同一层面的主动脉密度相似

E.与肝癌相比，血管瘤向病灶中心增强的速度较快

参考答案：E

[单选题]39.关于胶质母细胞瘤的描述，错误的是

A.增强扫描呈明显强化

B.多位于幕上

C.平扫信号不均匀

D.儿童多见

E.瘤周水肿明显，占位征象显著

参考答案：D

参考解析：成人更常见

[单选题]40.CT 扫描对早期骨肉瘤诊断的价值在于显示

A.骨质增生硬化

B.细微骨质破坏

C.骨膜反应

D.软组织肿块

E.转移性病灶

参考答案：B

[单选题]41.下面哪项不是典型门静脉瘤栓的表现

A.门静脉扩大或不规则

B.平扫时瘤栓密度与门静脉无明显差异

C.平扫时门静脉显示为均匀高密度

D.增强扫描瘤栓呈低密度充盈缺损

E.可向两端延伸至肝内和（或）肠系膜上静脉

参考答案：C

[单选题]42.肺实质病变的 CT 表现是

A.肺内多发点状结节状阴影

B.小叶间隔线增厚

C.多发不规则索条状影

D.支气管气相

E.弥漫分布网状阴影

参考答案：D

[单选题]43.转移性肝癌最常见的 CT 强化类型是

A.充填式强化

B.环形强化

C.不强化

D.明显均匀强化

E.包膜征

参考答案：B

[单选题]44.识别混响伪差方法，不正确的是
A.加压探查，多次反射间距缩小
B.加压探查，多次反射间距不变
C.减压探查，多次反射间距加大
D.适当侧动探头
E.声束不垂直于界面
参考答案：B
[单选题]45.最不可能产生假性肿瘤的伪像是
A.彗星尾伪像
B.镜像伪像
C.旁瓣伪像
D.容积效应伪像
E.混响伪像
参考答案：A
[单选题]46.下列哪一项不是腮腺混合瘤的声像图特征
A.病变轮廓完整，界限清晰，呈圆形、椭圆形或表面呈分叶状
B.内部为均匀低回声或等回声
C.部分腮腺混合瘤内可见到无回声区或钙化灶
D.常出现后方回声增强
E.彩色多普勒血流显像（CDFI）显示瘤体边缘可见较丰富血流信号，流速较高，收缩期峰值流速（PSV）常大于 50cm/s
参考答案：E
[单选题]47.下列哪项不是急性乳腺炎的表现
A.发生于产后哺乳期，高烧，乳房红肿疼痛
B.肿块边缘局部增厚、增强，边界不甚清楚
C.内部回声增强，分布不均匀
D.形成脓肿时，内部呈不均质的无回声区
E.后方回声衰减
参考答案：E
[单选题]48.胰腺癌的说法哪项不正确
A.多数后方回声增强
B.边界不清
C.多数为低回声，也可呈高回声和混合回声
D.可引起胰管增宽及胆管增宽
E.好发于胰头部位
参考答案：A
[单选题]49.以下关于肾恶性肿瘤的说法哪项不正确
A.实性占位，肿块回声因肿瘤大小而异

B.可累及肾静脉及下腔静脉
C.高回声，洋葱皮样改变
D.CDFI 表现多样，可血流丰富或血流稀少
E.内部可出现无回声及强回声
参考答案：C
[单选题]50.门静脉海绵样变性的声像特点是
A.门静脉正常结构消失
B.门静脉分布区域呈蜂窝状回声
C.门静脉内栓子回声
D.门静脉蜂窝状内测及门脉血流
E.以上都是
参考答案：E
[单选题]51.关于子宫腺肌症的描述，不正确的是
A.异位内膜在子宫肌层多呈弥漫性生长，累及前壁居多
B.子宫肌层内含有具有功能的子宫内膜腺体和间质细胞
C.子宫内膜异位症中，异位子宫内膜最易侵犯的部位是卵巢
D.子宫腺肌症的典型超声特征为肌层内不均质回声伴栅栏状衰减
E.局灶型子宫腺肌症呈局限性生长，形成结节或团块，与周围肌层无明显界限
参考答案：A
[单选题]52.孕 29 周患者出现无痛性无诱因阴道出血 5 天，超声检查见胎盘完全覆盖于宫颈内口。考虑诊断为
A.副胎盘
B.前置胎盘
C.胎盘早剥
D.帆状胎盘
E.胎膜早剥
参考答案：B
[单选题]53.脑底动脉环的正确构成是
A.由前后交通动脉和大脑前后动脉构成
B.由大脑前后动脉和颈内动脉组成
C.由大脑前后动脉构成
D.由大脑前后动脉、前后交通动脉和颈内动脉构成
E.由颈内外动脉和椎动脉构成
参考答案：D
[单选题]54.关于布一加综合征的叙述不正确的是
A.血栓或瘤栓导致下腔静脉梗阻
B.包括充血性心力衰竭所致的功能性肝静脉流出道梗阻
C.梗阻位于第二肝门时，可见肝静脉扩张，交通支形成，肝短静脉扩张

D. 下腔静脉病变段无血流信号，其远心段血流反向，提示完全性梗阻
E. 如发现某支肝静脉扩张，正常频谱消失，血流反向，应考虑到该病的诊断
参考答案：B
[单选题]55. 有关关节积液的超声检查，下列描述正确的是
A. 关节积液扫查的位置在关节腔
B. 正常关节腔内液体不能被超声显示
C. 关节积液应进行双侧对比扫查
D. 根据声像图表现，多数积液可明确病因
E. 关节积液不需要与滑膜增生鉴别
参考答案：C
[单选题]56. 缩窄性心包炎用二维超声检测心包有什么异常所见
A. 心包增厚（＞2mm）并常有粘连
B. 心包腔内有积液及心包上有团、块状回声
C. 心包腔内有大量液性无回声区
D. 心包腔内积液随体位而变动
E. 心包变薄
参考答案：A
[单选题]57. 心绞痛型冠心病的超声检查所见哪一项是错误的
A. 节段性室壁运动低下
B. 心室收缩功能可低下
C. 心室舒张功能减退
D. 负荷试验可诱发室壁运动减低
E. 收缩期增厚率明显增加
参考答案：E
[单选题]58. 经直肠超声检查前列腺时，下列哪项正确
A. 将直肠探头插入患者肛门时，常嘱患者深吸气和深呼气，以降低肛门括约肌的紧张度，便于完成检查
B. 检查患者时，常采用膝胸卧位
C. 直肠探头与患者直肠壁之间接触不紧密（存在气体），不影响图像质量
D. 超声影像显示前列腺前部腺体图像质量欠佳时，不需要调节探头频率、仪器的增益和聚焦深度
E. 超声影像显示可疑病变时，特别是位于基底部和尖部病变，不需要从纵横两个平面予以证实
参考答案：A
[单选题]59. 以下哪项不是乳腺纤维瘤的超声表现
A. 有包膜，边界清晰
B. 内部呈均质低回声区
C. 导管扩张

D. 单发或多发
E. 后方回声可增强
参考答案：C
[单选题]60. 声频大于多少的机械振动波称为超声波
A. 10kHz
B. 20kHz
C. 30kHz
D. 40kHz
E. 50kHz
参考答案：B
[单选题]61. 关于卵巢囊性畸胎瘤的声像图表现，下列不正确的是
A. 面团征
B. 脂液分层征
C. 壁立结节征
D. 卫星结节征
E. 杂乱结构征
参考答案：D
[单选题]62. 关于异位妊娠的描述，不正确的是
A. 输卵管妊娠占 95%左右
B. 血 β-HCG 滴度一般比正常宫内妊娠高
C. 阔韧带妊娠也属于异位妊娠
D. 常出现腹痛
E. 剖宫产瘢痕妊娠也属于异位妊娠
参考答案：B
[单选题]63. 常合并羊水过多的胎儿畸形，不包括下列哪一项
A. 食管闭锁
B. 十二指肠闭锁
C. 双肾发育不良
D. 脊柱裂
E. 双胎输血综合征之受血儿
参考答案：C
[单选题]64. 胆囊不显像的可能原因不包括
A. 慢性胆囊炎，充满型胆囊结石
B. 进食后的胆囊排空状态
C. 肿瘤占据整个胆囊腔
D. 胆囊颈部嵌顿结石
E. 急性肝功能异常
参考答案：D

[单选题]65.放射性核素稀释法的原理是
A.放射性浓度相等
B.生物排泄
C.稀释的体积相等
D.放射性核素的物理衰变
E.稀释前后质量相等，总放射性活度不变
参考答案：E
[单选题]66.SPECT 脑血流灌注显像过度灌注现象可见于哪种疾病
A.脑肿瘤
B.痴呆
C.脑梗死亚急性期
D.脑脓肿
E.烟雾病
参考答案：C
[单选题]67.关于心肌细胞的生化代谢，正确的描述是
A.当空腹时，心肌耗氧量几乎全部来源于葡萄糖
B.进食状态下，葡萄糖、脂肪酸为心肌细胞的主要代谢底物
C.当空腹时，心肌耗氧量几乎全部来源于脂肪酸氧化
D.进食状态下，脂肪酸为心肌细胞的主要代谢底物
E.心肌细胞不能利用不同的能源物质
参考答案：C
[单选题]68.首次通过法显像时，呈现“U”形影像，其组成是
A.上腔静脉一右心房
B.肺静脉一升主动脉
C.上腔静脉一肺动脉
D.肺动脉一肺静脉组成
E.锁骨下静脉，上腔静脉
参考答案：C
[单选题]69.首次通过法显像时，图像上出现“左心及主动脉提前显影”，原因是由于
A.存在左至右分流
B.存在右至左分流
C.存在心室至心房的反流
D.存在主动脉瘤
E.存在主动脉瓣的反流
参考答案：B
[单选题]70.关于运动负荷后 1 小时 ^{99m}Tc_MIBI 进人心肌的量占注入量的百分比，下列正确的是

A.0.5010
B.1010
C.1.4%
D.2%
E.4%

参考答案：C

[单选题]71.心肌血流灌注显像前一般要禁食 4～6 小时，其主要目的为
A.避免心肌血流量降低
B.增加心肌血流量
C.增加心肌对显像剂的摄取量
D.降低患者的辐射剂量
E.减低腹腔脏器的血流量

参考答案：E

[单选题]72.下肢深静脉显像时，下肢深静脉阻塞的图像特点是
A.阻塞部位远端影像中断
B.阻塞部位远端出现侧支通道
C.无点或梭形放射性浓聚
D.阻塞部位近心端影像中断
E.诊断准确性可达 80%～85%

参考答案：B

[单选题]73.^{99m}Tc 标记红细胞消化道出血显像可以探测到出血率低于多少的出血部位
A.0.01ml/min
B.0.05ml/min
C.0.1ml/min
D.0.5ml/min
E.1.0ml/min

参考答案：C

[单选题]74.引起肝胆显像诊断急性胆囊炎假阳性的可能原因包括
A.胆管炎
B.壶腹癌
C.肝硬化
D.胰腺炎
E.先天性胆道闭锁

参考答案：D

[单选题]75.肺灌注显像一次注入的颗粒数不应超过
A.10 万
B.15 万

C. 20 万
D. 50 万
E. 70 万
参考答案：D
[单选题]76. 肾动态显像的常用参考值，以下哪项是准确的
A. 峰值差小于 10%
B. 峰时小于 2 分钟
C. 两肾峰时差小于 1 分钟
D. 20 分钟清除率 ^{99m}Tc-EC 大于 40%
E. 20 分钟清除率 ^{99m}Tc_DTPA 大于 50%
参考答案：C
[单选题]77. 下列哪种药物影响肾上腺髓质显像
A. 地塞米松
B. 卡托普利
C. 麻黄碱
D. 雌激素
E. 噻嗪类
参考答案：C
[单选题]78. 体外放射分析中，影响放射性标记物稳定性的因素包括
A. 有效半衰期
B. 放射性核纯度
C. 置换水平
D. 物理环境
E. 放射化学纯度
参考答案：C
[单选题]79. 关于射线在组织的射程以下哪一描述正确
A. α 射线＞β 射线＞俄歇电子
B. α 射线＞俄歇电子＞β 射线
C. 俄歇电子＞β 射线＞α 射线
D. β 射线＞俄歇电子＞α 射线
E. β 射线＞α 射线＞俄歇电子
参考答案：E
[单选题]80. 怀疑胸骨后异位甲状腺的患者进行甲状腺显像，应最好选择以下哪种显像剂
A. ^{201}Tl
B. ^{99m}Tc-MIBI
C. ^{131}I
D. ^{125}I

E. ^{99m}TcO4

参考答案：C

[单选题]81.静脉注射 ^{99m}Tc-MDP 进行全身骨显像的原理是

A.细胞吞噬

B.选择性浓聚

C.通透弥散

D.合成代谢

E.化学吸附和离子交换

参考答案：E

[单选题]82.通过药物、运动或生理刺激干预以后，再进行的显像称为

A.介入显像

B.负荷显像

C.阳性显像

D.阴性显像

E.动态显像

参考答案：A

[单选题]83.SPECT 显像最适宜的丫射线能量为

A.100～300keV

B.511keV

C.100～250keV

D.364keV

E.150～250keV

参考答案：C

[单选题]84.PET 脑显像应用 18F-FDG，主要由于 18F-FDG

A.在脑组织的溶酶体内长期滞留

B.在脑内代谢成 FDG-6P，不能进一步代谢

C.在脑内清除快

D.在脑内代谢成 FDG-6P，能进一步代谢

E.被脑组织特异性摄取

参考答案：B

[单选题]85.临床上鉴别肿瘤治疗后瘢痕形成与肿瘤病灶残留或复发的有效方法是

A.18F_FDGPET

B.MRI

C.超声检查

D.常规 X 线摄片

E.CT

参考答案：A

[单选题]86.患儿，3岁，胸骨左缘第3～4肋间闻及收缩期杂音，心脏摄片显示右心室和左心室增大，肺血增多。该患者应考虑为
A.房间隔缺损
B.室间隔缺损
C.动脉导管未闭
D.肺动脉狭窄
E.法洛四联症
参考答案：B
[单选题]87.患者，男，45岁，体检发现左下肺一直径2.5cm块状影，边缘分叶有毛刺。应首先考虑为
A.硅肺病
B.周围型肺癌
C.肺结核球
D.错构瘤
E.球形肺炎
参考答案：B
[单选题]88.青年患者，轻咳少痰。CT发现右下肺3cm大小结节，边界清楚，密度欠均匀，其内可见粗大颗粒状“爆米花”样钙化。该患者应考虑为
A.肺癌
B.结核瘤
C.错构瘤
D.炎性假瘤
E.肺转移瘤
参考答案：C
[单选题]89.患者，男，50岁，诉右胸痛伴右眼下垂。胸片示右肺尖大块密度增高影。该患者应诊断为
A.结核瘤
B.错构瘤
C.肺上沟瘤
D.炎性假瘤
E.含液囊肿
参考答案：C
[单选题]90.患儿，女，1岁，头大，智力障碍。CT示四脑室与枕大池扩大，小脑蚓部和半球发育不良，幕上脑室扩大。最可能的诊断为
A.先天性枕大池扩大
B.后颅窝蛛网膜囊肿
C.Dandy-Walker综合征
D.Chiari畸形

E.脑萎缩

参考答案：C

[单选题]91.患儿，男，2岁，头痛。CT轴位平扫示双侧额顶部颅骨内板下方半月形脑脊液密度影，脑实质受压，中线结构居中。最可能的诊断为

A.急性硬膜下血肿

B.硬膜外血肿

C.双侧蛛网膜颗粒

D.双额顶硬膜下积液

E.双额顶蛛网膜囊肿

参考答案：D

[单选题]92.患儿，男，4岁，急起发热、咳嗽、气促，胸片示双下肺斑片影沿支气管播散。应考虑

A.大叶性肺炎

B.支气管肺炎

C.支原体肺炎

D.过敏性肺炎

E.干酪性肺炎

参考答案：B

[单选题]93.患者，男，40岁，急起发热、咳嗽、咳脓臭痰。胸片显示右下肺大片阴影，其内可见气一液平面。应考虑为

A.大叶性肺炎

B.支气管肺炎

C.支原体肺炎

D.过敏性肺炎

E.化脓性肺炎

参考答案：E

[单选题]94.患者，男，60岁，主诉黏液血便，大便变细。钡灌肠显示直肠和乙状结肠充盈缺损，管腔不规则变窄。该患者应考虑为

A.溃疡性结肠炎

B.阿米巴结肠炎

C.克罗恩病

D.结肠癌

E.肠结核

参考答案：D

[单选题]95.中年女性，疲乏、无力、色素沉着和低血压症状已数年。CT示双侧肾上腺略小，内见坏死灶和点状钙化，强化不明显。应考虑

A.库欣综合征

B.艾迪生病

C.原发性醛固酮增多症
D.肾上腺转移癌
E.嗜铬细胞瘤

参考答案：B

参考解析：由于肾上腺皮质激素分泌不足所致的一类全身性疾病。因肾上腺本身的疾病引起者称为原发性肾上腺皮质功能低减症；最早由艾迪生·T 描述，故称艾迪生氏病。因下丘脑和（或）垂体的疾病引起者称为继发性肾上腺皮质功能低减症。主要表现为疲乏无力、食欲不振、恶心、呕吐、血压偏低等，病情严重者可出现休克、低血钠、低血糖等肾上腺危象的表现。原发性者还有全身皮肤黏膜色素沉着。须终身采用替代疗法，即补充生理量的肾上腺皮质激素。

[单选题]96.CT 显示左肾上腺区 3cm 直径肿块，边界清楚，密度不均匀，实体部分强化明显，临床有阵发性高血压症状，应考虑

A.库欣病
B.艾迪生病
C.嗜铬细胞瘤
D.肾上腺转移瘤
E.原发性醛固酮增多症

参考答案：C

[单选题]97.患儿气促发绀，X 线上心影不扩大，心尖圆钝上翘，肺动脉段凹陷呈“靴形”，主动脉影增宽，肺血减少。应考虑

A.房间隔缺损
B.室间隔缺损
C.动脉导管未闭
D.肺动脉狭窄
E.法洛四联症

参考答案：E

[单选题]98.中年男性，无痛性血尿。CT 示右肾不规则肿块，向肾外突出，密度较低且不均匀，有点状钙化，不均匀性强化，肾周脂肪间隙消失。应考虑

A.肾结石
B.肾结核
C.肾囊肿
D.肾癌
E.肾错构瘤

参考答案：D

[单选题]99.患者，女，50 岁，右上腹隐痛 3 个月，力Ⅱ重伴黄疸 2 周。CT 示肝内胆管轻度扩张，胆囊区软组织密度肿块，增强呈轻度强化。最可能的诊断是

A.胆总管癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/085323023122011131