

银杏达莫

- **【适应症】**
- 使用于预防和治理冠心病、血栓栓塞性疾病。
- **【用法用量】**
- 静脉滴注。成人一次10—25ml，加入0.9%氯化钠注射液或5%--10%葡萄糖注射液500ml中，一日2次。

银杏达莫

- **【不良反应】**
 - 1、偶有恶心、呕吐、头晕、皮肤过敏反应发生。
 - 2、罕见心绞痛加重，一旦停药，症状立即消失。
- **【注意事项】**
- 有出血倾向者慎用。

长春西汀

- **【适应症】**
- 改善脑梗塞后遗症、脑出血后遗症、脑动脉硬化症诱发的各种症状。
- **【用法与用量】**
- 静脉滴注，开始剂量每天20mg，以后根据病情可增至每天30mg，缓慢滴注或遵医嘱。

长春西汀

- **【禁忌症】**
- 1、对本品过敏者禁用。
- 2、颅内出血急性期禁用。
- 3、孕妇或已有妊娠可能的妇女禁用。
- 4、严重缺血性心脏病，严重心律失常者禁用。

长春西汀

- **【注意事项】**
- 1.本品应在医生指导下使用。
- 2.出现过敏症状时，应立即停药就医。
- 3.哺乳期妇女应避免使用本品，如不得不使用时应停止哺乳。
- 4.本品不得与肝素合并使用。
- 5.长期使用时，应检查血象。
- 6.本品不可静脉或肌肉推注。
- 7.输液中长春西汀含量不得超过0.06mg/ml。

盐酸氨溴索

- **【适应症】**
- 适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病，例如慢性支气管炎急性加重、喘息型支气管炎、支气管扩张及支气管哮喘的祛痰疗法。术后肺部并发症的预防性治疗。

盐酸氨溴索

- **【用法和用量】**
- 成人及12岁以上儿童：每天2~3次，每次15mg，严重病例可以增至每次30mg；6~12岁儿童：每天2~3次，每次15mg；2~6岁儿童：每天3次，每次7.5mg；2岁以下儿童：每天2次，每次7.5mg。均为慢速静脉滴注。

盐酸氨溴索

- **【不良反应】**
- 盐酸氨溴索通常能很好耐受。轻微的上部胃肠道副作用偶有报道（主要为胃部灼热、消化不良和偶尔出现恶心、呕吐），过敏反应极少出现，主要为皮疹。极少病例报道出现严重的急性过敏反应，但其与盐酸氨溴索的相关性尚不能肯定，其中的某些病人通常对其它物质亦产生过敏。

奋乃静

- 【适应症】
- 1、对幻觉妄想、思维障碍、淡漠木僵及焦虑激动等症状有较好的疗效。用于精神分裂症或其他精神病性障碍。因镇静作用较弱，对血压的影响较小。适用于器质性精神病、老年性精神障碍及儿童攻击性行为障碍。 2、止呕，各种原因所致的呕吐或顽固性呃逆。

奋乃静

- 【用法用量】
- 口服 治疗精神分裂症，从小剂量开始，一次2~4mg，一日2~3次。以后每隔1~2日增加6mg，逐渐增至常用治疗剂量一日20~60mg。维持剂量一日10~20mg。用于止呕，一次2~4mg，一日2~3次。

奋乃静

- **【禁忌症】**
- 基底神经节病变、帕金森病、帕金森综合征、骨髓抑制、青光眼、昏迷、对吩噻嗪类药过敏者。

奋乃静

- **【注意事项】**
- 1、患有心血管疾病（如心衰、心肌梗死、传导异常）应慎用。 2、出现迟发性运动障碍，应停用所有的抗精神病药。 3、出现过敏性皮疹及恶性综合征应立即停药并进行相应的处理。 4、肝、肾功能不全者应减量。 5、癫痫患者应慎用。 6、应定期检查肝功能与白细胞计数。 7、用药期间不宜驾驶车辆、操作机械或高空作业。

鲜竹沥

- **【适应症】**
- 清热化痰。用于肺热咳嗽痰多，气喘胸闷，中风舌强，痰涎壅盛，小儿痰热惊风。
- **【用法用量】**
- 口服，一次15-30ml，一日2次；或遵医嘱。

尼莫地平（尼莫通）

- **【适应症】**
- 预防和治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛引起的缺血性神经损伤。

尼莫地平（尼莫通）

- **【用法及用量】**
- 取注射用尼莫地平4mg，用适量5%葡萄糖或0.9%氯化钠溶解，注入5%葡萄糖或0.9%氯化钠500ml中，混合均匀后静脉滴注。

尼莫地平（尼莫通）

- **【禁忌】**
- 本品含丙二醇，甘露醇，对本品中任何成分过敏者禁用。脑水肿和颅内压增高者禁用。

奥美拉唑

- 【适应症】
- ①消化性溃疡出血、吻合口溃疡出血。②应激状态时并发的急性胃黏膜损害，和非甾体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤；③亦常用于预防重症疾病（如脑出血、严重创伤等）胃手术后预防再出血等；④全身麻醉或大手术后以及衰弱昏迷患者防止胃酸反流合并吸入性肺炎。

奥美拉唑

- **【用法用量】**
- 静脉注射。一次40mg,每日1~2次。临用前将10ml专用溶剂注入冻干粉小瓶内，禁止用其它溶剂溶解。本品溶解后必须在2小时内使用，推注时间不少于20分钟。

注射用西咪替丁

- **【适应症】**
- 1.治疗已明确诊断的十二指肠溃疡，胃溃疡。
- 2.十二指肠溃疡短期治疗后复发的患者。
- 3.持久性胃食道返流性疾病，对抗返流措施和单一药物治疗如抗酸剂无效的患者。
- 4.预防危急病人发生应激性溃疡及出血。
- 5.胃泌素瘤（卓林格-艾利森氏综合症）。

注射用西咪替丁

- **【用法和用量】**
- 本品可经缓慢静脉滴注或必要时静脉注射给药，也可不加稀释直接肌肉注射。静脉给药：静脉间隔滴注：静脉给药可以是间断给药，200mg稀释100ml葡萄糖注射（5%）或其它配伍静脉溶液，滴注15-20分钟，每4-6小时重复一次。对于一些患者如有必要增加剂量，需增加给药次数，但每日不应超过2g为准。

注射用西咪替丁

- **【禁忌】**
- 对西咪替丁过敏者，禁忌使用。

注射用盐酸雷尼替丁

- 【适应症】
- ①消化性溃疡出血、弥漫性胃粘膜病变出血、吻合口溃疡出血、胃手术后预防再出血等；②应激状态时并发的急性胃粘膜损害和阿司匹林引起的急性胃粘膜损伤；亦常用于预防重症疾病（如脑出血、严重创伤等）应激状态下应激性溃疡大出血的发生；③全身麻醉或大手术后以及衰弱昏迷患者防止胃酸反流合并吸入性肺炎。

注射用盐酸雷尼替丁

- 【用法与用量】
- 本品需用灭菌注射用水完全溶解后使用。
- 成人：①上消化道出血：每次50mg，稀释后缓慢静滴（1~2小时），或缓慢静脉推注（超过10分钟），或肌注50mg，以上方法可每日2次或每6~8小时给药1次；②术前给药：全身麻醉或大手术前60~90分钟缓慢静注50~100mg，或5%葡萄糖注射液200ml稀释后缓慢静脉滴注1~2小时。
- 小儿：静注：每次1~2mg/kg，每8~12小时一次；静滴：每次2~4mg/kg，24小时连续滴注。

注射用盐酸雷尼替丁

- **【禁忌症】**
- 对本品及成分过敏者禁用。

注射用盐酸昂丹司琼

- **【适应症】**
- 用于预防放射治疗和细胞毒性药物化疗引起的恶心；亦用于预防手术后的恶心呕吐。

注射用盐酸昂丹司琼

- **【用法和用量】**
- 临用前，加0.9%氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液适量使溶液。1.对于高度催吐的化疗药物引起的呕吐：化疗前15分钟、化疗后4小时、8小时各静脉注射昂丹司琼8mg，停止化疗后每8-12小时口服昂丹司琼片8mg，连用5日。2.对催吐程度不太强的化疗药引起的呕吐：化疗前15分钟注射静脉注射昂丹司琼8mg，以后每8-12小时口服昂丹司琼片8mg，连用5日。3.对于预防手术后的恶心呕吐：在麻醉时同时静脉输注4mg。对于手术后恶心呕吐的病人：缓慢静脉输注4mg。

注射用盐酸昂丹司琼

- **【禁忌】**
- 对本品过敏者，胃肠梗阻者忌用。

丙戊酸钠片

- **【适应症】**
- 主要用于单纯或复杂失神发作、肌阵挛发作，大发作的单药或合并用药治疗，有时对复杂部分性发作也有一定疗效。

丙戊酸钠片

- 【用法用量】
- 成人常用量：每日按体重 15mg/kg 或每日 $600\sim 1200\text{mg}$ 分次 $2\sim 3$ 次服。开始时按 $5\sim 10\text{mg/kg}$ ，一周后递增，至能控制发作为止。当每日用量超过 250mg 时应分次服用，以减少胃肠刺激。每日最大量为按体重不超过 30mg/kg 、或每日 $1.8\sim 2.4\text{g}$ 。小儿常用量：按体重计与成人相同，也可每日 $20\sim 30\text{mg/kg}$ ，分 $2\sim 3$ 次服用或每日 15mg/kg ，按需每隔一周增加 $5\sim 10\text{mg/kg}$ ，至有效或不能耐受为止。

丙戊酸钠片

- **【禁忌症】**
- 有药源性黄疸个人史或家族史者、有肝病或明显肝功能损害者禁用。有血液病，肝病史，肾功能损害，器质性脑病时慎用。

立芷雪(注射用血凝酶)

- **【适应症】**

用于需减少流血或止血的各种医疗情况下，如：外科、内科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科等临床科室的出血及出血性疾病。

预防：手术前用药，可减少出血倾向，避免或减少手术及手术后出血。

立芷雪(注射用血凝酶)

- **【用法用量】**

静脉注射、肌肉注射，也可局部使用。成人：每次1.0—2.0KU，紧急情况下，立即静脉注射1.0KU，同时肌肉注射1.0KU。

各类外科手术：手术前1小时，肌肉注射1.0KU，或手术前15分钟，静脉注射1.0KU。手术后每日肌肉注射1.0KU，连用三天，或遵医嘱。在用药期间，应注意观察病人的出、凝血时间。应防止用药过量，否则疗效会下降。

立芷雪(注射用血凝酶)

- **【禁忌】**

虽无关于血栓的报道，为安全起见，有血栓病史者禁用。对本品中任何成份过敏者禁用。

氨甲苯酸

- **【适应症】**
- 本品主要用于因原发性纤维蛋白溶解过度所引起的出血 包括急性和慢性 局限性或全身性的高纤溶出血 后者常见于癌肿 白血病 妇产科意外 严重肝病出血等

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/086010100241010230>