

2024 年甘肃省礼县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题通关秘籍题库含答案（B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇紫绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 阿替洛尔
- B: 卡托普利
- C: 西地兰
- D: 硝普钠

答案：C

2. 药物对孕妇的不良影响中，甲氨蝶呤可引起（）。

- A: 畸形
- B: 流产
- C: 死胎
- D: 溶血

答案：A

3. 适合餐前服用的是

- A: 多潘立酮
- B: 氟伐他汀
- C: 吲哚美辛
- D: 奥利司他

答案：A

4. 乳汁中药物的浓度与下列哪种因素无关

- A: 药物剂型
- B: 母体中的药物浓度
- C: 脂溶性
- D: 药物与母体血浆蛋白结合率

答案：A

5. “有助于建立、维持并增进药师与患者的专业性关系”的技能是

- A: 药品警戒技能
- B: 药历书写技能
- C: 沟通技能
- D: 自主学习能力

答案：C

6. 体位性低血压

- A: 氢氯噻嗪
- B: α 受体阻断剂
- C: 普萘洛尔
- D: 卡托普利

答案：B

7. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高，血肌酐升高，其他生化指标，该患者最可能患有：

- A: 肾脏疾病
- B: 心脏疾病
- C: 肝脏疾病

D: 血液疾病

答案：A

8. 告知"培氟沙星合用糖皮质激素出现跟腱断裂"属于

A: 药物相互作用

B: 禁忌证

C: 药品不良反应

D: 合理用药信息

答案：A

9. (2018 年真题) 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，在以后的 7 天内要加用屏障避孕法

B: 到 21 日 20:00 再同时服用两片药，然后在常规时间继续服药

C: 尽快补服一片，然后在常规时间继续服药

D: 不再继续服用此周期药物，经过一个 7 天的停药期，再开始继续服用下一周期的药物

答案：C

10. 抑制磷脂酶 A2，减少单核细胞和中性白细胞释放前列腺素和白三烯

A: 别嘌醇

B: 丙磺舒

C: 阿司匹林

D: 秋水仙碱

答案：D

11. 可升高血细胞，用于化疗所致的中性粒细胞减少症的是

- A: 维生素 B12
- B: 重组人促红素
- C: 硫酸亚铁
- D: 非格司亭

答案：D

12. 药库管理人员根据药品用量和库存情况提出购药计划，向指定的药品经营单位采购，必须持有

- A: 印鉴卡
- B: 防盗设施
- C: 五专管理
- D: 基数卡

答案：A

13. 患者，女，45 岁，既往有扩张型心肌病，近 1 年出现劳累性呼吸困难，1 天前因感冒出现发热、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张早期和中期奔马律。

- A: 普萘洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 阿托品
- D: 肾上腺素

答案：C

14. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物的药动学的机制是

- A: 抑制 CYP2C9
- B: 抑制 CYP1A2
- C: 诱导 CYP3A4

D: 抑制 CYP3A4

答案：D

15. 清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是指

A: 肝脏合成胆固醇的规律

B: 胃酸的分泌规律

C: 胰岛 B 细胞的分泌规律

D: 糖皮质激素的分泌规律

答案：C

16. (2018 年真题) 患者，男，80 岁，患有高血压、2 型糖尿病、前列腺增生，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关。复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的药物是 ()

A: 非那雄胺

B: 依那普利

C: 二甲双胍

D: 珍菊降压片 (含氢氯噻嗪)

答案：D

17. 患者，男，30 岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续 3 年，查体：双肺满布哮鸣音，HR80 次 / 分，律齐，无杂音。

A: 哌唑嗪

B: 沙丁胺醇

C: 青霉素

D: 普萘洛尔

答案：B

18. 慢性非特异性结肠炎患者服用美沙拉秦期间应定期监测

- A: 脾功能
- B: 呼吸功能
- C: 肾功能
- D: 肝功能

答案：C

19. 患者，男，48 岁，因“肺结核”入院治疗。医师处方异烟肼片 0.3gqd、利福平胶囊 0.6gqd、乙胺丁醇片 1.0gqd、吡嗪酰胺片 1.5gqd。药师对患者的正确用药指导是

- A: 患者治疗期间应避免服用维生素 B6
- B: 利福平可加快异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能
- C: 异烟肼加快乙胺丁醇代谢，增加球后视神经炎风险，须定期评估视神经功能
- D: 利福平可减慢异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

答案：B

20. “沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

- A: 应对投诉作用
- B: 药物警戒作用
- C: 用药监督作用
- D: 双向交流作用

答案：D

21. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

- A: 甲蒸多巴
- B: 缬沙坦

C: 硫酸镁

D: 卡托普利

答案：C

22. 肝功能不全而肾功能正常的患者宜选用的药物是

A: 经肝肠循环消除的药物

B: 肾毒性小、经肝排泄的药物

C: 肝毒性小、经肾排泄的药物

D: 经肝肾双途径消除的药物

答案：C

23. 抗凝，抗血小板治疗

A: 硝苯地平

B: 血凝酶

C: 华法林

D: 多非利特

答案：C

24. 消化性溃疡的注意事项中，服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用 PPI，需补充

A: 维生素 E?

B: 维生素 C?

C: 维生素 B12?

D: 维生素 D3?

答案：C

25. 患者用药咨询的内容是

A: 减肥、补钙、补充营养素

B: 抗菌药物的合理使用

C: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大

D: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法

答案：D

26. 以下的论述哪项是错误的

A: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

B: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全

C: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，提高疗效，减少不良反应

D: 普萘洛尔不可抑制肾素的分泌

答案：A

27. 用于用药错误分级的是（）

A: CLHD 公式

B: CoCkroft-GAut 公式

C: NCEMERP 标准

D: CoChrAnE 分级

答案：C

28. 患者男 25 岁有癫痫病史 2 年一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦，癫痫控制良好近期因社区获得性肺炎入院。下列药物中，最可能影响患者基础疾病控制的是（）

A: 阿奇霉素

B: 头孢曲松

C: 莫西沙星

D: 阿莫西林

答案：C

29. 泡腾片的注意事项是

- A: 用后应漱口
- B: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的
- C: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息
- D: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

答案：C

30. 影响核酸转录的药物

- A: 放线菌
- B: 培美曲塞
- C: 顺铂
- D: 依托泊苷

答案：A

31. 需要在服药时多饮水的药物不包括

- A: 抗痛风药
- B: 平喘药
- C: 降糖药
- D: 氨基糖苷类抗菌药

答案：C

32. (2016 年真题) 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是 ()。

- A: 复方苯甲酸软膏
- B: 氢化可的松软膏

C: 酮康唑软膏

D: 联苯苄唑软膏

答案: B

33. 高 TG 血症首选

A: 阿昔莫司

B: 氟伐他汀

C: 依折麦布

D: 非诺贝特

答案: D

34. (毒物及药物中毒解救)，二巯丙醇用于解救

A: 有机磷中毒

B: 吗啡中毒

C: 氰化物中毒

D: 水银中毒

答案: D

35. 某女孩，6 岁，2 个月来反复出现突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视、呼之不应，手中物体掉落。但从不跌倒，持续数秒钟可缓解。

A: 肝功能

B: 血糖

C: 肾功能

D: 血尿酸

答案: A

36. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

- A: 哌替啶
- B: 氟桂利嗪
- C: 金刚烷胺
- D: 双氯芬酸

答案：A

37. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 300 $\mu g / L$ 。

- A: 输血
- B: 维生素 B12 肌肉注射
- C: 右旋糖酐铁肌注
- D: 硫酸亚铁口服

答案：D

38. 通过拮抗 α 受体而用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 非那雄胺
- B: 前列康
- C: 黄酮哌酯
- D: 特拉唑嗪

答案：D

39. 患儿，男，6 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 佝偻病
- B: 智障
- C: 坏血病

D: 脑瘫

答案：A

40. 支原体肺炎首选（）

A: 阿奇霉素

B: 多西环素

C: 甲氧西林

D: 青霉素

答案：B

41. 苯二氮（卓）类药物中毒的特异性治疗药物为

A: 氟马西尼

B: 去甲肾上腺素

C: 纳洛酮

D: 醒脑静

答案：A

42. 2 型儿童糖尿病者宜首选（）。

A: 瑞格美脲

B: 胰岛素

C: 格列喹酮

D: 二甲双胍

答案：D

43. 设置专供患者阅读的《顾客药物信息详解》的是

A: 《药物事实与比较》

B: 《美国药典药物信息》

C: 《马丁代尔药物大典》

D: 《中国国家处方集》

答案: B

44. 支气管哮喘急性发作期(轻度)可选用的药物是

A: 沙丁胺醇

B: 孟鲁司特

C: 异丙托溴铵

D: 沙美特罗

答案: A

45. 氰化氢中毒呈现

A: 抽搐、进行性加重

B: 出血、凝血时间延长

C: 恶心、呕吐、口内有金属味

D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案: D

46. 躯干部出现鞭打状色素沉着

A: 柔红霉素

B: 氟尿嘧啶

C: 博来霉素

D: 白消安

答案: C

47. 关于药物经济学研究方法，下列说法误的是

A: 最小成本法不能对不同疾病间进行比较

B: 成本效用方法不能对不同疾病间进行比较

C: 成本效果分析不能对医疗与非医疗项目进行比较

D: 成本效益方法能对医疗与非医疗项目进行比较

答案：B

48. 以硫酸镁治疗子痫，适宜

A: 肌肉注射

B: 吸入给药

C: 口服给药

D: 直肠给药

答案：A

49. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

A: 青霉素

B: 链霉素

C: 红霉素

D: 氯霉素

答案：B

50. 属于雌激素受体拮抗剂的抗肿瘤药是

A: 炔雌醇

B: 他莫昔芬

C: 阿那曲唑

D: 丙酸睾酮

答案：B

51. 关于匹维溴铵，下列说法不正确的为

- A: 为钙离子拮抗剂
- B: 有抗胆碱能作用
- C: 松弛胆道口括约肌
- D: 降低食管下括约肌压力

答案：D

52. “治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者可分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度”是针对

- A: 半衰期大于 30 小时的药品
- B: 半衰期小于 30 分钟的药品
- C: 半衰期 8~24 小时的药品
- D: 半衰期大于 24 小时的药品

答案：B

53. 氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用的机制是

- A: 减少不良反应
- B: 协同作用
- C: 拮抗作用
- D: 敏感化作用

答案：C

54. 发现处方存在或潜在的问题、制定并实施干预和改进措施，是

- A: 处方审核
- B: 参与健康教育
- C: 处方点评
- D: 药物信息服务

答案：C

55. 氟乙酰胺杀鼠药中毒呈现

- A: 抽搐、进行性加重
- B: 恶心、呕吐、口内有金属味
- C: 出血、凝血时间延长
- D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案：A

56. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

- A: 脑出血
- B: 短暂性脑缺血发作
- C: 脑血栓形成
- D: 缺血性脑卒中

答案：A

57. 患者，女，8 岁，体重 22kg，因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊，症状在 2 天内逐步加重。出现这些症状前，先出现病毒性上呼吸道感染的症状（咽喉痛、流涕和咳嗽）3 天。在过去的 2 年，患者有过几次急性支气管炎发作，并在 3 个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体：中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音，偶尔咳嗽，呼气相延长，胸部过度膨胀，胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声，左侧呼吸音减弱。呼吸 30 次 / 分、血压 110 / 83mmHg、心率 130 次 / 分、体温 37.8℃，动脉血气分析血氧饱和度（SaO₂）90%。

- A: 口服泼尼松龙，0.5~1.0mg/kg，持续 5~7 日
- B: 口服福莫特罗

C: 雾化大剂量布地奈德

D: 雾化噻托溴铵

答案: B

58. 药物相互作用使毒性增加的事例是

A: 山莨菪碱联用哌替啶

B: 阿托品联用吗啡

C: 阿托品联用普萘洛尔

D: 铁剂联用维生素

答案: A

59. (2021 年真题) 患者, 男, 45 岁, 因消化不良 (上腹饱胀, 餐后明显) 来药店咨询。下列说法错误的是 ()

A: Hp 感染是引起消化不良的常见原因

B: 应除外器质性疾病

C: 可用助消化药对症治疗

D: 进餐时不要摄入过多的液体

答案: A

60. 切勿嚼碎、咀嚼, 宜在进餐时用水吞服, 不宜睡前吞服的 IBS 治疗药物是

A: 蒙脱石散

B: 地芬诺酯

C: 匹维溴铵

D: 环孢素 A

答案: C

61. 药师沟通技能不包含

- A: 介绍自己
- B: 认真倾听
- C: 应用医学术语
- D: 观察评估

答案：C

62. 治疗肺炎的抗菌药物的疗程一般为

- A: 5 天
- B: 7~10 天
- C: 3 天
- D: 15 天

答案：B

63. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 华法林
- B: 利伐沙班
- C: 氯吡格雷
- D: 肝素

答案：C

64. （2019 年真题）用后不宜马上进食的剂型是

- A: 软膏剂
- B: 含漱剂
- C: 直肠栓剂
- D: 滴眼剂

答案：B

65. 对巨幼细胞贫血者应选用 ()

- A: 富马酸亚铁
- B: 维生素 K1
- C: 叶酸+维生素 B12
- D: 甲磺酸去铁胺

答案: C

66. 荨麻疹患者常出现

- A: 血红蛋白减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 血小板计数增高

答案: B

67. (2017 年真题) 配制青霉素输液的适宜溶媒是 ()

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 0.9%氯化钠注射液
- D: 低分子右旋糖酐注射液

答案: C

68. 成人血小板计数正常参考区间是

- A: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$
- B: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$
- C: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$
- D: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$

答案: C

69. 患者，女，76 岁，慢性阻塞性肺病病史 10 年年来多次因急性加重入院，予以抗感染等治疗。近日因咳嗽咳痰加重再次入院，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物是（）

- A: 阿米卡星
- B: 头孢他啶
- C: 头孢唑林
- D: 阿奇霉素

答案：B

70. pH 碱性的感染尿液常见

- A: 草酸盐结晶
- B: 磷酸盐结晶
- C: 酪氨酸和亮氨酸结晶
- D: 尿酸盐结晶

答案：B

71. 《2013 版中国居民膳食营养素参考摄入量》建议，65 岁及以上老年人推荐维生素 D 摄入量为

- A: 800IU (20~30 μg) / d
- B: 600IU (15 μg) / d
- C: 400IU (10 μg) / d
- D: 2000~4000IU (50~100 μg) / d

答案：B

72. 饮水冲淡药物对感受器的刺激是指

- A: 抗利尿药
- B: 苦味健胃药
- C: 利胆药

D: 舌下片（丸）

答案：B

73. 审核后判为合理处方，应该

- A: 依照处方调配药品
- B: 拒绝调配处方，依照有关规定报告
- C: 拒绝调配处方
- D: 调配处方并发药

答案：D

74. 起效较慢，服用至少 3 个月才可以缓解前列腺增生症状的 5 α 还原酶抑制剂是

- A: 阿夫唑嗪
- B: 特拉唑嗪
- C: 氟伏沙明
- D: 非那雄胺

答案：D

75. 可以杀伤结核分枝杆菌，最大限度地降低传染性的早期杀菌活性药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 氨苄西林
- C: 莫西沙星
- D: 氧氟沙星

答案：A

76. （2015 年真题）他汀类药物引起的典型药源性疾病是（ ）。

- A: 血液系统疾病

B: 胃肠类疾病

C: 神经系统疾病

D: 肝病

答案：D

77. 可用于氟乙酰胺中毒的药物是

A: 维生素 K1

B: 乙酰胺

C: 亚硝酸钠

D: 碘解磷定

答案：B

78. 作为退热药的首选，对乙酰氨基酚的优势是

A: 大剂量对肝脏有损害

B: 正常剂量下较为安全有效

C: 可作用缓和而持久

D: 解热作用强，镇痛作用较弱

答案：B

79. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止

B: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星

C: 应给予少量、多次、清淡饮食

D: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液

答案: B

80. 抗结核化学药物治疗的主要适应证为

A: 肺结核病灶硬结已久

B: 病灶部分硬结，痰菌阴性

C: 有活动性肺结核病灶

D: 痰菌阴性，无明显结核毒性症状

答案: C

81. 癫痫的药物治疗适用于各型癫痫的药物

A: 卡马西平

B: 苯妥英钠

C: 丙戊酸钠

D: 拉莫三嗪

答案: C

82. 阿托品与小活络丹合用

A: 合用后增加毒性，出现药物中毒

B: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭

C: 两者合用作用相反，互相降低药效

D: 合用后抑制后者吸收，降低疗效

答案: A

83. 可引起 A/G 比值 < 1 的是

A: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

B: 各种原因脱水所致的血液浓缩

C: 摄入不足、消化不良时

D: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

答案：A

84. 非核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂（）

A: FIs

B: NRTIs

C: PIs

D: NNRTIs

答案：D

85. 治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

A: 用药安全是药物治疗的前提

B: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性

C: 有效性是选择药物的首要标准

D: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本

答案：D

86. 下列临床试验分期中，属于上市后药品临床再评价阶段的是

A: I 期临床试验

B: III期临床试验

C: IIa 期临床试验

D: IV期临床试验

答案：D

87. （2015 年真题）下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是（）。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 需要终身服药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/086240035055011030>