

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、急性肠梗阻易导致 0

- A、高血钙
- B、低血钙
- C、高血钾
- D、低血钾
- E、高渗性脱水

【答案】： D

2、短时间内出血量超过()时可出现周围循环衰竭。0

- A 、 500ml
- B 、 800ml
- C、 1200ml
- D、 1000ml
- E、 2000ml

【答案】： D

3、最容易发生急性肾衰竭的是 0

- A、严重颅脑外伤
- B、严重挤压伤
- C、大面积烧伤
- D、外伤致脾破裂
- E、骨盆骨折

【答案】： B

4、电流击伤对人的致命作用是 0

- A、引起心室颤
- B、诱发心动过速
- C、导致心室血流减慢
- D、造成心肌缺血

【答案】： A

5、在对未建立高级气道的心跳呼吸骤停患者进行 CR 时，应进行 0 次人工通气。

- A 、 1
- B 、 2
- C 、 3
- D、 4
- E 、 5

【答案】： B

6、抢救口服有机磷农药中毒病人洗胃时最常用的洗胃液是 0

- A、0.9%氯化钠注射液、温开水
- B、热开水
- C、2%碳酸氢钠
- D、1:5000 高锰酸钾溶液
- E、5%葡萄糖注射液

【答案】： A

7、急性 CO 中度中毒时，血液 HbCo 浓度为)

- A、10-30%
- B、30-50%
- C 、 >50%
- D、50-70%
- E、70%以上

【答案】： B

8、对蛛网膜下腔出血病因的诊断，最具有意义的辅助检查是 0

- A、脑脊液检查
- B、脑血管造影
- C、脑部 Ct 检查
- D、脑部 MRI

检查

E、血常规

【答案】： B

9、2015 心肺复苏指南继续强调将 0 的重要意义。

A、迅速开放呼吸道；

B、迅速判断意识

C、有效的人工通气；

D、有效不间断胸外按压

E、除颤

【答案】： D

10、心绞痛发作的主要原因 0

A、主动脉狭窄

B、主动脉关闭不全

C、全身小动脉痉挛

D、冠状动脉狭窄或畸形

E、肺动脉痉挛

【答案】： D

11、判断甲状腺功能亢进程度的主要依据是 0

A、体温、呼吸

B、血压、脉搏

C、体重、食欲

D、突眼程度

E、睡眠时间

【答案】： B

12、斜正重症酸中毒时，根据二氧化碳结合力和 FH

值应给予 0

- A、甘露醇
- B、碳酸氢钠
- C、葡萄糖
- D、氯化钠
- E、转化糖

【答案】： B

13、患者，女性，40 岁，车祸时头部受伤，出现头痛、呕吐而急诊入院。为预防脑水肿，降低颅内压，应采取的体位是 0

- A、端坐卧位
- B、头高足低位
- C、半坐卧位
- D、头低足高位
- E、中凹卧位

【答案】： B

14、中毒时最首要的处理是 0

- A、对症治疗
- B、使用抗生素
- C、立即终止接触毒药
- D、使用特效解毒药
- E、清除进入人体的毒药

【答案】： C

15、地震灾害主要伤情包括 0

- A、劳累性损伤
- B、失用性损伤
- C、动物咬伤
- D、火器伤

E、挤压综合征

【答案】： E

16、患者有规律呼吸几次后，突然停止呼吸，间隔一个短时间后又开始呼吸，周而复始。此种呼吸和呼吸暂停交替出现的现象称为 0

- A、潮式呼吸(陈施呼吸)
- B、深度呼吸(库斯莫呼吸)
- C、叹息呼吸
- D、间断呼吸(毕奥呼吸)
- E、蝉鸣式呼吸

【答案】： D

17、急救婴儿现场判断意识的方法为 0

- A、呼唤婴儿
- B、拍打肩部
- C、指压人中
- D、摇晃头部

【答案】： C

18、地震发生现场，某患者出现大量肠管脱出，此时首先要做的是 0

- A、进行保护性包扎
- B、把肠管回纳腹腔
- C、暂时不予处理
- D、马上紧急处理
- E、给予止痛药

【答案】： A

19、开放性腹部损伤中，致伤物有入口、出口的是 0

- A、贯通伤
- B、盲管伤
- C、挤压伤
- D、穿透伤
- E、扭挫伤

【答案】： B

20、现场心肺复苏操作首要步骤是 0

- A、心前区叩击
- B、心脏按压
- C、口对口人工呼吸
- D、按额托项，保持呼吸道通畅
- E、心内注射

【答案】： D

21、被目击的非创伤心跳骤停患者中最常见的心律为 0

- A、心脏停搏
- B、无脉性室颤
- C、室颤
- D、电-机械分离
- E、室上性心动过速

【答案】： C

22、四肢大动脉出血或采用加压包扎后不能有效控制的大出血应采用 0

- A、加压包扎止血法
- B、按压止血法
- C、指压止血法
- D、止血带止血法
- E、用止血钳直接夹闭血管的断端

【答案】： D

23、有机磷农药吸收后浓度最高的脏器是 0

- A、心
- B、脑
- C、肾
- D、肝
- E、肺

【答案】： D

24、对成人进行胸外心脏按压时，双手应该 0

- A、双手掌根重叠
- B、双手指重叠
- C、掌心紧贴胸壁
- D、手指紧贴胸壁
- E、掌根压胸壁

【答案】： A

25、腹部检查下列哪项错误 0

- A、振水音见于幽门梗阻
- B、肋下扪及肝脏提示肝大
- C、脾脏正常时不能扪及
- D、肠鸣音消失可见于肠麻痹
- E、腹主动脉搏动正常人可触到

【答案】： B

26、对清除肠内毒物有积极意义的洗胃时限是 0

- A、食物中毒 3 小时内
- B、食物中毒 4 小时内
- C、食物中毒 6 小时内
- D、食物中毒 8 小时内
- E、食物中毒 10 小时内

【答案】： C

27、护士在紧急情况下为抢救患者生命实施必要的紧急救护，应该做到以下几点，
但除外()

- A、必须依照诊疗技术规范
- B、必须有医师在场指导
- C、根据患者的实际情况和自身能力水平进行力所能及的救护
- D、避免对患者造成伤害

E、以上均正确

【答案】： B

28、急性颅内压增高病人典型的生命体征表现是 0

- A、脉快，呼吸急促
- B、脉快，血压降低
- C、脉快，血压高
- D、脉慢，呼吸慢
- E、脉慢，血压低

【答案】： D

29、医护人员到达现场，可用哪几种颜色对伤员进行分类 0

- A、白、黄、绿、黑
- B、红、黄、绿、黑
- C、红、黄、蓝、黑
- D、红、白、绿、黑

【答案】： B

30、一工厂突发火灾，数十伤员转运到急诊科，此时分诊护士的首要任务是 0

- A、迅速检伤，按照病情危重程度分类
- B、做好常规来诊患者的解释工作
- C、发现危重患者立即投入抢救中
- D、配合治疗区护士共同参与抢救
- E、准备与来诊家属沟通

【答案】： A

31、口对口人工呼吸的吹气量应达到()

- A、2400mL 以上
- B、500mL
- C、1/3 肺活量
- D、达到病人肺部
- E、使病人胸廓抬起

【答案】： E

32、有机磷农药中毒的中毒机理是 0

- A、麻醉作用
- B、抑制酶的活力作用
- C、局部刺激、腐蚀作用
- D、干扰细胞膜和细胞器的生理功能

【答案】： B

33、患者，男性，52 岁。因车祸致胸腹联合伤，左侧多发性肋骨骨折(连枷)伴大量 血气胸；脾破裂伴腹腔内出血。神志清， BP75/46mHg R38 次/分，心率 126 次/分，

律齐，医护人员到达现场后首先要对患者进行哪一项伤情评估 0

- A、意识状态
- B、气道和呼吸情况
- C、进行化验检查
- D、 循环情况
- E、仔细的胸部检查

【答案】： B

34、以下说法中哪一条可能不正确()

A、肺脏在正常时含有足够的氧，在呼吸停止后能防止严重的血氧不饱和达 30 秒

左右；

B、单纯施行胸外心脏按压的患者存活率明显高于未接受 CPR 者；

C、在 SCA 导致心搏骤停早期，即使不通气，单纯胸外心脏按压可能也足以维持机

体基本的通气要求；

D、双人实行 CPR 时，应按照 15:2 的按压通气比进行。

E、双人实行 CPR 时，应按照 30:2 的按压通气比进行。

【答案】： D

35、哪一项是担架转送伤病员的护理要求 0

- A、不用顾忌体位
- B、满足患者一切需求
- C、不用病情观察
- D、一般侧卧位
- E、注意舒适护理

【答案】： E

36、患者女性，43岁。中午饱餐后出现上腹部绞痛，同时向腰背部呈带状放射，已持续6小时。怀疑为急性胰腺炎，此时最具诊断意义的实验室检查为 0

- A、 白细胞计数
- B、血清淀粉酶测定
- C、尿液淀粉酶测定
- D、血清脂肪酶测定
- E、血清谷丙转氨酶

【答案】： B

37、适用于卷轴带开始及终了的包扎方法是 0

- A、蛇形
- B、螺旋形
- C、“8”字形
- D、环形
- E、螺旋反折形

【答案】： D

38、抢救脊柱骨折的伤员时，应 0。

- A、采取保暖措施
- B、用软板担架运送
- C、用三角巾固定
- D、扶持伤者移动

E、以上方法均正确

【答案】： C

39、休克早期微循环灌流的特点是 0

A、少灌少流

B 、多灌少流

C、

不灌不流

D、少灌多流

E、多灌多流

【答案】： A

40、关于急性应激障碍的陈述，正确的是 0

A、一般在刺激后 1 天内发病

B、以急剧、严重的精神打击为直接原因

C、表现平静

D、应激消除者症状历时 20 天左右

E、通常 6 个月内症状缓解

【答案】： B

41、呕吐、头痛、嗜睡、深快呼吸，

呼气可闻烂苹果。患者出现的可能情况是 0

A、糖尿病酮症酸中毒

B、呼吸衰竭

C、颅内压升高

D、低血糖

E、脑血管意外

【答案】： A

42、口服补液盐液体的张力为 0

A、1/5 张

B、1/4 张

C、1/3 张

D、1/2 张

E、2/3 张

【答案】： E

43、下面措施中，最能有效改善早期肺气肿症状的是 0

- A、促进痰液排出
- B、保证睡眠质量
- C、去除外界刺激因素
- D、呼吸功能锻炼
- E、处理并发症

【答案】： D

44、患者，男，50岁。某日在烈日下劳动4小时后感到头昏乏力，随后昏倒在地，神志不清，急送医院，头颅CT检查未见异常。查体：体温41℃，心率135次/分，律齐，血压90/60mmHg，深昏迷，双下肢阵发性抽搐，大、小便失禁。该患者属于中暑的哪一类型()

- A、热射病
- B、热痉挛
- C、热衰竭
- D、先兆中暑
- E、轻度中暑

【答案】： A

45、溺水者控水，不正确的方法是 0

- A、在溺水者腹部放一小锅，然后按压背部排水
- B、利用地面的自然斜坡排水
- C、将溺水者放在牛背上，让牛奔跑将水排出
- D、倒立法

【答案】： C

46、下列属于气管插管的禁忌症的是 0

- A、主动脉瘤压迫气管者
- B、呼吸道分泌物过多不能咳出者
- C、窒息者

D、呼吸道疾病的诊断和治疗

【答案】： A

47、有关骨折急救处理，下列哪项错误)

A、

首先应止血及包扎伤口

B、无夹板时，可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架

C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定

D、脊椎骨折患者不可采取手法复位

E、搬动脊椎骨折患者时，应采取一人抱肩，一人抬腿的方法

【答案】： E

48、患者患有心脏病但活动量不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸

困难或心绞痛。其心功能分级应为 0

A、心功 1 能级

B、心功能 2 级

C、心功能 3 级

D、心功能 4 级

E、以上都不是

【答案】： A

49、呼吸性酸中毒应先处理的问题是 0

A、控制感染

B、促进咳痰

C、单纯高浓度吸氧

D、给予碱性液体

E、解除呼吸道梗阻，改善换气

【答案】： E

50、胸外伤后，出现胸壁软化(连枷胸)的原因是 0

A、2 根以上肋骨骨折

B、多根多段肋骨骨折

C、胸骨骨折

D、反常呼吸

E、纵隔摆动

【答案】： B

51、纠正呼吸性酸中毒，最主要的措施是 0

- A、输碱性溶液
- B、纠正电解质紊乱
- C、改善通气
- D、使用脱水剂
- E、以上都不是

【答案】： C

52、热痉挛时最易发生痉挛的肌肉是 0

- A、腹直肌
- B、胸大肌
- C、肱二头肌
- D、腓肠肌

【答案】： D

53、环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。环甲膜穿刺点是)

- A、甲状软骨下缘与环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。
- B、甲状软骨下缘与环状软骨弓上缘交界处。
- C、甲状软骨下缘与颈部正中线交界处。
- D、甲状软骨下缘与软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。
- E、环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。

【答案】： A

54、抢救时胸外心脏按压有效的标志是 0

- A、颈动脉搏动
- B、股动脉搏动
- C、肱动脉搏动
- D、颈、股动脉搏动
- E、颈、肱动脉搏动

【答案】： D

55、脑出血患者降低颅内压，控制脑水肿时应使用 0

- A、复方氯化钠
- B、碳酸氢钠
- C、甘露醇
- D、葡萄糖
- E、氯化钠

【答案】： C

56、高原病的诱因不包括 0

- A、登高速度过急
- B、体力活动过大
- C、寒冷或气候改变
- D、饥饿、疲劳、失眠
- E、慢性胃炎

【答案】： E

57、2010 年 10 月-美国心脏协会(AHA)公布最新心肺复苏(CPR)指南。
重新安排

了 CPR 传统的三个步骤，最新三步骤是)

- A、A-B-C
- B、C-A-B
- C、B-CA
- D、B-A-C

【答案】： B

58、患者，男性，3 岁，因呕血黑便来院就诊，神志清楚，面色苍白，
血压 80/50mf。

考虑病人血容量不足，应输入的溶液是 0

- A、10%葡萄糖
- B、脂肪乳
- C、20%甘露醇
- D、中分子右旋糖酐

E、浓缩白蛋白

【答案】： D

59、地震被埋时如果一时不能脱险，应如何自救？0

- A、设法将手脚挣脱出来，推开压在身上的物体，使呼吸通畅
- B、不管是否受伤，都要用力向外抽拉身体
- C、使用明火求救
- D、搬开身边杂物，扩大活动空间

【答案】： A

60、膀胱刺激征是指 0

- A、尿失禁、尿多
- B、排尿困难、尿滴沥
- C、尿痛、尿急
- D、夜尿增多、尿频
- E、尿频、尿急、尿痛

【答案】： E

61、男，12岁，因溺水出现心脏骤停，心电监护示一直线，有双人参与抢救，除如

下哪种抢救措施外，其余措施均可采取 0

- A、胸外按压
- B、人工呼吸
- C、电除颤
- D、心脏起搏

【答案】： D

62、输液治疗时患者突然出现心慌气紧、呼吸困难、发绀、大汗、咳嗽、咳泡沫

血痰、烦躁不安。听诊肺部布满湿性啰音。应高度怀疑 0

- A、循环负荷过重
- B、空气栓塞
- C、输液反应
- D、过敏反应

【答案】： A

63、院前急救的原则错误的是 0

- A、先施救后排险
- B、先重伤，后轻伤
- C、急救与呼救并重
- D、转运与救护相结合

【答案】： A

64、患者，男性，49 岁。既往有高血压、脑出血史，现脑出血术后 16 天出院，突发 高热，由家人送至急诊科。患者神志不清，在对患者进行气道及呼吸评估时，患者

突然面色青紫。如果你是分诊护士，首先要做的是 0

- A、立即将患者送入抢救室
- B、给予人工呼吸
- C、呼叫医生
- D、尽快结束初级评估
- E、测量血氧饱和度

【答案】： A

65、气管插管留置的时间一般最多为 ()h

- A、48
- B、12
- C、72
- D、24

【答案】： C

66、有机磷农药中毒最早出现的临床表现是 0

- A、平滑肌痉挛和腺体分泌增加
- B、全身肌肉发生强直性痉挛
- C、头痛、头晕、乏力
- D、共济失调
- E、谵妄、意识障碍

【答案】： A

67、男，57岁。2个月来清晨常出现头痛，癫痫发作4次，经检查诊断为颅内占位性

病变、颅内压增高，行开颅手术。颅内压增高的典型表现为（

- A、头痛、呕吐、食欲缺乏
- B、头痛、呕吐、抽搐
- C、头痛、抽搐、呕吐、意识障碍
- D、头痛、呕吐、视盘水肿
- E、头痛、抽搐、血压增高

【答案】： D

68、风湿性心瓣膜病最易累及的是 0

- A、二尖瓣
- B、主动脉瓣
- C、三尖瓣
- D、二尖瓣+三尖瓣
- E、主动脉+肺动脉瓣

【答案】： A

69、在灾难现场通常以黑颜色醒目的卡片或胶带表示患者的分类是 0

- A、死亡
- B、重伤
- C、危重伤
- D、中重伤
- E、致命伤

【答案】： E

70、男，50岁，高血压病多年，近日活动后出现呼吸困难伴左胸痛，咳嗽频繁，咳

出为粉红色泡沫样血痰，可能疾病为 0

- A、大叶性肺炎
- B、急性左心衰
- C、

右心衰竭

- D、支气管扩张
- E、自发性气胸

【答案】： B

71、心脏骤停后，进行胸外心脏按压时，急救药物 0.1%肾上腺素的给药途径首选

0

- A、心内注射
- B、气管内注射
- C、静脉注射
- D、皮下注射
- E、肌肉注射

【答案】： C

72、下列哪项是多发伤初级评估的目的 0

- A、明确诊断
- B、判定处理伤员的优先次序
- C、确认是否需要手术
- D、明确收治的科室
- E、决定后续的治疗方案及优先次序

【答案】： B

73、改善成人急性呼吸窘迫综合征病人缺氧的最佳措施是 0

- A、持续高流量吸氧
- B、按时使用有效抗生素
- C、呼气终末正压通气
- D、避免输液过量过快
- E、鼓励深呼吸和排痰

【答案】： C

74、危重症患者家属最主要的心理需求为 0

- A、病情保障与获取信息
- B、照顾患者
- C、接近患者
- D、获得支持
- E、自身舒适

【答案】： A

75、锐器伤的职业防护措施中有错的是 0

- A、在有可能接触病人血、体液时必须戴手套
- B、手术中用弯盘存放锐器后再传递
- C、抽吸药液后必须立即用双手操作套上针帽
- D、锐器不可与其他医疗垃圾混放
- E、用砂轮划痕后垫纱布再掰安瓿

【答案】： C

76、救治中毒的原则错误的是 0

- A、促进毒物的排泄
- B、尽早使用特效解毒剂
- C、立即终止机体与毒物的接触
- D、毒物不明确先诊断再抢救

【答案】： D

77、病人心肺复苏后，脑复苏的主要措施是 0

- A、维持有效的循环
- B、确保呼吸道通畅
- C、降温和脱水疗法
- D、加强基础护理
- E、治疗原发疾病

【答案】： C

78、男性，22 岁，右胸刺伤 2 小时，创口与胸腔相通，患者极度呼吸困难，首要的急救措施是)

- A、迅速封闭胸壁伤口
- B、立即手术
- C、输血，输液
- D、胸腔闭式引流
- E、给氧，气管插管

【答案】： A

79、II 型呼吸衰竭是指动脉血气显示 0

- A、仅有缺氧
- B、仅有二氧化碳潴留
- C、仅有二氧化碳降低
- D、既有缺氧，又有二氧化碳降低
- E、既有缺氧，又有二氧化碳潴留

【答案】： E

80、以下患者可以立即转送的是 0

- A、腹腔内出血未控制
- B、休克患者
- C、大腿骨折未固定
- D、急性左心素竭
- E、肠膨出已行腹部包扎

【答案】： E

81、灭火器至少多长时间进行一次全面检查和保养 0

- A、一个月
- B、一个季度
- C、半年
- D、一 年

【答案】： A

82、非同步电复律用于治疗 0

- A、心室扑动
- B、室性心动过速
- C、心房扑动
- D、室上性心动过速
- E、心房颤动

【答案】： A

83、患者，男性，35 岁，车祸外伤后输入大量库存血后，出现心率缓慢、手足抽搐，

血压下降，伤口渗血，出现以上症状的有关因素是 0

- A、高血钾
- B、低血钾
- C、高血钙
- D、低血钙
- E、低血钠

【答案】： D

84、在车祸现场，作为奔向伤员的现场急救人员，应如何正确向伤员喊话？0

- A、大声呼喊伤员的名字，确定其是否能活动和反应
- B、大声喊出自己是来营救的急救人员，让伤员放心
- C、大声告诉伤员不可随意活动，等待急救的处理
- D、大声报出自己名字，让伤员放心
- E、不向伤员喊话，该处理什么就做什么措施

【答案】： C

85、抢救触电病人应立即采取的措施是)

- A、切断电源
- B、处理电灼伤
- C、吸氧

D、 心肺复苏

【答案】： A

86、女性，49岁，多年胃溃疡，近1个月胃区疼痛，发病前饱食并饮酒，饭后12分钟突然腹痛，剧如刀割，腹呈板状，来源急诊下一步简单有效的检查方法是0

- A、腹部X线检查
- B、纤维胃镜
- C、腹腔冲洗
- D、磁共振
- E、B超

【答案】： A

87、如果一次注入洗胃液过多会引起0

- A、胃内压升高引起反射性心跳加快
- B、胃内压降低引起反射性心跳骤停
- C、胃内压升高毒物吸收增加
- D、胃内压降低毒物吸收增加

【答案】： C

88、胸膜腔穿刺抽出不凝血常因为0

- A、肋骨骨折
- B、张力性气胸
- C、心脏损伤
- D、开放性气胸
- E、血胸

【答案】： E

89、气道异物梗阻腹部冲击法用力的方向为0

- A、向内向上
- B、向内向下
- C、向外向上
- D、向外向下

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/087003053101006120>