

2024 湖南省嘉禾县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题通关秘籍题库 (有一套)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 患者,男,60 岁,因水泡型足癣到药店购药药师应推荐的药品是()

- A: 10%樟脑软膏
- B: 特比萘芬乳膏
- C: 利巴韦林软膏
- D: 氢化可的松软膏

答案: B

2. (2016 年真题) 治疗过敏性结膜炎可选用的药物是 ()。

- A: 氧氟沙星滴眼液
- B: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- C: 色甘酸钠滴眼液
- D: 酞丁安滴眼液

答案: C

3. (2021 年真题) 关于儿童药动学和药效学特点的说法, 错误的是 ()

- A: 儿童内分泌系统不够稳定, 长期使用糖皮质激素易导致发育迟缓
- B: 婴幼儿血浆白蛋白与药物的结合能力低于成人, 血中游离药物浓度较高
- C: 儿童血脑屏障不完善, 多种药物均能通过, 有可能引发不良反应
- D: 和成人相比, 婴儿胃液 PH 低, 对酸不稳定的药物易被破坏

答案：D

4. 在配制静脉输液时，不宜用氯化钠注射液溶解的药品是

- A: 维生素 K
- B: 两性霉素 B
- C: 青霉素
- D: 盐酸万古霉素

答案：B

5. 甲状旁腺素制剂属于

- A: 骨形成刺激剂
- B: 骨吸收抑制剂
- C: 促进骨矿化剂
- D: 激素替代剂

答案：A

6. （2015 年真题）患者，男，50 岁，高血压病史 3 年。期间先后用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和引用多种饮料，出现血压波动情况。

- A: 控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同
- B: 控释片比普通片剂含量相同，可以固定时间替换服用
- C: 控释片比普通片剂含量高，不宜嚼碎服用，不然会导致低血压
- D: 控释片比普通片剂含量相同，与普通片给药次数相同

答案：C

7. 治疗真菌性阴道炎的首选非处方药是

- A: 益康唑栓
- B: 甲硝唑栓

C: 咪康唑栓

D: 克霉唑栓或片

答案: C

8. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: β 受体阻断药、钙拮抗剂、ACEI

B: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞药、ACEI

C: 硝普钠、利尿药、ACEI

D: ACEI、AR

答案: A

9. (2016 年真题) 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为 ()。

A: 0.5g, tid

B: 0.1g, tid

C: 0.2g, qd

D: 0.5g, qd

答案: B

10. 开具新药或增加药物前需考虑患者总体情况和药物相互作用，是指

A: 修订医嘱及时沟通

B: 医嘱清楚准确

C: 实现个体化治疗

D: 医嘱完整不漏项

答案：C

11. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

- A: 餐后
- B: 餐前
- C: 睡前
- D: 清晨

答案：A

12. 春季卡他性结膜炎适宜选用

- A: 妥布霉素滴眼液
- B: 碘苷滴眼液
- C: 利巴韦林滴眼液
- D: 2%色甘酸钠滴眼液

答案：D

13. 与西咪替丁、喹诺酮类及大环内酯类药物合用，应减少其用量的药品是

- A: 噻托溴铵
- B: 异丙托溴铵
- C: 氨茶碱
- D: 孟鲁司特

答案：C

14. （2015 年真题）使用前应用原药进行皮试的药物是（）。

- A: 左氧氟沙星片

- B: 阿奇霉素片
- C: 阿莫西林胶囊
- D: 注射用头孢曲松钠

答案：D

15. 下列是 5 位患者血常规检查的结果，其中白细胞计数异常的是

- A: 6 个月～2 岁婴儿 $11.0 \times 10^9 / L$
- B: 成人静脉血 $4.3 \times 10^9 / L$
- C: 成人末梢血 $8.0 \times 10^9 / L$
- D: 成人静脉血 $13.0 \times 10^9 / L$

答案：D

16. 下列临床试验分期中，上市后药品临床评价阶段属于

- A: IIa 期临床试验
- B: IV 期临床试验
- C: III 期临床试验
- D: I 期临床试验

答案：B

17. 抗结核联合治疗方案中，可引起球后视神经炎不良反应的药物是()

- A: 乙胺丁醇
- B: 左氧氟沙星
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

18. 严重肝病患者的尿液常见

- A: 酪氨酸和亮氨酸结晶

- B: 尿酸盐结晶
- C: 磷酸盐结晶
- D: 草酸盐结晶

答案：A

19. 饮酒可使其代谢加快、药效减弱的药物是

- A: 卡马西平
- B: 苯妥英钠
- C: 维生素 B
- D: 利血平

答案：B

20. 适用于已切除子宫的妇女()

- A: 雌孕激素序贯用药
- B: 单纯孕激素补充治疗
- C: 雌孕激素连续联合用药
- D: 单纯雌激素补充治疗

答案：D

21. 可致体重增加的抗癫痫药为（）

- A: 左乙拉西坦
- B: 丙戊酸钠
- C: 苯巴比妥
- D: 苯妥英钠

答案：B

22. 胃食管反流病患者应避免服用的药物是

- A: 关托洛尔

- B: 特拉唑嗪
- C: 阿司匹林
- D: 阿仑膦酸钠

答案: D

23. 布桂嗪属于
- A: 镇痛药
 - B: 抗组胺药
 - C: 血管扩张药
 - D: 利尿剂

答案: A

24. 竞争自肾小管排泄、延长半衰期的是
- A: 四环素+硫酸亚铁
 - B: 西咪替丁+格列本脲
 - C: 多潘立酮+维生素 C
 - D: 青霉素+丙磺舒

答案: D

25. 抗结核治疗中，主要针对细胞内有抗菌杀菌作用的是
- A: 利福平
 - B: 吡嗪酰胺
 - C: 乙胺丁醇
 - D: 异烟肼

答案: B

26. 流行性出血性结膜炎可选用
- A: 0.1% 碘苷滴眼剂

B: 四环素眼膏

C: 2%色甘酸钠滴眼剂

D: 0.1%羟苄唑滴眼剂

答案：D

27. 发挥局部作用的栓剂是

A: 甘油栓

B: 吲哚美辛栓

C: 阿司匹林栓

D: 盐酸克伦特罗栓

答案：A

28. 可治疗男性性功能障碍的药物是

A: 沙美特罗

B: 度洛西汀

C: 西地那非

D: 维生素 E

答案：C

29. 服用华法林期间应进行监测的指标是()

A: APTT

B: RBC

C: INR

D: ALT

答案：C

30. 两性霉素 B 用 0.9%氯化钠注射液溶解，可导致（）

A: 产生胶状不溶物

B: 微浑浊或沉淀

C: 溶液变色

D: 产生气体

答案：B

31. 患者，女，48 岁，因耐药菌引起的心内膜炎使用万古霉素治疗。

A: 低浓度、缓慢滴注，时间控制在 2 小时以上

B: 高浓度、快速滴注，时间控制在 1 小时以内

C: 低浓度、缓慢滴注，时间控制在 6 小时以上

D: 低浓度、快速滴注

答案：A

32. 由美国卫生系统药师协会出版的《Handbook on injectable Drug》袖珍本的中译本是

A: 《药品注射剂使用指南》

B: 《Trissel 混合组分的稳定性》

C: 《注射药物手册》

D: 《Trissel 注射药物手册》

答案：A

33. 脑出血的内科治疗最重要的是

A: 抗生素治疗

B: 给予止血剂

C: 降低血压

D: 控制脑水肿

答案：D

34. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 成人<40U/L
- B: 成人<50U/L
- C: 男性<40U/L
- D: 男性 11~50U/L

答案：A

35. 甲状旁腺制剂

- A: 骨吸收抑制剂
- B: 促进骨矿化剂
- C: 激素替代剂
- D: 骨形成刺激剂

答案：D

36. 流行性出血性结膜炎宜选用

- A: 羟苄唑
- B: 酞丁安
- C: 双氯芬酸
- D: 益康唑

答案：A

37. 引起心悸、心绞痛发作的药物是

- A: 碘和碘化物
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 胰岛素
- D: 左甲状腺素

答案：D

38. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 支气管哮喘还是心源性哮喘
- B: 慢性支气管炎还是急性支气管炎
- C: 肺心病还是冠心病
- D: 肺炎还是肺间质纤维化

答案：A

39. 房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

- A: 硝苯地平
- B: 胺碘酮
- C: 地尔硫
- D: 利伐沙班

答案：C

40. （2019 年真题）患者，男，62 岁，无吸烟饮酒史，患高血压、高脂血症数年，未治疗。半年前就诊，查肝肾功能正常，按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示：AST145U/L，ALT134U/L，排除了其他疾病因素后，停用阿托伐他汀，肝功能逐步恢复正常。一个月后改用普伐他汀，再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应与他汀类药物之间的因果关系应评价为

- A: 很可能
- B: 可能无关
- C: 可能
- D: 肯定

答案：D

41. 可导致性功能减退、皮疹、乳腺增大的药物是

- A: 多沙唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 坦索罗辛
- D: 奥昔布宁

答案：B

42. 与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是()

- A: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊
- B: 维 A 酸片
- C: 非洛地平片
- D: 左旋多巴片

答案：C

43. 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 肌病
- B: 胃肠道疾病
- C: 血液系统疾病
- D: 神经系统疾病

答案：D

44. (2016 年真题) 从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是 ()
。

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 伪麻黄碱
- C: 布洛芬
- D: 氯苯那敏

答案：D

45. 患者，女，48 岁，因耐药菌引起的心内膜炎使用万古霉素治疗。

- A: 凝血功能障碍
- B: 红人综合征
- C: 心功能抑制
- D: 呼吸窘迫症状

答案：B

46. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常首选

- A: 地高辛
- B: 硝酸酯类
- C: 利多卡因
- D: 普萘洛尔

答案：C

47. (新药 4 期临床评价的局限性) II 期临床试验很难发现"低于 1% 发生频率"的不良反应，属于

- A: 观察时间短
- B: 考察不全面
- C: 管理漏洞
- D: 病例数量少

答案：D

48. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 左眼

- A: LD
- B: DOL
- C: NS
- D: O

答案：B

49. 静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

- A: 克拉霉素
- B: 美罗培南
- C: 万古霉素
- D: 头孢哌酮

答案：C

50. 上消化道出血(>50ml)可呈现

- A: 乳凝块便
- B: 白陶土便
- C: 鲜血便
- D: 柏油黑便

答案：D

51. 可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是（）

- A: 阿莫西林
- B: 诺氟沙星
- C: 头孢克洛
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：D

52. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间是

- A: 10 日
- B: 3~5 日
- C: 3~7 日
- D: 1~3 日

答案：C

53. 提示：用药期间不饮酒（或含酒精的饮料），是针对

A: 卡托普利

B: 氯苯那敏

C: 氟西汀

D: 铋制剂

答案：C

54. 下列关于肾功能不全患者给药方案调整方法，错误的是：

A: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量

B: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用双通道(肝肾)消除的药物

C: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠来碱化尿液，以促进药物排泄，防止药源性疾病

D: 肾功能不全者首选肝胆代谢和排泄的药物

答案：C

55. 下列哪个不是慢性咽炎的临床表现

A: 有刺激性咳嗽

B: 咽喉部不适、干燥、发痒、疼痛或有异物感

C: 常伴有发热

D: 清晨起床后常会吐出微量的稀痰，伴有声嘶

答案：C

56. V 级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于循证医学证据推荐强度的

A: B 级

B: D 级

C: E 级

D: C 级

答案: B

57. 冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“D”是指

A: β 受体阻断剂和血压控制

B: 控制饮食和糖尿病

C: 阿司匹林和 ACEI

D: 健康教育和运动

答案: B

58. 下列药物中，患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

A: 苯丙哌林

B: 羧甲司坦

C: 喷托维林

D: 可待因

答案: D

59. 患者，女，48 岁，因耐药菌引起的心内膜炎使用万古霉素治疗。

A: 口服

B: 静脉滴注

C: 肌肉注射

D: 皮下注射

答案: B

60. 属于处方正文的内容为

A: 医疗机构名称

- B: 用法用量
- C: 开具日期
- D: 临床诊断

答案：B

61. 脑梗死的分期，急性期

- A: 2~3 个月
- B: 1 个月内
- C: 1~6 个月
- D: 15 天

答案：B

62. 1 级高血压标准是

- A: 收缩压 160~179mmHg 和(或)舒张压 100~109mmHg
- B: 收缩压 140~159mmHg 和(或)舒张压 90~99mmHg
- C: 收缩压 ≥ 180 mmHg 和(或)舒张压 ≥ 110 mmHg
- D: 收缩压 120~139mmHg 和(或)舒张压 80~89mmHg

答案：B

63. 抑郁症患者的核心症状为 ()

- A: 思维迟缓
- B: 意志活动减退
- C: 认知功能损害
- D: 心境低落

答案：D

64. 急诊处方印刷用纸的颜色是

- A: 淡绿色

B: 淡黄色

C: 淡红色

D: 淡蓝色

答案：B

65. 对于化疗药物引起的呕吐，正确的用药方法对急性或延迟性恶心呕吐发作者，可给予

A: 苯海拉明

B: 羧甲司坦

C: 阿瑞吡坦

D: 昂丹司琼

答案：C

66. 急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂

A: 二巯丁二钠

B: 纳洛酮

C: 乙酰半胱氨酸

D: 谷胱甘肽

答案：B

67. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X 线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

A: 骨髓抑制

B: 恶心、呕吐

C: 脱发

D: 食欲下降

答案：A

68. 给予(透析患者)铁剂的依据是

- A: 有助于机体合成红细胞
- B: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- C: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- D: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛

答案：A

69. 婴儿预防佝偻病，每日补充维生素 D 剂量为

- A: 100~200IU
- B: 300~500IU
- C: 400~800IU
- D: 1000~1500IU

答案：C

70. 治疗中度痤疮宜选用()

- A: 阿昔洛韦软膏
- B: 维 A 酸乳膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 复方苯甲酸酊

答案：B

71. (2018 年真题) 患者,男,65 岁,诊断为持续性心房纤颤,医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症,目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况,药师提出的合理化药物治疗建议,不包括()

- A: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6, 减慢美托洛尔的代谢, 应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量
- B: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性, 在逐渐降低胺碘酮剂量的时候, 注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量
- C: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用, 建议换成氨氯地平或 CCB 降压药
- D: 患者在复律成功后, 尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

答案: C

72. 就乙肝血清免疫学检查而言, 判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目结果是

- A: 抗-HBs(+)
- B: HBsAg(+)
- C: HBeAg(+)
- D: 抗-HBe(+)

答案: C

73. 合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者, 不宜选用的药物是

- A: 多沙唑嗪
- B: 奥昔布宁
- C: 非那雄胺
- D: 坦索罗辛

答案: B

74. 重度癌性疼痛宜选用的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 吗啡
- C: 多奈哌齐

D: 可待因

答案: B

75. 患者，女，33 岁，因“近期阴道分泌物增多，呈鱼腥臭味，并伴有外阴瘙痒，且性交后症状加重”前来就诊。

A: 甲硝唑 400mg, bid, po

B: 克林霉素 300mg, bid, po

C: 替硝唑, 2g, qd, po

D: 氟康唑 150mg, 顿服

答案: A

76. 服用帕罗西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果欲更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停用（）

A: 10 天

B: 14 天

C: 5 天

D: 7 天

答案: B

77. 一般情况下，以洗胃方式解救毒物中毒为首要措施，洗胃液每次的用量为

A: 最多不超过 400ml

B: 最多不超过 200ml

C: 最多不超过 500ml

D: 最多不超过 300ml

答案: C

78. 维生素 B2 的特定吸收部位在小肠上部，故其最适宜服用的时间是

A: 餐前

B: 清晨

C: 餐中

D: 餐后

答案: D

79. 血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

A: 0.8~1.5

B: <0.8

C: 2

D: >1.5

答案: A

80. 患者，女，68 岁，因哮喘急性发作就医。医师处方：雾化吸入沙丁胺醇、异丙托溴铵、布地奈德混悬液，同时静脉注射氨茶碱、氢化可的松琥珀酸钠。患者用药后 3h 出现骨骼肌震颤。实验室检查：血钾 2.7mmol/L （正常参考范围 $3.5\sim 5.5\text{mmol/L}$ ）。引起患者不良反应的药物应该是

A: 氨茶碱

B: 布地奈德

C: 沙丁胺醇

D: 异丙托溴铵

答案: C

81. 以下属于急性肾盂肾炎的表现的是

A: 老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等

B: 尿液常浑浊，有异味

C: 可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难

D: 约 30%可出现血尿

答案：A

82. 患者，男，67 岁，患有糖尿病、冠心病、高血压，服用的药物包括二甲双胍、阿卡波糖、美托洛尔、阿司匹林、福辛普利。近期使用优维显（碘普罗胺注射液，一种碘化对比剂）做腹部增强 CT 扫描，须告知患者检查前数日应停用的药物是

A: 福辛普利

B: 阿卡波糖

C: 美托洛尔

D: 二甲双胍

答案：D

83. （2018 年真题）患者，男，58 岁，体重 68kg，高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰，伴发热，入院查体 BP：120/80mmHg，T38.9℃。化验结果：白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 86%。胸片示：右下肺纹理增粗，诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

A: 莫西沙星

B: 氨苄西林

C: 头孢吡肟

D: 阿莫西林

答案：A

84. 可以导致中性粒细胞减少的药物是

A: 甲巯咪唑

B: 头孢氨苄

C: 对乙酰氨基酚

D: 辛伐他汀

答案：A

85. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 下肢深静脉血栓形成
- B: 下肢动脉栓塞
- C: 病理性骨折
- D: 肺动脉栓塞

答案：A

86. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

- A: 3%过氧化氢
- B: 1%氯化钠
- C: 1%硫酸镁
- D: 1%硫酸铜

答案：C

87. 能用结论较肯定的药物就不用新药，即

- A: 选用对胎儿危害较小的药物
- B: 用药必须有明确的指征和适应证
- C: 可用可不用的药物应尽量不用或少用
- D: 禁止用试验性药

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/087106060046010024>