

2024 年福建省大田县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库大全及参考答案（达标题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

- A: 布地奈德？
- B: 特布他林？
- C: 异烟肼？
- D: 青霉素？

答案：C

2. 糖尿病患者服用后可使血糖降低或升高的药物是

- A: 培高利特
- B: 培氟沙星
- C: 头孢哌酮
- D: 加替沙星

答案：D

3. 更年期综合征最具特征性的症状为

- A: 阴道萎缩
- B: 心悸、胸闷不适
- C: 月经周期延长，经量减少，最后绝经
- D: 潮热、出汗

答案：D

4. (治疗消化性溃疡的胃黏膜保护剂)可促进胃黏膜-黏液分泌与内源性前列腺素生成的药物是 ()

- A: 碳酸镁
- B: 雷贝拉唑
- C: 硫糖铝
- D: 米索前列醇

答案：D

5. 育龄人群慎用，否则可引起畸胎、肿瘤和溶血性贫血风险的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 人促红素
- C: 阿昔洛韦
- D: 脂肪乳

答案：A

6. 阿莫西林片的适宜服药时间是

- A: 餐前
- B: 清晨
- C: 餐中
- D: 餐后

答案：A

7. 药物临床评价是指

- A: 对药物临床前研究的一切新药申报资料的真实性和科学性进行的评估
- B: 新药临床研究在未上市以前进行的利益与风险关系的评估
- C: 新药上市以后对药品的理化性质、质量和价格的评估

D: 对药品治疗效果、不良反应、用药方案、贮存稳定性及药品经济学的评估

答案：D

8. 根据《中华人民共和国药典临床用药须知》，使用前必须做皮试的药物是

- A: 红霉素
- B: 维生素 K1
- C: 克林霉素
- D: 氨苄西林

答案：D

9. 美托洛尔和肾上腺素的相互作用属于()。

- A: 酶诱导作用
- B: 与血浆蛋白结合
- C: 排泄
- D: 作用于同一受体的拮抗作用

答案：D

10. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂?
- B: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁?
- C: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂?
- D: PPI+克拉霉素+呋喃唑酮?

答案：C

11. 新生儿应用氯霉素可引起

- A: 高胆红素血症
- B: 新生儿溶血
- C: 灰婴综合征
- D: 核黄疸

答案：C

12. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

- A: 米泔水样便
- B: 冻状便
- C: 黏液便
- D: 稀糊状或水样粪便

答案：B

13. 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握，必要时需向患者进行解释 OS. 是指

- A: 左眼
- B: 立即
- C: 适量
- D: 右眼

答案：A

14. 不能用热水送服的药物是

- A: 胃黏膜保护剂
- B: 微生态制剂
- C: 镇静催眠药
- D: 磺胺类药物

答案：B

15. 易引起心动过缓的药物

- A: 阿霉素
- B: 紫杉醇
- C: 环磷酰胺
- D: 氟尿嘧啶

答案：B

16. 审核发现用药失误的处方，药师应该

- A: 修改、调配此处方并发出药品
- B: 拒绝调配此处方
- C: 拒绝调配此处方，并依照有关规定报告
- D: 依照此处方调配药品、发出药品

答案：C

17. 下列药品中，最容易吸湿的是

- A: 硫酸钠
- B: 甘油
- C: 乙醇
- D: 维生素 D

答案：B

18. 题]可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

- A: 头孢唑林
- B: 阿米卡星
- C: 诺氟沙星
- D: 米诺环素

答案：C

19. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁
临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

- A: 氨氯地平
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 氯吡格雷

答案：D

20. 给失眠患者开具地西泮，医师应采用的处方纸是

- A: 淡黄色处方纸
- B: 淡绿色处方纸
- C: 白色、右上角无标识处方纸
- D: 白色、右上角有标识处方纸

答案：D

21. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 3 岁以上儿童
- B: 慢性病患者及体弱多病者
- C: 60 岁上的老人
- D: 医疗机构从业人员

答案：A

22. 药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括()

- A: 进行用药指导
- B: 自行修改错误处方

C: 仔细核对药品

D: 严格审核处方

答案: B

23. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是 ()

A: 洛匹那韦

B: 奈韦拉平

C: 多替拉韦

D: 阿巴卡韦

答案: A

24. 适用于重症或伴有喉头水肿的荨麻疹患者的治疗药物是

A: 第二代非镇静抗组胺药

B: 第一代抗组胺药

C: 1: 1000 肾上腺素注射液

D: 肾上腺糖皮质激素

答案: D

25. 绝经激素治疗 (MHT) 应禁用的人群是

A: 甲状腺切除术后的患者

B: 合并轻度高血压的患者

C: 合并高胆固醇血症的患者

D: 6 个月内有静脉血栓栓塞性疾病史的患者

答案: D

26. 宜溶解于温开水中后服用

A: 胶囊剂

B: 糖浆剂

C: 粉剂

D: 泡腾片

答案: D

27. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 阵发性室上性心动过速

B: 心房颤动

C: 室性期前收缩

D: 心室颤动

答案: B

28. 静滴、静注不良反应发生率较高

A: 生理因素

B: 药物的使用

C: 生活和饮食习惯

D: 药物制剂因素

答案: B

29. 苯丙胺中毒

A: 1%硫酸镁溶液

B: 药用炭混悬液

C: 1%氯化钠溶液

D: 5%碳酸氢钠溶液

答案: B

30. 患者，女，33 岁，因“近期阴道分泌物增多，呈鱼腥臭味，并伴有外阴瘙痒，且性交后症状加重”前来就诊。

- A: 甲硝唑 400mg, bid, po
- B: 替硝唑, 2g, qd, po
- C: 氟康唑 150mg, 顿服
- D: 克林霉素 300mg, bid, po

答案：A

31. 各种肠道感染性或非感染性腹泻，或急性胃肠炎可引起

- A: 稀糊状或水样粪便
- B: 米泔水样便
- C: 黏液便
- D: 冻状便

答案：A

32. 在治疗蛔虫病的药物中，“排虫缓慢而可能发生蛔虫游走与穿孔”的是

- A: 阿苯达唑
- B: 噻苯达唑
- C: 枸橼酸哌嗪
- D: 噻嘧啶

答案：A

33. 配制 10%葡萄糖注射液 500ml，现用 50%和 5%的葡萄糖注射液混合，需要

- A: 50%葡萄糖注射液 56ml 和 5%葡萄糖注射液 444ml
- B: 50%葡萄糖注射液 94ml 和 5%葡萄糖注射液 406ml
- C: 50%葡萄糖注射液 72ml 和 5%葡萄糖注射液 428ml

D: 50%葡萄糖注射液 85ml 和 5%葡萄糖注射液 415ml

答案：A

34. 病例对照研究试验结果属于循证医学证据级别

A: 2 级证据

B: 4 级证据

C: 3 级证据

D: 1 级证据

答案：C

35. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A: 奥美拉唑

B: 维生素 B6

C: 雷尼替丁

D: 昂丹司琼

答案：D

36. (2017 年真题) 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐 (Cr) 1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为

31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时

0.5g；肌酐清除率≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

A: 每 24 小时 0.5g

B: 每 8 小时 2g

C: 每 24 小时 1g

D: 每 12 小时 1g

答案：C

37. 高尿酸血症的诊断标准为日常饮食情况下，非同日两次空腹血尿酸水平（ $\text{g/mol} / \text{L}$ ）大于

A: 240

B: 360

C: 420

D: 480

答案：C

38. 乳母服用红霉素，乳汁中红霉素的量高于总用药量 1% 的机制是其

A: 在母体血浆中处于结合状态

B: 呈弱酸性

C: 解离度大

D: 呈弱碱性

答案：D

39. 碱化尿液，服药期间需监测尿 pH 以调整剂量，防止发生尿酸性肾结石的药物是

A: 非布司他

B: 枸橼酸氢钾钠

C: 拉布立酶

D: 苯溴马隆

答案：B

40. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 D 级的是

A: 泮托拉唑

B: 二甲双胍

C: 卡马西平

D: 雷尼替丁

答案: C

41. 服用时不宜立刻饮水，以免冲淡药物而降低药效的是

A: 非洛地平缓释片

B: 磷酸可待因糖浆

C: 聚乙二醇粉剂

D: 吲哚美辛胶囊

答案: B

42. 黄体酮用于输尿管结石

A: 无适应证用药

B: 超适应证用药

C: 过度治疗用药

D: 盲目联合用药

答案: B

43. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的事例中，最正确的是

A: 餐前服用阿莫西林

B: 清晨服用硫酸镁

C: 餐前服用格列本脲

D: 清晨服用帕罗西汀

答案: D

44. 苯二氮类中毒血压下降时可给予 ()

A: 阿托品

B: 去甲肾上腺素

C: 苯妥英钠

D: 有机硫类

答案: B

45. 尽量不用带数字的术语来表示

A: 及时回答不拖延

B: 特别关注特殊人群

C: 保护患者的隐私

D: 解释的技巧

答案: D

46. 适用于伴快速型心律失常的高血压患者服用的药物是

A: 阿利吉仑

B: 氢氯噻嗪

C: 多沙唑嗪

D: 阿替洛尔

答案: D

47. 比沙可啶适用于

A: 低张力性便秘

B: 急性便秘

C: 习惯性便秘

D: 功能性便秘

答案: C

48. 可引起视物模糊、辨色困难的药物是

A: 东莨菪碱

B: 右美沙芬

C: 阿米洛利

D: 氯苯那敏

答案: A

49. 患者，男，23 岁，近日出现大便有鲜血、便后出血自行停止、肛门有坠胀感，无感染症状，诊断为痔疮。可用于患者的治疗药物是

A: 地塞米松软膏

B: 复方片仔癀软膏

C: 复方甲硝唑栓

D: 10%樟脑软膏

答案: B

50. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

A: 剂量递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

B: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效

C: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

D: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

答案: B

51. 能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

A: 麻醉药品

B: 蛋白同化激素

C: 利尿剂

D: 肽类激素

答案: D

52. “室温”所指温度范围是

A: 2℃～10℃

B: $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$

C: $2^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C}$

D: $-5^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

答案：B

53. 药物相互作用使药物吸收增加的联合用药事例是

A: 硝苯地平联用普萘洛尔

B: 阿托品联用普萘洛尔

C: 铁剂联用维生素

D: 青蒿素联用乙胺嘧啶

答案：C

54. 有机磷农药重度中毒时，血胆碱酯酶的活力下降至

A: 70%~50%

B: 0.7

C: 50%~30%

D: 30%以下

答案：D

55. (2017 年真题) 治疗中度痤疮宜选用 ()

A: 维 A 酸乳膏

B: 阿昔洛韦软膏

C: 复方苯甲酸酊

D: 氢化可的松软膏

答案：A

56. 药师与患者进行沟通时的技巧不包括

A: 认真聆听，使用通俗易懂的语言

- B: 与患者谈话时间不宜过长，一次性提供的信息不宜过多
- C: 认真观察对方的表情变化，判断其对问题的理解和接受程度
- D: 尽量使用专业性术语

答案：D

57. 下列症状不是高血压的临床表现的是

- A: 口干
- B: 头晕
- C: 头痛
- D: 心悸

答案：A

58. 患者，男性，45 岁，无痛性肉眼血尿 6 个月来诊，患者于 6 个月前无意中发现排尿全程尿色发深，呈酱油色，无腰痛，尿频，排尿困难，排尿后尿不尽，结合尿常规检查，诊断为良性前列腺增生。

- A: 非那雄胺
- B: 坦索罗辛
- C: 奥昔布宁
- D: 特拉唑嗪

答案：A

59. 可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物代谢速度的是

- A: 食盐中的氯化钠
- B: 食醋中的醋酸
- C: 茶叶中的鞣酸
- D: 酒中的乙醇

答案：D

60. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

- A: 氟桂利嗪
- B: 双氯芬酸
- C: 金刚烷胺
- D: 哌替啶

答案：D

61. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

- A: 钙剂可促进铁剂吸收
- B: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- C: 正常人维持体内铁平衡需要每日从食物中摄取铁 2~2.5mg
- D: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进其吸收

答案：B

62. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu mol / L$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 丙磺舒
- B: 苯溴马隆
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：C

63. 可引起“双硫仑样反应”，给药期间、给药结束 1 周内应禁止饮酒的是

- A: 阿奇霉素

B: 头孢哌酮

C: 莫西沙星

D: 阿米卡星

答案：B

64. 抑制 5- α 还原酶而用于前列腺增生症治疗的药物是

A: 黄酮哌酯

B: 前列康

C: 特拉唑嗪

D: 非那雄胺

答案：D

65. 在药师应该具备的诸项专业技能中，作为药师的最基本工作的是

A: 处方审核

B: 处方点评

C: 药品警戒技能

D: 处方调剂

答案：D

66. (处方缩写) 餐后的缩写为

A: q4h

B: pc

C: iv

D: qid

答案：B

67. 营养性巨幼细胞性贫血主要因为缺乏

A: 鞣酸

B: 叶酸和(或)维生素 B

C: 白细胞

D: 维生素 C

答案：B

68. β 受体阻断剂的主要不良反应是

A: 血尿酸升高

B: 直立性低血压

C: 支气管痉挛

D: 足踝部水肿

答案：C

69. 下列药物使用方式，正确的是

A: 维生素 C 泡腾片用 150ml 温开水浸泡溶解后服用

B: 滴眼液打开使用后，可以连续使用 3 个月

C: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用水送服

D: 酵母片在餐后整片用水送服

答案：A

70. 原发性蛛网膜下腔出血的常见病因为()

A: 高血压性动脉硬化

B: 动脉炎

C: 脑血管畸形

D: 颅内动脉瘤

答案：D

71. 一级信息资料的最突出优点是

A: 内容广泛、使用方便

- B: 读者可以自己 对文献进行评价，免受他人观点的影响
- C: 查阅时需要利用所提供的参考文献去验证
- D: 提供的信息丰富、详实

答案：B

72. 如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，ADR 报告表此栏应填“好转”；所对应的项目是

- A: 不良反应 / 事件的结果
- B: 用药原因
- C: ADR / ADE 过程描述
- D: 用药起止时间

答案：A

73. 最有可能确认患者伤害事件的是

- A: 直接观察
- B: 计算机检测方法
- C: 岗位工作问责
- D: 病历审查

答案：D

74. 某患者，男，25 岁，苯二氮

- A: 硫酸钠
- B: 间羟胺
- C: 亚甲蓝
- D: 氟马西尼

答案：D

75. (2019 年真题) 患者，女，80 岁，高血压病史 28 年，近日自觉感憋气，昨夜出现呼吸困难，不能平躺，喘憋，咳粉红色泡沫样痰，诊断为心力衰竭，应选用的药物是

- A: 硝酸异山梨酯
- B: 氟桂利嗪
- C: 胺碘酮
- D: 呋塞米

答案：D

76. 加速已经进入肠道的毒物排泄的方法不包括

- A: 利尿
- B: 洗胃
- C: 洗肠
- D: 导泻

答案：B

77. 下列医学检查项目中，可用于诊断急性心肌梗死的是

- A: 尿淀粉酶增高
- B: 肌酸激酶增高
- C: 血淀粉酶增高
- D: 胆碱酯酶增高

答案：B

78. 可引起头晕、失眠、抑郁、幻觉、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘的兴奋剂是

- A: 蛋白同化激素
- B: B 受体阻断剂
- C: 精神刺激剂

D: 人生长激素

答案：B

79. 处方中"餐前给药"的外文缩写是

A: po

B: qn

C: ac

D: pc

答案：C

80. 治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

A: 有效性是选择药物的首要标准

B: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本

C: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性

D: 用药安全是药物治疗的前提

答案：B

81. 尤其适用于胸膜炎伴胸痛的干咳患者的药品是

A: 可待因

B: 苯丙哌林

C: 羧甲司坦

D: 右美沙芬

答案：A

82. 下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法，错误的是

A: 禁食富含碘的食物

B: 避免使用含碘药物

C: 哺乳期伴甲状腺功能亢进症患者首选甲巯咪唑

D: 避免饮用咖啡等兴奋性饮料

答案：C

83. 适用于早期、轻度症状者

A: 司来吉兰

B: 苯海索

C: 左旋多巴

D: 恩托卡朋

答案：A

84. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

A: 甘露醇注射液 250mlq6hiv

B: 尼莫地平注射液 20mgqdiv

C: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv

D: 呋塞米片 200mgqdpo

答案：A

85. 向患者发放合理用药宣传材料是

A: 主动方式

B: 协商方式

C: 教育方式

D: 指令方式

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

86. 所有病情稳定并无禁忌证的心功能不全患者一经诊断均应立即使用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/087142116050010024>