北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《消化专业题库考点》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：哪项不是导致小儿腹泻病的内在因素（　）。A.消化系统发育不成熟

B.消化道负担过重

C.肠道内感染

D.血中免疫球蛋白及胃肠道分泌型 IgA 低

E.胃内酸度低

2、单项选择题：等渗性脱水，血清钠的浓度范围是（　）。A.120～140mmol／L

B.125～150mmol／L

C.135～150mmol/L

D.145～155mmol／L

E.120～160mmol／L

3、单项选择题：小儿腹泻脱水，在脱水纠正后出现抽搐，最常见的原因是（　）。A.脑水肿

B.低钠血症

C.低钙血症

D.低血糖

E.低镁血症

4、单项选择题：先天性巨结肠的最常见的并发症是（　）。A.小肠结肠炎

B.腹膜炎

C.肠穿孔

D.败血症

E.肠梗阻

5、单项选择题：度脱水伴循环障碍，扩容阶段的治疗哪项不恰当（　）。A.液体种类为 2：1 等张含钠液

B.输注速度为 30～60min 内静脉快速滴注

C.液体量 20ml／kg

D.同时补钾，浓度不超过 0.3%

E.有重度酸中毒时可用 1.4%碳酸氢钠溶液扩容

6、单项选择题：小儿腹泻其脱水性质不明时，第 1 天静脉补液可选用的液体是（　）。A.1／5 张含钠溶液

B.1／3 张含钠溶液

C.1／2 张含钠溶液

D.2／3 张含钠溶液

E.4：3：2 溶液

7、单项选择题：小儿腹泻致代谢性酸中毒的最主要原因是（　）。A.腹泻丢失碱性物质

B.饥饿性酮症

C.产生酸性代谢产物增加

D.肾脏排酸障碍

E.以上都不是

8、单项选择题：新生儿坏死性小肠结肠炎发病机制的主要因素不包括（　）。A.缺氧缺血致肠壁血灌注减少

B.肠黏膜微循环障碍

C.病原菌直接侵入肠黏膜

D.内毒素激活细胞因子

E.低渗乳汁损伤肠黏膜

9、单项选择题：4 个月男婴。混合喂养，腹泻 2 个月，大便 5～6 次 / 天，稀或糊便，无脓血，食欲好。面部湿疹，体重 5.8kg。最可能的诊断是（　）。A.迁延性腹泻

B.慢性腹泻

C.感染性腹泻

D.饮食性腹泻

E.生理性腹泻

10、单项选择题：欲提高血中 HCO5mmol / L，应选择（　）。A.1.4%碳酸氢钠 1ml/kg

B.1.4%碳酸氢钠 5ml/kg

C.5%碳酸氢钠 1ml / kg

D.5%碳酸氢钠 5ml/kg

E.1.87%乳酸钠 3ml/kg

11、单项选择题：个月男孩，患支气管肺炎，用多种抗生素治疗 20 天，体温下降，病情好转。l　E.血压降低，严重时出现休克

13、单项选择题：患儿，1 岁。腹泻 3 天，蛋花汤样大便，尿量少，口唇干燥，皮肤弹性差。第一天静脉补液总量范围是（　）。A.270～450ml

B.450～630ml

C.630～810ml

D.810～1080ml

E.1080～1350ml

14、单项选择题：1 岁女孩，腹泻 3 天，每日约 20 次，大便呈蛋花汤样，无脓血。体检：前囟、眼窝凹陷，皮肤弹性极差，四肢凉，脉搏细速。化验血清钠 130mmol/L，COCP10mmol/L，首先应给的液体是（　）。A.维持液 120～150ml/kg

B.2：1 等张含钠液 20ml/kg 扩容

C.2：2：1 液 20ml/kg 扩容

D.5%葡萄糖 120～150ml/kg

E.10%氯化钾 10ml/kg

15、单项选择题：小儿补充生理需要，所用液体的张力为（　）。A.1/5 张

B.1/3 张

C.1/2 张

D.2/3 张

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/088017031015006063