专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年广西壮族自治区资源县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题大全（能力提升）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.高血压伴痛风的患者慎用的药物是()

A：卡托普利

B：普萘洛尔

C：氢氯噻嗪

D：硝苯地平

答案：C

2.属于抗过敏非处方药的是

A：息斯敏

B：氯雷他定

C：异丙嗪

D：依巴斯汀

答案：C

3.糖尿病患者一旦出现尿酮体阳性，可以提示患者

A：胰岛素分泌过度

B：病情尚未控制

C：生长激素分泌过度

D：伴甲状腺功能亢进

答案：B

4.关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

A：达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是IIa因子)

B：需监测INR

C：与食物和药物相互作用小

D：可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节

答案：B

5.某男性，53岁，参加婚礼后5小时突发左脚第1跖趾关节剧痛，3小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为500mol/L;足部X线示非特征性软组织肿胀。

A：布洛芬

B：对乙酰氨基酚

C：尼美舒利

D：阿司匹林

答案：B

6.“室温”所指温度范围是

A：-5℃～10℃

B：10℃～30℃

C：2℃～4℃

D：2℃～10℃

答案：B

7.治疗疼痛“1日1次，每次75mg：最大剂量为150mg，分两次服用”的药物是

A：双氯芬酸钠缓释片

B：罗通定

C：氨酚待因片

D: 塞来昔布

答案：A

8.根据药物对胎儿的危害,美国FDA将妊娠用药毒性分为A、B、C、D、X五个级别,依那普利的妊娠毒性分级是()

A: A级

B: X级

C: C级

D: D级

答案：D

9.与地西泮合用会影响其代谢导致镇静催眠作用增强的药物是()

A: 阿司匹林

B: 维生素B

C: 伏立康唑

D: 铝碳酸镁

答案：C

10.美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别卡托普利在妊娠中晚期使用属于药物妊娠毒性分级

A: B级

B: C级

C: A级

D: D级

答案：D

11.以下所列药物中，使用不当可能导致新生儿发生核黄疸的是

A: 吲哚美辛
B: 磺胺类药
C: 苯妥英钠
D: 维生素C
答案：B

12.某患者到药店购买胃得灵，药师应交付的药物是
A: 格列本脲
B: 胃得灵
C: 苯乙双胍
D: 吡拉西坦
答案：B

13.痛风患者急性关节炎期间常见单个关节出现红、肿、热、痛，最常见的病变部位是
A: 颈椎关节
B: 腰椎关节
C: 第一跖趾关节
D: 胸椎关节
答案：C

14.育龄期癫痫患者可酌情选用
A: 乙琥胺
B: 卡马西平
C: 丙戊酸钠
D: 托吡酯
答案：B

15.在人体血中白细胞群体中，中性粒细胞（DC）的正常比例范围是

A：0.20～0.40

B：0.50～0.70

C：0.01-0.05

D：0.03-0.08

答案：B

16.消化性溃疡抗H.pylori的四联疗法使用疗程为（）

A：4～6周

B：10日或14日

C：6～8周

D：8～12周

答案：B

17.由护士双人核对监测

A：药师调配处方差错

B：护士执行医嘱差错

C：医师处方差错

D：患者执行医嘱差错

答案：B

18.服用时不宜立刻饮水，以免冲淡药物而降低药效的是

A：非洛地平缓释片

B：吲哚美辛胶囊

C：磷酸可待因糖浆

D：聚乙二醇粉剂

答案：C

19.治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是：

A: 昂丹司琼

B: 奥美拉唑

C: 维生素B

D: 雷尼替丁

答案：A

20.氯化钾注射液的正确给药方法是

A: 直接静脉注射

B: 直接肌内注射

C: 鞘内注射给药

D: 稀释后静脉滴注

答案：D

21.每次配方尽可能1次完成，是针对

A: 及时沟通

B: 环境整齐、安静

C: 规范操作、坚持核对

D: 配备足够的人力

答案：C

22.药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

A: 替加色罗

B: 塞来昔布

C: 培高利特

D: 钆贝葡胺

答案：D

23.妊娠期妇女治疗眼疾不宜应用的药品是

A：利福平滴眼剂

B：酞丁安滴眼剂

C：醋酸可的松滴眼剂

D：硫酸锌滴眼剂

答案：B

24.患者，男，54岁，患冠心病3年，长期服用阿司匹林，近几天肢体多处出现瘀斑，故前来就诊。实验室检查：PLT70×109／L。下列药物中不会引起血小板减少的药物是

A：磺胺异噁唑

B：氯霉素

C：碳酸锂

D：阿司匹林

答案：C

25.下列哪种药物是WHO规定的第一阶梯镇痛药物

A：吗啡

B：可待因

C：芬太尼

D：阿司匹林

答案：D

26.处方是医院药品消耗及药品经济收入结帐的凭证和原始依据

A：技术性

B：经济性

C: 有效性

D: 法律性

答案：B

27.患者,女,35岁,复杂部分发作性癫痫病史12年,最初使用苯妥英钠单药治疗,6个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量,因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗,癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发,到神经内科复诊。患者同时患有2型糖尿病长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B

A: 丙戊酸钠的不良反应

B: 停用了苯妥英钠

C: 糖尿病病情进展

D: 卡马西平的不良反应

答案：A

28.避免碘摄入过多，甲亢患者应尽量避免服用的药物是

A: 胺碘酮

B: 阿托伐他汀钙

C: 链激酶

D: 氯吡格雷

答案：A

29.医师咨询"他汀类药物合用伊曲康唑或环丙沙星等"，属于

A: 给药途径

B: 禁忌证

C: 药物相互作用

D: 新药信息

答案：C

30.用后不宜马上进食的剂型是()

A: 软膏剂

B: 含漱剂

C: 滴眼剂

D: 直肠栓剂

答案：B

31.单核细胞正常值参考范围是

A: 0.20～0.40

B: 0.01～0.05

C: 0.03～0.08

D: 0～0.01

答案：C

32.与环丙沙星有相互作用合并使用应做血液浓度监测的药物是

A: 异丙托溴铵气雾剂

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 孟鲁司特钠咀嚼片

D: 茶碱片

答案：D

33.患者，男，54岁，以“咳嗽、不适、呼吸困难和喘息、咳痰逾3日”就诊，患者无基础疾病，近1周内未服用药物，诊断为支气管炎。对该患者的经验治疗应选择

A: 阿奇霉素分散片

B: 复方甲氧那明胶囊

C: 头孢克洛颗粒剂

D: 美托洛尔片

答案：B

34.适宜餐前给药的药物是

A: 法莫替丁

B: 复方铝酸铋

C: 缬沙坦

D: 二甲双胍

答案：B

35.摄入过多可导致甲状腺功能亢进症的药物是

A: 甲巯咪唑

B: 碳酸锂

C: 胺碘酮

D: 丙硫氧嘧啶

答案：C

36.对血管平滑肌选择性高，对心肌收缩力或心肌传导作用影响很小的是

A: 哌唑嗪

B: 普萘洛尔

C: 硝酸甘油

D: 氨氯地平

答案：D

37.大剂量易引起碱血症的抗酸药是

A: 西沙必利

B: 莫沙必利

C: 奥美拉唑

D: 碳酸氢钠

答案：D

38.不宜咀嚼或吞服，以免影响药物剂型设计目的的是

A: 糖浆剂

B: 舌下片

C: 粉剂

D: 胶囊剂

答案：B

39.服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是()

A: 布洛芬

B: 伪麻黄碱

C: 对乙酰氨基酚

D: 氯苯那敏

答案：C

40.用于颠茄类生物碱中毒的解救药物是

A: 碘解磷定

B: 阿托品

C: 毛果芸香碱

D: 亚甲蓝

答案：C

41.蒽环类抗生素容易引起急、慢性心脏毒性，可导致左心室功能受损、心衰等，可以采用何种药物预防（）

A: 普萘洛尔

B: 阿托品

C: 辅酶Q

D: 硝苯地平

答案：C

42.以下哪种铁剂口服吸收效果最差

A: 乳酸亚铁(二价铁)

B: 枸橼酸铁(三价铁)

C: 琥珀酸亚铁(二价铁)

D: 右旋糖酐铁(二价铁)

答案：B

43.轻度支气管哮喘疾病的临床表现为

A: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

B: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率>30次/分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常>120次/分，奇脉，Pa0

C: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

D: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

答案：D

44.（2015年真题）上市后药品临床再评价阶段是（）。

A: Ⅱ期临床试验

B: Ⅳ期临床试验

C: Ⅰ期临床试验

D: Ⅲ期临床试验

答案：B

45.以下治疗咳嗽的药物中，白天工作的驾驶员可选用止咳的非处方药是

A：羧甲司坦

B：苯丙哌林

C：可待因

D：氨溴索

答案：B

46.稳定型心绞痛的临床表现不包括

A：压迫、发闷

B：多持续3～5分钟

C：胸痛

D：针刺或刀扎样锐性痛

答案：D

47.季节性过敏性鼻炎的主要诱因是

A：花粉

B：光线

C：冷

D：热

答案：A

48.药物治疗结核病的原则不可随意间断用药、停药、换药

A：适量

B：早期

C：联合

D: 规律

答案：D

49.患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血T3、T4及TSH检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 不含碘的食用盐

B: 海带

C: 虾皮

D: 紫菜

答案：A

50.以下有关肝功能不全患者用药原则的叙述中，不正确的是

A: 选用从肝脏排泄的药物

B: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案

C: 避免或减少使用对肝脏毒性大的药物

D: 特别应避免与肝毒性的药物合用

答案：A

51.患者,男,58岁,体重68kg,高血压病史5年。5天前出现咳嗽、咳痰，伴发热,入院查体BP：120/80mmHg,T38.9℃。化验结果:白细胞计数14.6×109L,中性粒细胞百分比86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

A: 头孢曲松

B: 头孢他啶

C: 阿奇霉素

D: 哌拉西林

答案：B

52.药名词干为"-penem"的药品是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

53.缓解视疲劳可选用的药物是()

A: 色甘酸钠滴眼液

B: 氧氟沙星滴眼液

C: 酞丁安滴眼液

D: 羟甲基纤维素钠滴眼液

答案：D

54.对于尿比重叙述正确的是

A: 尿比重数值的大小取决于尿量的多少

B: 急性肾小球肾炎可引起尿比重降低

C: 新生儿的正常尿比重一般高于成人的正常尿比重

D: 尿比重是指在4℃时尿液与同体积纯水的重量之比

答案：D

55.属于非核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂的是（）

A: 奈韦拉平

B: 洛匹那韦

C: 多替拉韦

D: 阿巴卡韦

答案：A

56.使用前应用青霉素进行皮试的药物是

A：注射用头孢曲松钠

B：左氧氟沙星片

C：阿奇霉素片

D：阿莫西林胶囊

答案：D

57.（2019年真题）患者，男，78岁，因心房颤动服用华法林治疗2年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后INR升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是

A：氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高

B：氟康唑可抑制CYP2C9，导致华法林血药浓度升高

C：氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高

D：氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高

答案：B

58.具有降低TC、LDL-C和TG，升高HDL-C的作用的是（）

A：普罗布考

B：他汀类

C：依折麦布

D：烟酸类

答案：D

59.主要经肝脏清除，肝功能减退时清除明显减少，但并无明显毒性反应发生的药物

A：尽可能避免使用

B: 需增加给药剂量

C: 一般无须调整剂量

D: 须谨慎使用，必要时减量给药

答案：D

60.血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的8%～9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

A: <30g/L

B: 61～90g/L

C: 31～60g/L

D: >90g/L

答案：A

61.根据TDM结果调整给药方案的方法不包括

A: 计分推算法

B: 稳态一点法

C: 重复一点法

D: 一点法

答案：A

62.雌二醇的适应症

A: 子宫内膜癌

B: 前列腺癌

C: 子宫颈癌

D: 绝经期前乳腺癌

答案：B

63.服用华法林期间应进行监测的指标是()

A：ALT

B：INR

C：APTT

D：RBC

答案：B

64.（2018年真题）患者,男,58岁,体重68kg,高血压病史5年。5天前出现咳嗽、咳痰，伴发热,入院查体BP：120/80mmHg,T38.9℃。化验结果:白细胞计数14.6×109L,中性粒细胞百分比86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

A：阿奇霉素

B：头孢他啶

C：头孢曲松

D：哌拉西林

答案：B

65.用药错误Ⅰ级（9级）的标准

A：差错导致患者永久性伤害

B：差错导致患者死亡

C：发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用

D：客观环境或条件可能引发差错

答案：B

66.癫痫持续状态首选的治疗方案是

A：口服地西泮10mg

B：静脉注射地西泮10mg

C: 口服苯妥英钠300mg

D: 口服丙戊酸钠200mg

答案：B

67.患者，女，5岁，体重25kg。两天前受凉后发热，最高体温38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

答案：A

68.由美国卫生系统药师协会出版的《HandbookoninjectableDrug》袖珍本的中译本是

A: 《Trissel混合组分的稳定性》

B: 《Trissel注射药物手册》

C: 《注射药物手册》

D: 《药品注射剂使用指南》

答案：D

69.某女性，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发喘憋。体检:端坐体位，BP190/110mmHg，R30次/分，HR108次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 胺碘酮?

B: 西地兰?

C: 普罗帕酮?

D: 普萘洛尔?

答案：B

70.患者，男，40岁，体重70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于50ml／min时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐(Cr)130μmol／L。医师给出的治疗方案是

A: 经验剂量的3／4

B: 不需要调整给药方案

C: 延长给药间隔时间

D: 经验剂量的1／2

答案：B

71.转复并维持窦性心律的药物是

A: 达比加群酯

B: 美托洛尔

C: 氯吡格雷

D: 胺碘酮

答案：D

72.有肾炎、风湿病伴有心脏损害、高血压患者不宜

A: 饮茶

B: 高盐饮食

C: 吸烟

D: 咖啡

答案：B

73.以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

A: 庆大霉素

B: 甲氨蝶呤

C: 青霉素

D: 多粘菌素

答案：C

74.不能耐受胃肠反应的贫血患者，铁剂适宜服用的时间为

A: 餐后

B: 餐前

C: 两餐间

D: 睡前

答案：A

75.心力衰竭的支气管哮喘禁用

A: 强心苷

B: RAAS抑制剂

C: 利尿剂

D: β受体阻断剂

答案：D

76.对肠道寄生虫具有神经肌肉阻滞作用，蛔虫产生痉挛性麻痹作用的是

A: 阿苯达唑

B: 噻嘧啶

C: 枸橼酸哌嗪

D: 甲苯眯唑

答案：B

77.痛经症状严重者可选用的处方药为

A: 布洛芬

B: 对乙酰氨基酚

C: 可待因

D: 贝诺酯

答案：C

78.适用于年轻、震颤明显患者的是

A: 苯海索

B: 恩托卡朋

C: 司来吉兰

D: 左旋多巴

答案：A

79.速效胰岛素的作用峰时为()。

A: 0.6～1.5小时

B: 1.5～4小时

C: 6～12小时

D: 0.25～0.5小时

答案：A

80.尿失禁治疗的首要处理原则是

A: 进行行为治疗

B: 除去诱因和针对原发病进行治疗

C: 药物治疗

D: 调整生活方式

答案：B

81.静滴、静注不良反应发生率较高

A: 生活和饮食习惯

B: 药物的使用

C: 生理因素

D: 药物制剂因素

答案：B

82.再感染

A: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在6周内再出现菌尿，菌种与上次相同

B: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数>10scfu/ml

C: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药6周后再次幽现真性细菌尿，菌株与上次不同

D: 宜选用毒性小的抗菌药物

答案：C

83.属于X级的药物是

A: 万古霉素

B: 沙利度胺

C: 葡萄糖

D: 阿莫西林

答案：B

84.为防止血管扩张、促进毒物吸收，应用1%氯化钠溶液洗胃应该避免的是

A: 多次反复进行冲洗

B: 最多不超过500ml

C: 减小注入压力

D: 溶液事先加热

答案：D

85.青霉素钠注射液作为皮肤过敏试验的浓度是

A: 100U/ml

B: 250U/ml

C: 750U/ml

D: 500U/ml

答案：D

86.血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患贫血患者常出现的血常规检查异常是

A: 血红蛋白减少

B: 血小板计数增多

C: 中性粒细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：A

87.根据《药品召回管理办法》，药品召回的主体是

A: 药品研究机构

B：药品监督管理部门

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/088075007045007022