

2024 河南省鹿邑县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题大全带下载答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是

- A: 左氧氟沙星
- B: 多索茶碱
- C: 泼尼松龙
- D: 羧甲司坦

答案：D

2. 患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。胺碘酮典型不良反应（）。

- A: ③④⑤
- B: ②④⑤
- C: ①②④⑤
- D: ①③⑤

答案：C

3. 属于抗炎类保肝药的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 双环醇
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 异甘草酸镁

答案：D

4. 低度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

A: 5-HT

B: 每日化疗前，应用 5-HT

C: 奥美拉唑+口服地塞米松

D: 5-HT

答案：B

5. 苯巴比妥与口服抗凝药合用()

A: 抑制排酸作用

B: 子宫内膜突破性出血

C: 代谢加速而导致意外怀孕

D: 代谢加快而失效

答案：D

6. 可与克拉霉素、兰索拉唑联合抗幽门螺杆菌治疗的药物是

A: 青霉素

B: 阿莫西林

C: 苜星青霉素

D: 头孢唑林

答案：B

7. 治疗伤寒、副伤寒，且有耳毒性的药物是

A: 青霉素

B: 红霉素

C: 加替沙星

D: 氯霉素

答案：D

8. 正在使用氯吡格雷的患者如需同时使用质子泵抑制剂，应选择()

- A: 埃索美拉唑
- B: 奥美拉唑
- C: 泮托拉唑
- D: 兰索拉唑

答案：C

9. 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是()

- A: 乳酸钠
- B: 氯化钾
- C: 硫酸镁
- D: 谷氨酸

答案：A

10. 不可逆地抑制血小板 I 相和 II 相聚集的药物是

- A: 华法林
- B: 尿激酶
- C: 噻氯匹定
- D: 肝素

答案：C

11. 痛风急性发作时首选的药物是

- A: 碳酸氢钠
- B: 苯溴马隆
- C: 秋水仙碱
- D: 非布司他

答案：C

12. 用于合胞病毒引起的肺炎和支气管肺炎的抗病毒药是

- A: 碘苷
- B: 阿昔洛韦
- C: 阿糖腺苷
- D: 利巴韦林

答案：D

13. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 抑制 H
- B: 阻断组胺 H
- C: 中和胃酸
- D: 保护胃黏膜

答案：B

14. 下述不属于抗血小板类药物的是

- A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体激动剂
- B: 血栓素 A₂ (TXA₂) 抑制剂
- C: 非特异性纤溶酶原激活剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

15. 可用于预防风湿热复发的药物是 ()

- A: 苻星青霉素
- B: 甲硝唑
- C: 庆大霉素
- D: 呋喃妥因

答案：A

16. (2018 年真题) 可用于治疗非何杰金 (非霍奇金) 淋巴瘤的单克隆抗体是 ()

- A: 曲妥珠单抗
- B: 利妥昔单抗
- C: 贝伐珠单抗
- D: 西妥昔单抗

答案：B

17. 治疗期间避免献血的药物

- A: 异维 A 酸
- B: 维 A 酸
- C: 阿达帕林
- D: 壬二酸

答案：A

18. 下列头孢菌素药物中，半衰期最长的药物是

- A: 头孢孟多
- B: 头孢氨苄
- C: 头孢曲松
- D: 头孢克洛

答案：C

19. 用于肿瘤放、化疗引起的中性粒细胞缺乏症的药物是()

- A: 非格司亭
- B: 氨甲环酸
- C: 香豆素类
- D: 维生素 K

答案: A

20. 抗菌谱极窄，仅对细胞外的结核分枝杆菌有抑制作用的是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 氨曲南
- C: 红霉素
- D: 克拉霉素

答案: A

21. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 来曲唑
- C: 羟喜树碱
- D: 卡莫氟

答案: C

22. 属于中枢和外周多巴胺 D

- A: 多潘立酮
- B: 甲氧氯普胺
- C: 莫沙必利
- D: 昂丹司琼

答案: B

23. 临床用于军团菌病、支原体肺炎、空肠弯曲菌肠炎等首选的治疗药物是

- A: 四环素
- B: 红霉素
- C: 头孢米诺
- D: 阿奇霉素

答案：B

24. 不属于减鼻充血药的是()

- A: 羟甲唑啉
- B: 色甘酸钠
- C: 麻黄碱
- D: 伪麻黄碱

答案：B

25. 口服吸收少，用于肠道感染的是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 氧氟沙星
- C: 甲氧苄啶
- D: 呋喃唑酮

答案：D

26. 可以与青霉素 G 混合的是

- A: 维生素 C
- B: 生理盐水
- C: 葡萄糖注射液
- D: 维生素 B 族

答案：B

27. 多烯磷脂酰胆碱作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- B: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- C: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用
- D: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

答案：D

28. 易产生耐药性,极少单独用药,临床常与两性霉素 B 合用的抗真菌药物是

- A: 卡泊芬净
- B: 氟胞嘧啶
- C: 氟康唑
- D: 特比萘芬

答案：B

29. 成人口服左甲状腺素替代治疗，开始剂量每日 25~50 μg ，每 2 周增加

- A: 6 μg / kg
- B: 5 μg / kg
- C: 25 μg
- D: 4 μg / kg

答案：C

30. 布美他尼的利尿作用部位在()

- A: 髓袢升支粗段

- B: 肾小球
- C: 集合管
- D: 远曲小管初段

答案：A

31. 大量用药可致球后视神经炎的药物是

- A: 红霉素
- B: 吡嗪酰胺
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案：D

32. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：

148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

- A: 卡托普利可提高氢氯噻嗪的血尿酸水平
- B: 卡托普利可减轻氢氯噻嗪的低血糖反应
- C: 氢氯噻嗪可拮抗卡托普利的高血钾倾向
- D: 氢氯噻嗪可增加卡托普利的肾血流量

答案：C

33. 用于敏感真菌所致的深部感染的药物是

- A: 益康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 制霉菌素
- D: 咪康唑

答案：B

34. 糖尿病酮症酸中毒患者选用()

- A: 胰岛素
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 格列本脲
- D: 二甲双胍

答案：A

35. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

- A: 铁剂
- B: 维生素 D
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 钙剂

答案：D

36. 属于选择性 5-HT

- A: 甲氧氯普胺
- B: 昂丹司琼
- C: 莫沙必利
- D: 多潘立酮

答案：C

37. 利福平联用伏立康唑使

- A: 吸收减少
- B: 月经不规则
- C: 肝毒性增加
- D: 疗效减弱

答案：D

38. (2015 年真题) 可用于重度痤疮 (尤其是结节囊肿型痤疮) 的药品是 ()。

- A: 过氧苯甲酰
- B: 异维 A 酸
- C: 克林霉素
- D: 阿达帕林

答案: B

39. 蛇毒血凝酶的给药方式不包括

- A: 静脉注射
- B: 肌肉注射
- C: 皮下注射
- D: 皮内注射

答案: D

40. 鱼精蛋白可用于救治 ()。

- A: 吗啡过量导致的呼吸抵制
- B: 肝素过量导致的出血
- C: 华法林过量导致的出血
- D: 异烟肼中毒导致的神经毒性

答案: B

41. (2016 年真题) 长期应用不但加速自身代谢, 而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是

- A: 唑吡坦
- B: 佐匹克隆
- C: 苯巴比妥
- D: 地西泮

答案：C

42. 多柔比星

- A: 影响蛋白质合成和功能
- B: 干扰 RNA 转录
- C: 直接破坏 DNA 结构和功能
- D: 干扰核酸生物合成

答案：B

43. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

- A: 紫杉醇
- B: 顺铂
- C: 依托泊苷
- D: 来曲唑

答案：D

44. 伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是

- A: 长效 B₂ 受体激动剂
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: M 胆碱受体阻断剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

45. 羟孕酮与戊酸雌二醇配伍作长效注射避孕药，每月需肌内注射次数

- A: 3 次
- B: 1 次
- C: 2 次
- D: 4 次

答案：B

46. 能使凝血因子 I 降解为纤维蛋白单体的药物是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 甲萘氢醌
- C: 卡巴克络
- D: 蛇毒血凝酶

答案：D

47. (2016 年真题) 属于碳青霉烯类

- A: 氨曲南
- B: 头孢美唑
- C: 头孢吡肟
- D: 亚胺培南

答案：D

48. 下列关于睾酮替代治疗的描述，正确的是()

- A: 可直接改善勃起功能障碍
- B: 通过提高性欲治疗继发性勃起功能障碍
- C: 不能改善性腺功能低下
- D: 对年轻患者的作用较老年患者更显著

答案：B

49. 可用于治疗厌氧菌感染和阴道滴虫病的药物是()

- A: 苯唑西林
- B: 甲硝唑
- C: 喹诺酮类
- D: 四环素

答案：B

50. 关于聚乙二醇 4000 治疗便秘的说法，错误的是

- A: 适用人群为成人及 8 岁以上儿童
- B: 疗程不宜过长
- C: 肠梗阻患者禁用
- D: 作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便

答案：D

51. 下列哪项不是胰岛素的正确使用方法

- A: 每次注射需要更换不同部位
- B: 未使用的胰岛素应在 2℃~8℃冷藏保存
- C: 药物过量须及时给予葡萄糖或口服糖类
- D: 混悬型胰岛素可以静脉注射

答案：D

52. 法莫替丁可用于治疗

- A: 心肌梗死
- B: 十二指肠穿孔
- C: 十二指肠溃疡
- D: 急慢性胃炎

答案：C

53. 巨幼细胞贫血应首选

- A: 维生素 B6
- B: 叶酸+维生素 B12
- C: 维生素 B12
- D: 亚叶酸钙

答案：B

54. 容易引起视神经炎的抗结核药物是

- A: 异烟肼
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福平
- D: 链霉素

答案：B

55. 药粉接触患者的眼睛，可导致眼睛疼痛、结膜充血的是

- A: 噻托溴铵
- B: 特布他林
- C: 布地奈德
- D: 沙美特罗

答案：A

56. 下列不属于治疗前列腺增生的药物是

- A: 坦洛新
- B: 西地那非
- C: 非那雄胺
- D: 特拉唑嗪

答案：B

57. （2020 年真题）关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

- A: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用
- B: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药
- C: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%
- D: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快

答案：A

58. 分泌盐皮质激素的是

- A: 网状带
- B: 束状带和网装带
- C: 球状带
- D: 束状带

答案：C

59. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是（）

- A: 马普替林
- B: 度洛西汀
- C: 帕罗西汀
- D: 吗氯贝胺

答案：C

60. 维生素 B12 主要用于治疗的疾病是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 巨幼细胞性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 慢性失血性贫血

答案：B

61. 关于他汀类药物降脂特点的描述，错误的是

- A: 降低血总胆固醇(TC)
- B: 降低血低密度脂蛋白固醇(LDL-ch)
- C: 降低高密度脂蛋白固醇(HDL-ch)
- D: 较弱的降低三酰甘油(TG)的作用

答案：C

62. 我国研制的没有“金鸡纳”反应的药物是

- A: 伯氨喹
- B: 氯喹
- C: 奎宁
- D: 青蒿素

答案：D

63. 关于红霉素使用的叙述，错误的是

- A: 主要由肝脏代谢，代谢物由肾脏排出
- B: 老年人使用发生尖端扭转型室性心动过速的风险增加
- C: 重症肌无力病史的患者使用有病情加重的风险
- D: 在明确需要的情况下可在妊娠期使用

答案：A

64. 下列属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的药物是

- A: 奥利司他
- B: 黄体酮
- C: 环孢素
- D: 米非司酮

答案：A

65. 目前首选的口服减肥药是

- A: 阿法骨化醇
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 奥利司他
- D: 鲑降钙素

答案：C

66. 主要作用于革兰阴性菌的半合成青霉素是

- A: 苯唑西林
- B: 美西林
- C: 匹氨西林
- D: 青霉素 V

答案：B

67. 具有较强的 M 受体阻断作用，能直接解除膀胱逼尿肌痉挛，改善膀胱储尿功能的药物是

- A: 西地那非
- B: 奥昔布宁
- C: A 型肉毒毒素
- D: 睾酮

答案：B

68. 属于 I a 类抗心律失常药的是

- A: 奎尼丁
- B: 胺碘酮
- C: 普罗帕酮
- D: 利多卡因

答案：A

69. 长期服用可导致结肠黑变病的药物是

- A: 番泻叶
- B: 乳果糖
- C: 聚乙二醇

D: 液体石蜡

答案: A

70. 雷尼替丁用于治疗消化性溃疡的机制是

A: 抑制胃壁细胞 H^+ , K^+-ATP 酶

B: 竞争性拮抗 H_2 受体

C: 竞争性拮抗 H_1 受体

D: 直接中和胃酸

答案: B

71. 治疗指数窄，一般治疗量约为中毒量的 1/2 的药物是()

A: 地高辛

B: 卡托普利

C: 哌唑嗪

D: 呋塞米

答案: A

72. (2018 年真题) 对 β -内酰胺类抗菌药物过敏的患者，I 类切口围术期预防应用抗菌药物时，可选用 ()

A: 头孢唑林

B: 青霉素 G

C: 万古霉素

D: 氨曲南

答案: D

73. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

A: 阿瑞吡坦

B: 维生素 B6

C: 甲氧氯普胺

D: 托烷司琼

答案: C

74. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是()。

A: 碱性磷酸酶

B: 肌酸激酶

C: 尿淀粉酶

D: 乳酸脱氢酶

答案: B

75. 下列关于低镁血症的描述，错误的是

A: 长期应用胰岛素，可引起镁向细胞内转移而导致低镁血症

B: 质子泵抑制剂可使镁的排泄减少

C: 抗菌药物可增加镁的排泄

D: 质子泵抑制剂可使镁的排泄增加

答案: B

76. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

A: 阿托品

B: 阿托品+新斯的明

C: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药

D: 胆碱酯酶复活药

答案: C

77. 使用后可产生抗体，1 年内不宜再次使用的药物是

A: 链激酶

B: 尿激酶

C: 阿替普酶

D: 瑞替普酶

答案: A

78. 与受体结合及解离速度较快,较少引起严重低血糖的磺酰脲类药物是()

A: 格列吡嗪

B: 格列齐特

C: 格列喹酮

D: 格列美脲

答案: D

79. 纠正细胞内缺钾的是

A: 磺酰脲类

B: 二甲双胍

C: 胰岛素

D: A 和 B 均无效

答案: C

80. 阿莫罗芬属于

A: 吗啉类

B: 抗生素类

C: 唑类

D: 丙烯胺类

答案: A

81. 下列硝酸酯类药物起效最快的是

A: 硝酸甘油

- B: 硝酸异山梨酯
- C: 戊四醇酯
- D: 单硝酸异山梨酯

答案：A

82. 长期大量服用维生素 D 会出现

- A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- B: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- D: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案：D

83. 患者，男，45 岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀 2 年，加重 1 周"之主诉入院。患者 2 年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1 周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

- A: 预防消化道出血
- B: 治疗肝硬化
- C: 缓解腹胀
- D: 治疗胃溃疡

答案：D

84. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

- A: 吉海反应
- B: 反跳现象
- C: 特异质反应

D: 过敏反应

答案：D

85. 患者，男，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟呼吸急促、面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

A: 地塞米松+肾上腺素

B: 地塞米松+多巴胺

C: 地塞米松+去甲肾上腺素

D: 曲安西龙+异丙肾上腺素

答案：A

86. 严重肝病时应减量慎用、肾功能减退时可按原治疗量使用的是

A: 异烟肼

B: 青霉素

C: 红霉素

D: 氟胞嘧啶

答案：C

87. 抗瘤谱较广，恶性淋巴瘤疗效显著，还可治疗自身免疫性疾病的药物是()

A: 塞替派

B: 丝裂霉素

C: 环磷酰胺

D: 奥沙利铂

答案：C

88. 对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 第二代头孢菌素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/088100117042007022>