

安徽省蚌山区历年《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题（夺分金卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 40mg / kg
- B: 60mg&g
- C: 5mg / kg
- D: 15mg / kg

答案：A

2. 通过阻断血管紧张素 II 受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

- A: 地高辛
- B: 氨力农
- C: 美托洛尔
- D: 氯沙坦

答案：D

3. 长期大量使用林旦后可导致下列哪种不良反应()

- A: 肝脏损害
- B: 白细胞减少
- C: 眼部水肿
- D: 中枢神经系统毒性

答案：D

4. 降压不引起重要器官血流量减少，不影响脂和糖代谢的药物是

A: 拉贝洛尔

B: 可乐定

C: 普萘洛尔

D: 依那普利

答案：D

5. 可与催化肽聚糖合成的磷酸烯醇丙酮酸转移酶不可逆性结合，使该酶灭活，阻断细菌细胞壁的合成，从而导致细菌死亡的是

A: 万古霉素

B: 美罗培南

C: 利奈唑胺

D: 磷霉素

答案：D

6. (2021 年真题) 患者，男，54 岁。拟行膝关节置换术，围手术期宣选用的预防用抗菌药物 ()

A: 头孢他啶

B: 头孢唑林

C: 头孢噻肟

D: 头孢曲松

答案：B

7. 可用于大面积烧伤、创伤、高分解代谢、蛋白丢失负氮平衡者 ()

A: 赖氨酸

B: 复方氨基酸注射液 (18AA)

C: 精氨酸

D: 复方氨基酸注射液(3AA)

答案: B

8. 雌激素类药和孕激素类药均可用于()

A: 前列腺癌

B: 乳房胀痛

C: 绝经期综合征

D: 晚期乳腺癌

答案: A

9. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是

A: 此类药物需在餐前即刻服用

B: 此类药物可降低 2 型糖尿病者的餐前血糖

C: 格列美脲属于本类药物

D: 此类药物不能单独服用

答案: A

10. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是

A: 加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度

B: 提高窦房结和浦肯野纤维的自律性

C: 阻滞多种钾通道，延长动作电位的时程和有效不应期

D: 缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期

答案: C

11. 唯一被批准用于临床的选择性肝固醇吸收抑制剂是()

A: 大剂量阿托伐他汀

B: 依折麦布

C: 小剂量阿托伐他汀

D: 小剂量氟伐他汀

答案: B

12. 治疗高血压危象的药物是()

A: 硝普钠

B: 普萘洛尔

C: 可乐定

D: 依那普利

答案: A

13. 对 M3 受体选择性高，可避免心脏及中枢神经系统的严重不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

A: 奥昔布宁

B: 索利那新

C: 黄酮哌酯

D: 托特罗定

答案: B

14. 骨髓抑制最严重的是()

A: 卡铂

B: 亚叶酸钙

C: 顺铂

D: 奥沙利铂

答案: A

15. 仅用于肠道感染的药物是()

A: 磺胺嘧啶

- B: 柳氮磺吡啶
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 磺胺米隆

答案：B

16. 新生儿出血宜选用

- A: 维生素 K
- B: 低分子肝素
- C: 氨甲环酸
- D: 尿激酶

答案：A

17. 以下药物中，不属于散瞳类药物的是

- A: 阿托品
- B: 去氧肾上腺素
- C: 复方托吡卡胺
- D: 卡波姆

答案：D

18. 与醛固酮受体竞争性结合，拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 甘露醇
- C: 氨苯蝶啶
- D: 螺内酯

答案：D

19. 属于 IB 类钠通道阻滞剂的抗心律失常药是()

- A: 利多卡因

- B: 胺碘酮
- C: 普鲁卡因胺
- D: 维拉帕米

答案：A

20. (2019 年真题) 患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

- A: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险
- B: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定
- C: 应在绝经后 6 年之内开始
- D: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状，但增加患糖尿病的风险

答案：D

21. (2020 年真题) 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

- A: 米诺环素
- B: 利奈唑胺
- C: 阿奇霉素
- D: 万古霉素

答案：D

22. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

- A: 咪康唑
- B: 克霉唑
- C: 环丙沙星
- D: 灰黄霉素

答案：C

23. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

- A: 四环素
- B: 利福平
- C: 环孢素
- D: 苯巴比妥

答案：C

24. 关于糖皮质激素抗炎作用特点的描述，不正确的是

- A: 促进肉芽组织生成，加速组织修复
- B: 直接收缩血管，减少渗出和水肿
- C: 抑制白细胞和吞噬细胞移行血管外，减轻炎症浸润
- D: 稳定溶酶体膜，抑制致炎物的释放

答案：A

25. 属于头孢二代的是

- A: 头孢唑林
- B: 头孢呋辛
- C: 头孢曲松
- D: 拉氧头孢

答案：B

26. 氯霉素的抗菌作用原理是

- A: 抑制蛋白质合成
- B: 抑制 DNA 回旋酶
- C: 干扰叶酸合成
- D: 形成 NAD 的同系物，抑制结核菌生长

答案：A

27. 下列药物中不用于抗心律失常的是

- A: 胺碘酮
- B: 单硝酸异山梨酯
- C: 比索洛尔
- D: 美西律

答案：B

28. 氯吡格雷与奥美拉唑因竞争共同的肝药酶而避免联合应用，该肝药酶是

- A: CYP2D6
- B: CYP2C19
- C: CYP3A4
- D: CYP286

答案：B

29. 抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反应是()。

- A: 急性肝衰竭
- B: 胰腺坏死
- C: 肺部纹理加重
- D: 急性肾衰竭

答案：D

30. 阿司匹林的抗血小板作用机制为

- A: 抑制血小板中 TXA
- B: 促进内皮细胞中 PGI

C: 抑制内皮细胞中 TXA

D: 激活环氧酶

答案：A

31. 选择性沉积在牙齿和骨骼中,不可用于 8 岁以下患儿的药物是

A: 四环素类

B: 大环内酯类

C: 氨基糖苷类

D: 氟喹诺酮类

答案：A

32. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A: 驱钩虫+亚叶酸钙

B: 驱钩虫+口服铁剂

C: 输血+注射右旋糖酐铁

D: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁

答案：B

33. (2020 年真题) 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

A: 利巴韦林

B: 更昔洛韦

C: 阿德福韦酯

D: 拉米夫定

答案：A

34. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

- A: 甲氧氯普胺
- B: 多潘立酮
- C: 胰酶
- D: 莫沙必利

答案：C

35. 属于胸苷酸合成酶抑制剂

- A: 紫杉醇
- B: 氟尿嘧啶
- C: 顺铂
- D: 放线菌素

答案：B

36. 以下适应证与其他四个药物不同的是

- A: 制霉菌素
- B: 联苯苄唑
- C: 特比萘芬
- D: 克霉唑

答案：A

37. 下列抗心律失常药中，属于 I a 类钠通道阻滞药的是()

- A: 苯妥英钠
- B: 奎尼丁

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 利多卡因

D: 普罗帕酮

答案：B

38. 变异型心绞痛宜选用

- A: 地尔硫
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 维拉帕米

答案：C

39. 具有利胆作用的药物是()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 熊去氧胆酸
- C: 肾上腺素
- D: 阿托品

答案：B

40. 可以与青霉素 G 混合的是

- A: 葡萄糖注射液
- B: 生理盐水
- C: 维生素 C
- D: 维生素 B 族

答案：B

41. 严重肝病时应减量慎用、肾功能减退时可按原治疗量使用的是

- A: 异烟肼
- B: 红霉素
- C: 青霉素
- D: 氟胞嘧啶

答案：B

42. 以下关于 5 型磷酸二酯酶抑制剂的描述，正确的是

- A: 口服后生物利用度较高
- B: 口服吸收迅速
- C: 主要经过肾脏代谢
- D: 代谢产物不具有活性

答案：B

43. 唯一可用于治疗深部和皮下真菌感染的多烯类药物是

- A: 灰黄霉素
- B: 制霉菌素
- C: 两性霉素
- D: 氟康唑

答案：C

44. 氟替卡松吸入气雾剂用于中度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 50~100 μg ，一日 2 次
- B: 一次 250~500 μg ，一日 2 次
- C: 一次 100~250 μg ，一日 2 次
- D: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次

答案：B

45. 关于丙硫氧嘧啶的描述，正确的是

- A: 作用较甲巯咪唑弱
- B: 长期应用反馈抑制 TSH 分泌
- C: 使血循环中甲状腺刺激性免疫球蛋白升高
- D: 可抑制外周组织的 T

答案：A

46. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 链激酶
- B: 瑞替普酶
- C: 尿激酶
- D: 阿替普酶

答案：A

47. （2017 年真题）可杀灭疥虫的药物是（）

- A: 维 A 酸
- B: 甲苯达唑
- C: 阿苯达唑
- D: 林旦

答案：D

48. 属于胃黏膜保护剂的是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 莫沙必利
- C: 胃蛋白酶
- D: 胶体果胶铋

答案：D

49. （2020 年真题）使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

- A: 发热、血管扩张、面色潮红
- B: 血压升高或降低、心率加快调

C: 头痛、胸闷、气急、出汗

D: 喉头水肿、尿潴留

答案: D

50. 甲状腺素

A: 可导致粒细胞缺乏症

B: 可导致血管神经性水肿、上呼吸道水肿及喉头水肿

C: 可导致甲状腺功能低下

D: 可诱发心绞痛和心肌梗死

答案: D

51. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向可选用

A: 氨甲环酸

B: 维生素 K1

C: 尿激酶

D: 低分子肝素

答案: B

52. 属于 PD-1 抑制剂，用于食管癌的二线治疗的抗肿瘤药是()

A: 环磷酰胺

B: 巯嘌呤

C: 纳武利尤单抗

D: 氟尿嘧啶

答案: C

53. (2016 年真题) 可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

A: 维生素 B12

B: 硫酸亚铁

C: 重组人促红素

D: 人血白蛋白

答案: C

54. 红霉素的作用机制是

A: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程

B: 与核蛋白 70s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

C: 与核蛋白 50s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

D: 与核蛋白 30s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

答案: C

55. 用药过程中需要监护甲状腺功能的是()

A: 硝普钠

B: 胺碘酮

C: 哌唑嗪

D: 氯沙坦

答案: B

56. 需要 1 周才起效的是

A: 氟西汀

B: 文拉法辛

C: 吗氯贝胺

D: 吡拉西坦

答案: B

57. 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

A: 二甲双胍

B: 华法林

C: 头孢哌酮

D: 阿司匹林

答案: C

58. 四环素联用麦角生物碱

A: 调整抗凝血药的剂量

B: 肝毒性增加

C: 增加麦角中毒的风险

D: 口服吸收减少

答案: C

59. 属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要()

A: 精氨酸

B: 复方氨基酸注射液(18AA)

C: 赖氨酸

D: 复方氨基酸注射液(3AA)

答案: C

60. 关于茶碱给药途径叙述不正确的是

A: 肌注有刺激性

B: 灌肠吸收慢

C: 进餐时或餐后服药，吸收较慢

D: 空腹口服吸收快

答案: B

61. 患者，男，41岁。有吸烟史，间断少量饮酒。因“嗝气、反酸、上腹部疼痛”就诊。经查，医师诊断为“反流性食管炎”此时应给予治疗的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 泮托拉唑
- C: 东莨菪碱
- D: 昂丹司琼

答案：A

62. 兼有镇静、催眠、抗惊厥和抗癫痫作用的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 佐匹克隆
- C: 卡马西平
- D: 苯巴比妥

答案：D

63. 喹诺酮类药物作用机制

- A: 抑制细菌细胞壁合成
- B: 干扰细菌核酸代谢
- C: 抑制细菌蛋白质合成
- D: 抑制细菌糖代谢

答案：B

64. 长效的 5-HT₂受体阻断剂是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 帕洛诺司琼
- C: 劳拉西泮
- D: 氯丙嗪

答案：B

65. 临床上最常用的强心苷类正性肌力药是()

- A: 地高辛
- B: 米力农
- C: 依那普利
- D: 多巴酚丁胺

答案：A

66. 用于功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产的是

- A: 米非司酮
- B: 噻啉啉
- C: 硝苯地平
- D: 绒促性素

答案：D

67. 服用地西泮后病情不会加重的是

- A: 重症肌无力
- B: 高血压
- C: 抑郁症
- D: COPD

答案：B

68. (2015 年真题) 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是 ()。

- A: 他莫昔芬
- B: 丙酸睾酮
- C: 炔雌醇
- D: 阿那曲唑

答案：D

69. 通过保护胃黏膜起到抗消化性溃疡目的的药物是

- A: 硫糖铝
- B: 西咪替丁
- C: 碳酸钙
- D: 奥美拉唑

答案：A

70. 噻嗪类利尿药的利尿作用机制是

- A: 增加肾小球滤过
- B: 抑制近曲小管碳酸酐酶，减少 H^+-Na^+ 交换
- C: 抑制远曲小管近端 Na^+-Cl^- 同向转运系统
- D: 抑制远曲小管 K^+-Na^+ 交换

答案：C

71. 属于糖皮质激素禁忌症的是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 类风湿性关节炎
- C: 严重高血压
- D: 过敏性皮炎

答案：C

72. 氢氯噻嗪的药理作用是()

- A: 与醛固酮受体结合
- B: 提高血浆渗透性，产生组织脱水作用
- C: 抑制近曲小管的碳酸酐酶活性
- D: 抑制远曲小管 Na

答案：D

73. 氨茶碱的作用特点是

- A: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿
B: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效
C: 适用于轻度持续型（2 级以上）哮喘的长期治疗
D: 10 $\mu\text{g/ml}$ 为有效治疗浓度，15-20 $\mu\text{g/ml}$ 以上会出现毒性反应
- 答案：D**

74. 哌拉西林

- A: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效
B: 对支原体有效
C: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效
D: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

答案：D

75. 长期大量应用可致视神经炎、视力下降、视野缩小，出现盲点的是

- A: 乙胺丁醇
B: 链霉素
C: 异烟肼
D: 利福平

答案：A

76. 作用于外周多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

- A: 西沙必利
B: 莫沙必利
C: 多潘立酮
D: 甲氧氯普胺

答案：C

77. 原形从肾脏排泄率最高的喹诺酮类药物是()

- A: 培氟沙星
- B: 环丙沙星
- C: 氧氟沙星
- D: 诺氟沙星

答案: C

78. 通过选择性抑制 5-HT 再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度，从而增强 5-HT 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 舍曲林
- B: 吗氯贝胺
- C: 度洛西汀
- D: 阿米替林

答案: A

79. 下列哪种药物能抑制尿酸生成的是

- A: 别嘌醇
- B: 呋塞米
- C: 丙磺舒
- D: 秋水仙碱

答案: A

80. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗

。

- A: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状
- B: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，升高尿酸量
- C: 碱化尿液，促进尿酸排泄

D: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成

答案：A

81. 有关阿莫西林特点的说法正确的是()

- A: 对耐药金黄色葡萄球菌有效
- B: 口服吸收差，生物利用度小
- C: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效
- D: 耐酸、耐酶

答案：C

82. 滴眼后可能导致再生障碍性贫血的抗菌药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 妥布霉素
- C: 氯霉素
- D: 庆大霉素

答案：C

83. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是()

- A: 克罗米通具有局部麻醉作用
- B: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫
- C: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及寄生虫的作用
- D: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵

答案：D

84. 可特异性拮抗肝素抗凝作用的是

- A: 氨甲环酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 酚磺乙胺

D: 甲萘氢醌

答案：B

85. 抗酸作用较强，有收敛、止血和引起便秘作用

A: 碳酸钙

B: 氢氧化铝

C: 氢氧化镁

D: 三硅酸镁

答案：B

86. 使用时可引起单抗药综合征的是

A: 他莫昔芬

B: 阿那曲唑

C: 曲妥珠单抗

D: 氟他胺

答案：C

87. 属于中枢和外周多巴胺 D

A: 莫沙必利

B: 昂丹司琼

C: 多潘立酮

D: 甲氧氯普胺

答案：D

88. (2018 年真题) 属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是 ()

A: 甘精胰岛素

B: 地特胰岛素

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 低精蛋白锌胰岛素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/095100220010012040>