2024福建省闽清县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库含答案【达标题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.服用时不宜立刻饮水，以免冲淡药物而降低药效的是

A：聚乙二醇粉剂

B：非洛地平缓释片

C：吲哚美辛胶囊

D：磷酸可待因糖浆

答案：D

2.杨某，女，19岁，咳嗽，有脓性痰，并伴有胸痛；发热39℃；肺闻及湿性啰音；WBC>13×10

A：链霉素

B：红霉素

C：利福霉素

D：左氧氟沙星

答案：D

3.（2016年真题）患者，男，45岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗1个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该ADR的因果关系评价结果是（）。

A：很可能

B：可能无关

C: 可能

D: 肯定

答案：D

4.二甲双胍片的适宜服药时间是

A: 餐中

B: 清晨

C: 餐前

D: 餐后

答案：A

5.血栓的发生率增加的指标是

A: INR＞5

B: INR＜1.5

C: INR＜3

D: INR＞3

答案：B

6.属于苯二氮革类药物的是

A: 艾司唑仑

B: 阿米替林

C: 舍曲林

D: 丁螺环酮

答案：A

7.可导致性功能减退、皮疹、乳腺增大的药物是

A: 坦索罗辛

B: 多沙唑嗪

C: 奥昔布宁

D: 非那雄胺

答案：D

8.可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

A: 形成答案并以口头形式提供给询问者

B: 对问题进行确定并归类

C: 随访了解效果，并建立档案

D: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

答案：C

9.有关免疫抑制剂与药物、食物同服的影响，说法错误的有

A: 与抑酸剂合用，吗替麦考酚酯血药浓度降低

B: 与葡萄柚汁同服，环孢素血药浓度升高

C: 与氟康唑同服，他克莫司血药浓度升高

D: 与葡萄柚汁同服，西罗莫司血药浓度降低

答案：D

10.（2019年真题）患者，男，64岁，因右足肿痛就诊。查体:右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果:血尿酸588.1μmol/L。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正服用氢氯噻嗪片25mgqd、美托洛尔缓释47.5mgqd、赖诺普利片20mgqd、辛伐他汀片10mgqd、阿司匹林肠溶片100mgqd。

A: 阿司匹林片（300mg）

B: 双氯芬酸钠片

C: 别嘌醇片

D: 贝诺酯片

答案：B

11.（2015年真题）患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大史3年，临床上对该患者不宜选用（）。

A：苯海索

B：司来吉兰

C：多巴丝肼

D：左旋多巴

答案：A

12.可用于不明毒物中毒、与其形成腐蚀性较小化合物的洗胃液是

A：药用炭混悬液

B：1%氯化钠溶液

C：3%～5%鞣酸溶液

D：鸡蛋白

答案：B

13.影响人类寿命的因素中，社会因素占

A：0.15

B：0.1

C：0.07

D：0.08

答案：B

14.能监测用药过程中错误的真实发生率的方法是

A：岗位工作问责

B：病历审查

C：计算机检测方法

D: 直接观察

答案：D

15.下尿路感染的最突出的表现是

A: 肾区叩击痛

B: 发热

C: 膀胱刺激征

D: 伴明显的腰痛

答案：C

16.将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一评价方法属于()

A: 最小成本分析

B: 成本-效用分析

C: 成本-效益分析

D: 成本-效果分析

答案：C

17.香豆素类杀鼠药中毒呈现

A: 出血、凝血时间延长

B: 呼出气体中可有苦杏仁气味

C: 抽搐、进行性加重

D: 恶心、呕吐、口内有金属味

答案：A

18.首次给药在睡前上床后服用，适用于高血压伴前列腺增生，也用于难治性高血压患者降压药种类是

A: ACEI和ARB

B: β 受体阻断剂

C: 钙通道阻滞剂

D: α 受体阻断剂

答案：D

19.患者，女，45岁，既往有心律失常(Q-T间期延长)、低钾血症病史。近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是

A: 莫西沙星

B: 阿莫西林

C: 头孢呋辛酯

D: 氨溴索

答案：A

20.患者，女，60岁，现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理；因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度己L1～L4椎体T值-2．7SD，BMD749(mg／cm2)；股骨颈T值-2．2SD，BMD602(mg／cm2)。医生诊断为：绝经后骨质疏松症。

A: 患有血栓栓塞性疾病者禁用

B: 妊娠期妇女禁用

C: 肝、肾功能不全者可应用

D: 绝经期超过2年以上的妇女可以应用

答案：C

21.药名词干为"-penem"的药品是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

22.主要不良反应为锥体外系反应的是

A: 西沙必利

B: 莫沙必利

C: 甲氧氯普胺

D: 多潘立酮

答案：C

23.（2015年真题）下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是（）。

A: 妊娠期父母必须联合使用丙硫氧嘧啶

B: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

C: 服用过量可能出现甲状腺功能亢进症状

D: 需要终身服药

答案：A

24.药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配

A: 有效性

B: 技术性

C: 法律性

D: 经济性

答案：B

25.单核细胞正常值参考范围是

A: 0～0.01

B: 0.03～0.08

C: 0.20～0.40

D: 0.01～0.05

答案：B

26.首选用于治疗慢性荨麻疹的药物是

A: 醋酸氟轻松软膏

B: 西替利嗪片

C: 异丙嗪片

D: 氯苯那敏胶囊

答案：B

27.以下中毒解救措施中，正确的药物拮抗是

A: 阿托品拮抗颠茄碱类中毒

B: 二巯丙醇拮抗亚硝酸钠

C: 二巯丙醇结合铅

D: 弱酸中和强碱

答案：D

28.90g/L≤Hb量＜正常参考范围下限可诊断为

A: 轻度贫血

B: 中度贫血

C: 基本正常

D: 重度贫血

答案：A

29.成人末梢血白细胞的参考范围是

A: (4.0～10.0)*10

B: (15.0～20.0)*10

C: (4.0～5.5)*10

D: (3.5～10.0)*10

答案：A

30.适用于阿司匹林哮喘伴过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

A: 孟鲁司特钠咀嚼片

B: 茶碱片

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 异丙托溴铵气雾剂

答案：A

31.苯妥英钠可能导致的多种不良反应中,不包括()

A: 视物模糊

B: 共济失调

C: 低血糖

D: 牙龈增生

答案：C

32.急性肠炎可出现()。

A: 鲜血便

B: 脓血便

C: 胨状便

D: 稀糊便

答案：D

33.服用药物对粪外观的影响,利福平

A: 变红或黑色

B: 橘红至红色

C：黄色

D：红至黑色

答案：B

34.沟通的时间不宜过长，提供的信息不宜过多

A：认真聆听

B：注意掌握时间

C：注意语言的表达

D：关注特殊人群

答案：B

35.高TC血症首选

A：非诺贝特

B：氟伐他汀

C：阿昔莫司

D：依折麦布

答案：B

36.属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的抗HIV药物是

A：阿德福韦

B：替诺福韦

C：利托那韦

D：拉替拉韦

答案：B

37.提示：用药期间不饮酒（或含酒精的饮料），是针对

A：卡托普利

B：铋制剂

C：氯苯那敏

D：氟西汀

答案：D

38.患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温39．1℃，血压138／80mmHg，心率102次／分，呼吸32次／分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数11．2×109／L，中性粒细胞百分比85％。胸部x线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A：抗菌药物应持续用至胸部X线病灶完全吸收

B：当体温正常48～72h且达到肺炎临床稳定标准后，可停用抗菌药物

C：在病原学送检后，可立即实施经验性抗感染治疗

D：病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗

答案：A

39.作为女性便秘型肠易激综合征者缓解症状的短期治疗药物是

A：替加色罗

B：洛哌丁胺

C：乳果糖

D：聚乙二醇粉

答案：A

40.患者，男,69岁，BMI27．8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药"。

A：对因治疗

B：缓和治疗

C：对症治疗

D: 姑息治疗

答案：C

41.患者，男，58岁，高血压病史5年；吸烟史40年，日均40支。2小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅CT检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

A: 甘油果糖注射液500mlbidivgtt

B: 呋塞米片20mgqdpo

C: 尼莫地平注射液200mgqdivgtt

D: 甘露醇注射液250mlq6hivgtt

答案：D

42.在药学信息咨询服务中，应用二级信息资料的最突出优势是

A: 对一个具体问题所提供的信息简明扼要

B: 可以很方便地对所需要的一级文献信息进行筛选

C: 读者能自己评价信息，免受他人观点影响

D: 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识

答案：B

43.毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A: 依地酸钙钠解救铅中毒

B: 药用炭吸附

C: 二巯丙醇"驱汞"治疗

D: 弱碱中和强酸

答案：B

44.药品中的危险品应存放于()，

A: 凉暗库

B: 专用仓库

C: 常温库

D: 低温库

答案：B

45.患者，女，53岁，因“冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死”住院治疗。医师处方：硝酸甘油片、比索洛尔片、注射用重组链激酶冻干粉针剂、依那普利片、肝素钠注射液、辛伐他汀片依那普利的主要不良反应是

A: 出血

B: 高钾血症

C: 心动过缓、二至三度房室传导阻滞

D: 横纹肌溶解症

答案：B

46.无并发症的普通感冒一般几天后可痊愈

A: 5~7日

B: 5~10日

C: 2~3日

D: 3~4日

答案：A

47.禁用油类泻剂导泻的毒物是()。

A：磷化锌
B：麻黄碱
C：麦角胺
D：阿片类药物
答案：A

48.下述"药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的"中，不正确的是
A：排痰化痰
B：预防和控制症状
C：减少急性加重的频次
D：减少急性加重的程度
答案：A

49.(镇静催眠药中毒症状)，巴比妥类重度中毒时出现的中枢神经系统症状为
A：可引起狂躁发作
B：昏迷、血压降低、呼吸抑制、心动缓慢和晕厥
C：可见心律失常、心脏骤停
D：呼吸减慢、变浅不规则，或呈潮式呼吸
答案：A

50.是否增加房颤患者死亡率尚无定论，可谨慎地用于房颤的心室率控制的是()
A：地尔硫
B：普罗帕酮
C：美托洛尔
D：地高辛
答案：D

51.患者，女，65岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

A：①②③④

B：②④⑤

C：①③⑤

D：①②④⑤

答案：D

52.女性，32岁，3年来月经量多，乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞7×10

A：钙剂可促进铁剂吸收

B：正常人维持体内铁平衡需要每天从食物摄铁2～2.5mg

C：尽量空腹服用亚铁盐，以促进吸收

D：碳酸氢钠抑制铁剂吸收

答案：D

53.（2018年真题）某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A：不再继续服用此周期药物,经过一个7天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

B：尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,在以后的7天内要加用屏障避孕法

C：在常规时间20:00服用4月25日的药片,不用补服4月24日的药片

D：尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,不需要使用额外的避孕措施

答案：D

54.可引起嗜酸性粒细胞减少的药物不包括

A：氢化可的松

B：坎地沙坦

C：头孢氨苄

D：甲基多巴

答案：C

55.据统计，全国高血压患者已经超过2亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病；而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有应用药物治疗；而接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅占三成左右。高血压死亡率不断升高，因此熟悉高血压及其相关治疗用药，对更有效地防治高血压非常重要。

A：美托洛尔

B：氢氯噻嗪

C：依那普利

D：哌唑嗪

答案：A

56.美金刚的作用机制为

A：抑制胆碱酯酶

B：脑循环改善剂

C：钙离子拮抗剂

D：抑制N-甲基天冬氨酸受体

答案：B

57.用于产后出血，但在胎盘娩出前禁用的药物是

A：抗组胺药

B: 麦角新碱

C: 水合氯醛

D: 甲巯咪唑

答案：B

58.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

A: 阿托品

B: 维生素B

C: 维生素K

D: 乙酰胺

答案：C

59.服药后宜多饮水的药物是

A: 磺胺类药物

B: 微生态制剂

C: 胃黏膜保护剂

D: 镇静催眠药

答案：A

60.巨幼细胞贫血患者出现周围神经系统症状应首选

A: 维生素B12

B: 苯妥英钠注射液

C: 硫酸亚铁片

D: 叶酸片

答案：A

61.患儿男1岁4个月家长为预防幼儿缺钙,每日给患儿服用维生素D5000IU,3个月后患儿出现乏力、恶心、呕吐食欲不振等症状化验结果血钙18mg/dI，25-OH-D3水平632ng/ml诊断为维生素D中毒下列处理措施错误的是（）

A：增加日晒

B：停用维生素D及强化食品

C：停饮牛奶

D：停用钙剂

答案：A

62.作用于DNA化学结构的药物

A：培美曲塞

B：放线菌

C：顺铂

D：依托泊苷

答案：C

63.在《中国药典》2015年版(三部)中，收载的药品种类是

A：生物制品

B：提取物

C：抗生素

D：生化药品

答案：A

64.药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是()

A：异烟肼与牛奶同服

B：华法林与人参同服

C：硫酸亚铁与维生素C同服

D：左甲状腺素与钙剂同服

答案：C

65.患者，女，58岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高160cm，体重70kg;白细胞8.0×10

A：低血糖

B：心力衰竭

C：肌痛

D：乳酸酸中毒

答案：D

66.影响氟胞嘧啶药效的PK/PD参数是

A：AUC0～24/MIC

B：%T>MI

C：Cmax

D：Cmax/MIC

答案：B

67.与两性霉素B配伍可以析出沉淀的溶媒是

A：5%葡萄糖注射液

B：0.9%氯化钠注射液

C：复方氯化钠注射液

D：50%葡萄糖注射液

答案：B

68.以下所列药物中，最可能引起血小板减少的是

A：阿司匹林

B: 维生素E

C: 呋塞米

D: 硝酸甘油

答案：A

69.具有球后视神经炎不良反应的药物是

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 异烟肼

D: 链霉素

答案：A

70.可吸附砷、沉淀汞的是

A: 1%氯化钠溶液

B: 药用炭混悬液

C: 3%～5%鞣酸溶液

D: 鸡蛋白

答案：D

71.避免用于儿童退热，可能引起Reye’s综合征的药物是

A: 塞来昔布

B: 阿司匹林

C: 对乙酰氨基酚

D: 布洛芬

答案：B

72.（2018年真题）患儿，男，50天，体重5kg,时值夏季，体温37.9℃，出现烦躁，哭闹不安，无其他症状。其家人到药店询购买退热药，药师应推荐（）

A: 减少衣被，可物理降温或必要时就诊

B: 阿苯片，半片，研碎后溶于少量温开水服务

C: 阿司匹林泡腾片（500mg）1/10片，溶于少量温开水服用

D: 对乙酰基酚片（500mg）1/10片，溶于少量温开水服用

答案：A

73.最可能引起血小板计数减少的药物是

A: 氯丙嗪

B: 乳酸钠

C: 阿司匹林

D: 阿莫西林

答案：C

74.驾驶员工作时不宜服用的药品是

A: 维生素C?

B: 氯苯那敏?

C: 阿司匹林?

D: 阿莫西林?

答案：B

75.药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

A: 塞来昔布

B: 培高利特

C: 钆贝葡胺

D: 替加色罗

答案：B

76.属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的药物是

A: 非诺贝特

B: 甲基多巴

C: 依折麦布

D: 辛伐他汀

答案：D

77.下列属于合理处方的是

A: 患者，女，40岁，咳嗽数日，经实验室检查示白细胞和C-反应蛋白均正常，开具阿奇霉素治疗

B: 患者，女，75岁，身高155cm，体重77kg，高脂血症病史10年，因胃癌术后难以进食，给予脂肪乳静脉营养补液，给药期间密切关注血三酰甘油水平

C: 患者，男，72岁，患有活动性胃溃疡，因心肌梗死给予阿司匹林肠溶片

D: 患者，男，35岁，行皮下脂肪瘤切除术（Ⅰ类手术切口），开具头孢哌酮-舒巴坦预防感染

答案：B

78.以硫酸镁治疗子痫，适宜

A: 肌内注射

B: 口服给药

C: 直肠给药

D: 吸入给药

答案：A

79.有关药学服务的叙述，正确的是

A：药学服务涵盖了患者用药相关的全部需求，但不包括对公众的健康教育

B：药学服务的社会属性仅限服务于治疗性药物

C：用药周期长的慢性病患者属于药学服务的重要人群

D：药学服务只涉及更高层次的临床实践，不包括处方调剂、药品检验、药品供应

答案：C

80.照料、监督记忆力差的老年患者用药

A：使用分时药盒和用药记录

B：针对患者生理及心理特点选药

C：简化治疗方案

D：使患者了解药物的重要性

答案：A

81.对皮脂腺分泌过多所致的寻常型痤疮首选

A：10%过氧苯甲酰凝胶

B：0.03%维A酸乳膏剂

C：红霉素-过氧苯甲酰凝胶

D：0.1%阿达帕林凝胶

答案：A

82.服用磺胺甲噁唑时

A：忌用热水送服

B：宜少饮水

C：禁吸烟

D: 宜多饮水

答案：D

83.治疗严重先兆子痫的首选药物为

A: 硫酸镁

B: 美托洛尔

C: 依那普利

D: 氢氯噻嗪

答案：B

84.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约2~5次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC：5×10

A: 药用炭可吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用

B: 首选口服补液，必要时静脉补液

C: 小柴碱和鞣酸蛋白不宜同时服用

D: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充

答案：A

85.因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩,因而被列为兴奋剂管理的药物是()

A: 人促红素

B: 可卡因

C: 哌替啶

D: 甲睾酮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/095111000114012033