专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024江西省黎川县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题完整题库含答案（培优）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.以下不属于胰岛素不良反应的是

A：低血糖

B：皮下硬结

C：脂肪萎缩与肥厚

D：高钾血症

答案：D

2.作用于DNA拓扑异构酶Ⅰ的生物碱是

A：甲氨蝶呤

B：卡莫氟

C：来曲唑

D：喜树碱

答案：D

3.室性心律失常可用

A：地尔硫䓬

B：普萘洛尔

C：美西律

D：地高辛

答案：C

4.应用最广泛的口服抗凝血药是

A：华法林

B：肝素

C：达比加群酯

D：维生素K

答案：A

5.有关阿托品的叙述，错误的是

A：婴幼儿对其毒性不敏感

B：妊娠期静脉滴注阿托品可使胎儿心动过速

C：存在潜在性青光眼时，使用阿托品有诱发危险

D：与促胃肠动力药合用时应有间隔时间

答案：A

6.主要作用于聚合态的微管，抑制微管解聚

A：顺铂

B：氟尿嘧啶

C：高三尖杉酯碱

D：紫杉醇

答案：D

7.（2019年真题）患者女，58岁，血糖升高10年，口服二甲双胍治疗，高血压病史5年，未规律治疗，近期查体：血压158/95mmHg，尿常规示蛋白尿（+++），适宜该患者使用的降压药物是（）

A：依那普利

B：甲基多巴

C：普萘洛尔

D：硝苯地平

答案：A

8.目前仍用作一线抗结核药的是

A: 青蒿素

B: 甲硝唑

C: 二氯沙奈

D: 链霉素

答案：D

9.属于抗菌增效剂的是

A: 氧氟沙星

B: 磺胺嘧啶

C: 甲氧苄啶

D: 呋喃唑酮

答案：C

10.需要皮下注射的糖尿病治疗药物是

A: 艾塞那肽

B: 二甲双胍

C: 阿卡波糖

D: 那格列奈

答案：A

11.精神紧张、情绪恐惧所致的失眠宜选用

A: 夸西泮

B: 氟西泮

C: 谷维素

D: 氯美扎酮

答案：D

12.米诺环素属于

A：氨基糖苷类

B：β-内酰胺类

C：酰胺醇类

D：四环素类

答案：D

13.关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

A：定期检测电解质、肾功能，同时观察24h尿量及尿颜色

B：肾功能不全者可以使用

C：使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

D：必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇

答案：B

14.属于广谱抗心律失常药物

A：苯妥英钠

B：胺碘酮

C：地高辛

D：利多卡因

答案：B

15.治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的是

A：氨苯蝶啶

B：氢氯噻嗪

C：阿米洛利

D：螺内酯

答案：D

16.用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是()。

A：过氧乙酸溶液

B：高锰酸钾溶液

C：酚甘油滴耳液

D：苯酚溶液

答案：C

17.对鞭虫无效的药物是()。

A：噻嘧啶

B：吡喹酮

C：甲硝唑

D：阿苯达唑

答案：A

18.治疗钙缺乏症()

A：阿法骨化醇

B：葡萄糖酸钙

C：依降钙素

D：阿仑膦酸钠

答案：B

19.扎鲁司特属于

A：β肾上腺素受体激动剂

B：M胆碱受体阻断剂

C：黄嘌呤类药物

D：白三烯调节剂

答案：D

20.癫痫部分性发作首选()。

A: 苯妥英钠

B: 乙琥胺

C: 奥卡西平

D: 氯巴占

答案：C

21.患者，男，5岁，体重25kg，有癫痫史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗，体征和实验室检查，白细胞计数15.8×109/L，体温39.5℃，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次20mg/kg)。

A: 乙琥胺

B: 左乙拉西坦

C: 丙戊酸钠

D: 地西泮

答案：C

22.（2020年真题）关于聚乙二醇4000治疗便秘的说法，错误的是

A: 疗程不宜过长

B: 适用人群为成人及8岁以上儿童

C: 作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便

D: 肠梗阻患者禁用

答案：C

23.法莫替丁可用于治疗

A: 十二指肠穿孔

B：十二指肠溃疡

C：急慢性胃炎

D：心肌梗死

答案：B

24.不可用于治疗白细胞减少的药物是

A：利伐沙班

B：腺嘌呤

C：糖皮质激素

D：利可君

答案：A

25.广谱肠道驱虫药，用于治疗钩虫（尤其是美洲钩虫）、蛔虫感染的药物是

A：三苯双脒

B：吡喹酮

C：甲硝唑

D：乙胺嘧啶

答案：A

26.患者，女性，28岁。妊娠5个月。淋雨1天后，出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：体温(T)39℃，脉搏(P)89次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：白细胞(WBC)28×10

A：青霉素

B：四环素类

C：头孢菌素

D：磷霉素

答案：B

27.（2015年真题）可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是（）。

A: 阿达帕林

B: 克林霉素

C: 异维A酸

D: 过氧苯甲酰

答案：C

28.长期大量服用维生素D会出现

A: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

C: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

D: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案：D

29.属于ⅠA类抗心律失常药

A: 普萘洛尔

B: 奎尼丁

C: 胺碘酮

D: 利多卡因

答案：B

30.伊曲康唑与肝药酶的关系是

A: 伊曲康唑主要经CYP2C9酶代谢

B: 伊曲康唑主要经CYP1A2酶代谢

C: CYP3A4酶的诱导剂

D: CYP3A4酶的抑制剂

答案：D

31.某患者，63岁，诊断为"慢性支气管炎急性发作"，痰培养为"铜绿假单胞菌"，下列哪种药物对铜绿假单胞菌无效()

A: 哌拉西林

B: 头孢克洛

C: 头孢他啶

D: 头孢哌酮

答案：B

32.可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

A: 克霉唑

B: 咪康唑

C: 灰黄霉素

D: 环丙沙星

答案：D

33.对浅表和深部真菌感染都有效的抗真菌药物是

A: 氟胞嘧啶

B: 酮康唑

C: 灰黄霉素

D: 特比萘芬

答案：B

34.袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是()

A: 布美他尼
B: 依他尼酸
C: 托拉塞米
D: 呋塞米
答案：A

35.用于低分子肝素过量时解救的药品是
A: 鱼精蛋白
B: 维生素K1
C: 酚磺乙胺
D: 氨甲环酸
答案：A

36.强心苷对以下哪种心功能不全疗效最好
A: 伴有心房扑动、颤动的心功能不全
B: 甲状腺功能亢进引起的心功能不全
C: 严重贫血引起的心功能不全
D: 高度二尖瓣狭窄引起的心功能不全
答案：A

37.患者男性，26岁。主诉发热、全身酸痛，头痛、乏力等，伴有阵发性刺激性干咳，红细胞冷凝集素试验阳性，血清肺炎支原体抗体阳性。
A: 二重感染
B: 肝脏损害
C: 胃肠道反应
D: 过敏反应
答案：A

38.碳酸钙的适应证不包括()

A：骨质疏松

B：缓解肿瘤患者的骨转移疼痛

C：佝偻病

D：骨发育不全

答案：B

39.阿片类药物可影响患者驾驶能力属于

A：尿频、尿急、尿潴留

B：身体和精神依耐性

C：认知障碍

D：便秘、恶心、镇静功能受损

答案：C

40.属于嘧啶类的是

A：氟胞嘧啶

B：制霉菌素

C：卡泊芬净

D：特比萘芬

答案：A

41.典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性，骨髓功能抑制相对较轻的是()

A：卡铂

B：顺铂

C：亚叶酸钙

D：奥沙利铂

答案：B

42.属于白三烯受体阻断剂的是

A：福莫特罗

B：乙酰胆碱

C：孟鲁司特

D：异丙托溴

答案：C

43.下列药物中，与雌二醇无相互作用的是

A：利福平

B：卡马西平

C：氢化可的松

D：苯巴比妥

答案：C

44.属于PD-1抑制剂，用于食管癌的二线治疗的抗肿瘤药是()

A：纳武利尤单抗

B：巯嘌呤

C：环磷酰胺

D：氟尿嘧啶

答案：A

45.（2016年真题）脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是

A：佐匹克隆

B：地西泮

C：异戊巴比妥

D: 阿普唑仑

答案：C

46.可用于急慢性支气管炎的治疗，还能用于环磷酰胺出血性膀胱炎治疗的药物是

A: 溴己新

B: 乙酰半胱氨酸

C: 羧甲司坦

D: 氨溴索

答案：B

47.全身用药毒性大，仅局部用的抗病毒药是()

A: 碘苷

B: 阿糖腺苷

C: 金刚烷胺

D: 阿昔洛韦

答案：A

48.抗酸作用较弱而慢，但持久，对溃疡面有保护作用的是

A: 氢氧化镁

B: 氢氧化铝

C: 碳酸钙

D: 三硅酸镁

答案：D

49.可用于治疗假膜性肠炎的糖肽类药物是

A: 红霉素

B: 万古霉素

C：克林霉素

D：替硝唑

答案：B

50.属于长效避孕药的是

A：氯地孕酮

B：壬苯醇醚

C：左炔诺孕酮

D：米非司酮

答案：A

51.铁剂用于治疗

A：溶血性贫血

B：小细胞低血红蛋白性贫血

C：再生障碍性贫血

D：巨幼细胞贫血

答案：B

52.治疗耐药金黄色葡萄球菌所致的感染或β-内酰胺类过敏患者的G+菌严重感染，首选药物是

A：替硝唑

B：万古霉素

C：克林霉素

D：红霉素

答案：B

53.（2015年真题）在痛风发作的急性期，应当首选的抗痛风药是（）。

A：二氟尼柳

B：苯溴马隆

C：秋水仙碱

D：别嘌醇

答案：C

54.属于抗流感病毒药的是

A：司他夫定

B：恩替卡韦

C：奥司他韦

D：阿昔洛韦

答案：C

55.奥昔布宁、托特罗定与索利那新的代谢酶是

A：CYP3A7

B：CYP3A4

C：CYP2C9

D：CYP3A5

答案：B

56.轻症糖尿病患者宜选用

A：二甲双胍

B：珠蛋白锌胰岛素

C：格列喹酮

D：正规胰岛素

答案：A

57.与可待因合用，不仅加重便秘，还可增加麻痹性肠梗阻和尿潴留危险的是

A: 阿托品

B: 哌替啶

C: 硫酸镁

D: 美沙酮

答案：A

58.（2018年真题）关于奥司他韦作用特点的说法,错误的是（）

A: 应严格掌握奥司他韦适应证,不能用于流感的预防

B: 治疗流感时,首次使用奥同他韦应当在流感症状出现后的36小时以内

C: 1岁以上儿童可以使用奥司他韦

D: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗

答案：A

59.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A: 短期口服给药

B: 长期口服给药

C: 注射给药

D: 注射与口服并用

答案：A

60.铁剂用于治疗

A: 再生障碍性贫血

B: 小细胞低血红蛋白性贫血

C：巨幼红细胞性贫血

D：溶血性贫血

答案：B

61.可选择性抑制MAO-B，用于帕金森病对症治疗的药物是

A：苯海索

B：左旋多巴

C：恩他卡朋

D：司来吉兰

答案：D

62.用于甲型和乙型流感的治疗，应及早在流感开始的第1或第2天开始治疗的药物是

A：两性霉素B

B：膦甲酸钠

C：制霉菌素

D：奥司他韦

答案：D

63.阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致不良反应是

A：便秘

B：低血压

C：躁狂

D：胆绞痛

答案：B

64.（2018年真题）用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为（）

A：金鸡纳反应

B：青霉素脑病

C：瑞夷综合征

D：赫氏反应

答案：D

65.不易导致便秘或腹泻不良反应的药物是

A：氢氧化铝

B：碳酸钙

C：三硅酸镁

D：铝碳酸镁

答案：D

66.急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用()

A：2%过氧化氮溶液

B：3%酚甘油滴耳液

C：2%酚甘油滴耳液

D：3%过氧化氢溶液

答案：D

67.可用于治疗青光眼的是

A：哌替啶

B：毛果芸香碱

C：新斯的明

D：阿托品

答案：B

68.皮肤用糖皮质激素禁忌不正确的是

A：超强效激素宜大面积使用

B：不能用于有皮肤萎缩的部位

C：不能用于皮肤溃疡的部位

D：不能用于局部有明显细菌感染的疾病

答案：A

69.（2016年真题）患者，女，55岁，临床诊断为2型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

A：餐后1小时

B：餐时

C：餐后半小时

D：餐前半小时

答案：B

70.（2017年真题）夜盲症可以使用的治疗药物是（）

A：维生素B1

B：维生素D

C：维生素A

D：维生素B2

答案：C

71.（2015年真题）可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁止使用的抗菌药物是（）。

A：林可霉素类

B：四环素类

C：酰胺醇类（氯霉素）

D：氨基糖苷类

答案：D

72.关于下列抗酸剂的描述，不正确的是

A：抗酸药直接中和胃酸

B：最佳服药时间是餐前

C：不推荐用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状。预防溃疡发生

D：碳酸氢钠属于吸收性抗酸剂

答案：B

73.（2015年真题）属于胰岛素增敏剂的是（）。

A：西格列汀

B：阿卡波糖

C：罗格列酮

D：二甲双胍

答案：C

74.作用于造血祖细胞，促进其增殖和分化，促进成熟细胞向外周血释放的药品是

A：rhGM-CSF

B：维生素B12

C：人血白蛋白

D：硫酸亚铁

答案：A

75.下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是

A：升华硫具有杀灭细菌、真菌及杀虫的作用

B：林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵

C：克罗米通具有局部麻醉作用

D：苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

答案：B

76.属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是()

A：毛果芸香碱

B：噻吗洛尔

C：甘露醇

D：曲伏前列素

答案：B

77.氨基糖苷类的主要排泄途径是

A：经肝、肾双途径清除

B：主要经呼吸道排泄

C：主要经肾脏排泄

D：主要经肝脏清除

答案：C

78.（2020年真题）痛风急性发作时首选的药物是

A：非布司他

B：碳酸氢钠

C：苯溴马隆

D：秋水仙碱

答案：D

79.患者男,8岁,静脉滴注美洛西林后立即出现胸气短、呼吸困难喉头水肿,考虑为青霉素类抗生素的过敏反应按照其发生机制,该患者发生的过敏反应在分型上属于（）

A: Ⅱ型变态反应

B: Ⅳ型变态反应

C: Ⅰ型变态反应

D: Ⅲ型变态反应

答案：C

80.治疗肺孢子菌肺病的首选药物的是()

A: 磺胺米隆

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 磺胺嘧啶

D: 柳氮磺吡啶

答案：B

81.抗炎作用较强，水钠潴留最强的激素是

A: 氢化可的松

B: 泼尼松

C: 倍他米松

D: 地塞米松

答案：A

82.氨基苷类通过下列哪种屏障比较容易

A: 血脑屏障

B: 黏液屏障

C: 血睾屏障

D: 胎盘屏障

答案：D

83.下列对外用糖皮质激素的叙述，不正确的是

A：丁酸氢化可的松是中效外用糖皮质激素

B：氟轻松是强效外用糖皮质激素

C：醋酸氢化可的松是弱效外用糖皮质激素

D：糠酸莫米松是中效外用糖皮质激素

答案：D

84.阿托品用于全麻前给药的目的是()

A：增强麻醉效果

B：预防心动过缓

C：减少呼吸道腺体分泌

D：减少麻醉药的用量

答案：C

85.可使后者疗效显著下降的是

A：红霉素

B：他莫昔芬

C：氯丙嗪

D：维生素C

答案：D

86.半合成青霉素类中，属于广谱青霉素类的是()

A：羧苄西林

B：替莫西林

C：氨苄西林

D：甲氧西林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/095322304114012033