

主管护师考试真题及答案_专业知识

(a1 型题)

1、尿毒症患者护理措施不包括

- a 饮食清单，易消化，优质低蛋白
- b 准确记录 24 小时出入液量
- c 给予心理支持，增强治疗信心
- d 皮肤瘙痒时用酒精擦洗
- e 避免劳累，预防感染

答案：d

2、张力性气胸首选的治疗方法是

- a 胸腔闭式引流
- b 吸氧
- c 呼吸机
- d 呼吸兴奋剂
- e 气管切开

答案：a

3、下列哪种病人可以做胃镜检查

- a 精神失常者
- b 严重的血凝障碍者
- c 腐蚀性食管炎
- d 严重心肺，肝肺功能不全者
- e 上消化道出血

答案：e

4、目前内镜消毒最常用的消毒剂是

- a 2%戊二醛溶液
- b 氯巴定
- c 食具净 333
- d 扎溴铵
- e 氧氯灵

答案：a

5、对病毒性心肌炎最有诊断价值的检查是

- a 超声心动图
- b 血清病毒中和抗体滴度
- c 心音图
- d 心电图
- e 胸片

答案：b

6、胃镜检查病人的护理下列哪一项是错的

- a 检查前禁食 12h

- b 检查完后即可进食，进水
- c 腹胀者可进行按摩，促进排气
- d 检查前可皮下注射阿托品
- e 检查后当日以流食或易消化半流质为主

爱辅助网：www.aifuzhu.top

答案：b

7、肺性脑病不能用高浓度吸氧，主要是为

a 缺氧不是主要因素

b 会引起氧中毒

c 促进 CO₂ 排出过度

d 能解除缺氧对外周化学感受器的刺激

e 诱发代谢性酸中毒

答案：d

8、肺心病患者呼吸功能锻炼下列哪项是正确的

a 腹式呼吸

b 缩唇呼吸

c 深而慢呼吸

d 不用胸部辅助呼吸肌参与呼吸

e 以上四点综合运用

答案：e

9、关于肺炎患者痰培养，下列哪种方法正确

a 晨起深部痰液咳入无菌容器里

b 尽可能在不用抗生素前

c 任何时间的痰均可

d 在两小时内送检

e 可借助雾化吸入导痰

答案：c

10、服毒后最好在几小时内洗胃

a 12 小时

b 10 小时

c 6 小时

d 8 小时

e 8-10 小时

答案：c

11、护理少尿或无尿病人，最主要的措施是

a 卧床休息

b 预防感染

c 保证饮食总热量

d 严格控制钾摄入

e 限制蛋白质的摄入

答案：d

12、消化道中毒后洗胃，每次注入洗胃液量最好为

a 100-150ml

- b 500-600ml
- c 1500ml
- d 200-250ml
- e 1000ml

答案：d

13、纠正 co 中毒缺氧的最有效措施是

爱辅助网：www.aifuzhu.top

- a 低流量吸氧
- b 输血
- c 静脉给普鲁卡因
- d 静脉给阿托品
- e 高压氧仓

答案: e

14、下列哪项最适合急性肾盂肾炎病人饮食需要

- a 高脂肪, 高糖, 高维生素饮食
- b 高脂肪, 高蛋白, 高糖饮食
- c 高脂肪, 高钙饮食, 多饮水
- d 清单富有营养, 多种维生素饮食, 多饮水
- e 高脂肪, 高热量饮食, 多饮水

答案: d

15、持续性非窝床腹膜透析患者出现腹膜炎, 下列护理措施哪项是错误的

- a 用 1000ml 透析液连续冲洗 3-5 次
- b 暂时改做间歇性腹透
- c 腹膜透析内加抗生素
- d 立即拔管
- e 全身应用抗生素

答案: d

16、腹膜透析时出现腹痛, 下列处理不恰当的是

- a 给透析液适当加温
- b 改用高渗透析液
- c 减慢透析液进出速度
- d 让病人变换体位
- e 及时治疗腹膜炎

答案: b

17、对原因不明的急性中毒, 宜取的洗胃液是

- a 茶叶水
- b 1: 5000 的高锰酸钾溶液
- c 2%碳酸氢钠
- d 温开水、生理盐水
- e 2-4%鞣酸

答案: d

18、植入永久性起搏器术后, 护士指导的内容哪项不妥

- a 平卧 24 小时, 同时持续 24 小时心电监护
- b 体温升高时要告诉护士
- c 保持持续吸氧一周
- d 手术侧上肢要制动 72 小时
- e 术后第四天手术侧上肢要进行功能锻炼

答案: c

19、保护易感人群的主动免疫措施是

a 接种抗毒素

b 接种疫苗，菌苗，类毒素

爱辅助网：www.aifuzhu.top

- c 加强营养
- d 注射丙种球蛋白
- e 注射高价免疫球蛋白

答案: b

20、指导伤寒病人卧床休息至什么时候逐渐增加活动量

- a 发热后一周
- b 热退后第一天
- c 热退后两周
- d 发热后两周
- e 热退后一周

答案: e

21、预防伤寒病关键的环节是

- a 控制传染源
- b 切断传播途径
- c 做好传染病调查
- d 提高人群免疫力
- e 以上都不是

答案: b

22、成人患急性弥漫型腹膜炎，并发休克应采取的体位是

- a 头低足高卧位
- b 去枕平卧
- c 侧卧位
- d 头低仰卧位
- e 半卧位

答案: b 文章来源:

23、防止 t 管引流时，下列哪种情况说明胆道远端畅通

- a 黄疸消退，引流量增多，食欲无好转
- b 食欲好转，黄疸消退，引流量减少
- c 上腹胀痛，引流量突然减少
- d 腹痛和黄疸减轻，引流量增多
- e 体温接近正常，引流量增多，仍有腹痛

答案: b

24、下肢深静脉畅通功能实验的目的是了解

- a 下肢静脉有无曲张
- b 交通支瓣膜功能情况
- c 大隐静脉瓣膜功能是否正常
- d 下肢深静脉有无阻塞
- e 下肢深静脉瓣膜功能情况

答案: d

25、颅底骨折脑脊液耳漏，哪项护理错误

a 保持耳道清洁

b 避免腹压增加

c 将干棉球放置外耳道口

d 禁止腰穿

爱辅助网：www.aifuzhu.top

e 冲洗耳道使之畅通

答案: e

26、腹部损伤行腹腔穿刺，抽得不凝血液，应诊断为

a 空腔脏器破裂

b 实质性脏器破裂

c 误穿入腹腔血管

d 后腹膜血肿

e 前腹壁血肿

答案: b

27 检查肛管直肠疾病最长用的卧位是

a 左侧卧位

b 膝胸卧位

c 截右位

d 右侧卧位

e 蹲位

答案: b

28、临床使用三腔管压迫食道静脉止血，管端应悬的重物应为

a 0.3 公斤

b 1 公斤

c 5 公斤

d 0.5 公斤

e 3 公斤

答案: d

29、颅脑损伤病人的护理措施哪项不正确

a 按 gos 表评估意识

b 监测瞳孔变化

c 有无夏柯氏症出现

d 测生命体征

e 正确使用脱水药

答案: c

30、急性阑尾炎时，最具有诊断意义的体征是

a 腹肌紧张

b 结肠冲气实验阳性

c 阑尾点固定性压痛

d 腰大肌实验阳性

e 闭孔肌实验阳性

答案: c

31、判断甲亢治疗效果的标志是

a 情绪变化

b 食欲变化

c 甲状腺大小变化

d 体重变化

爱辅助网: www.aifuzhu.top

e 脉率及脉压变化

答案：e

32、下列哪项是乳腺癌皮肤凹陷的机理

a 乳房皮下淋巴管被癌细胞堵塞

b 癌肿侵犯 cooper 韧带使其收缩

c 癌肿乳管使其收缩

d 癌细胞浸润大片肌肤

e 乳腺血管内有血栓

答案：b

33、终末血尿提示位置在

a 前尿道

b 肾

c 肾盂

d 后尿道或膀胱基底部

e 输尿管

答案：d

34、筋膜室综合症的正确处理是

a 抬高患肢

b 立即切开复位，探索血管

c 拆除外固定

d 密切观察有无肾功能损害

e 彻底切开筋膜减压

答案：e

35、做尿脱落细胞学检查，应收集

a 晨起第一次尿

b 晨起第二次尿

c 收集 12h 尿

d 任何时间的尿均可

e 收集 24h 尿

答案：b

36、肺叶及全肺切除术后，输液速度应为

爱辅助网：www.aifuzhu.top

37、

a 大于 40 滴/分

b 尽可能快

c 没有限制

d 不能超过 40 滴/分

e 尽可能慢

答案：d

37、闭合性骨折石膏固定后最多见的并发症是

- a 血管损伤
- b 神经损伤
- c 骨化性肌炎
- d 关节僵硬
- e 缺血性肌挛缩

爱辅助网: www.aifuzhu.top

答案：d

38、急性胰腺炎时，淀粉酶下降后又上升，表示

- a 病情又有反复
- b 胰泡细胞功能恢复
- c 发生并发症
- d 病人抵抗力增强
- e 病情基本得到控制

答案：a

39、阴道转移结节破溃大出血时，护士应采取紧急止血方法不妥的是

- a 给予心理护理，减少心情焦虑
- b 注意观察病情变化及时测量血压，脉搏
- c 立即行阴道添满
- d 双手拳压迫腹主动脉
- e 建立静脉通道，给予止血药物

答案：d

40、正常产后第三天，乳房涨满而痛，无红肿，伴低热，首先解决的方法是

- a 芒硝敷乳房
- b 用吸奶器吸奶
- c 生麦芽煎汤喝
- d 让新生儿多吸允双乳
- e 少喝汤水

答案：a

41、下列哪项有促进乳汁分泌的作用

- a 早吸吮多吸吮
- b 大剂量雌激素制剂
- c 多吃水果
- d 前列腺素
- e 孕激素制剂

答案：a

42、念珠菌性阴道炎最常见易感人群为

- a 老年妇女
- b 幼女
- c 长期应用光谱抗生素患者
- d 月经期妇女
- e 哺乳期妇女

答案：c

43、产后会阴部护理哪项是错误的

- a 会阴部用 1：5000 高锰酸钾溶液每天冲洗两次
- b 会阴部水肿者，用 50%硫酸镁湿热敷

c 嘱产妇向会阴伤口侧卧位

d 擦洗原则为由上至下由内而外

e 大便后用水清洗保持会阴部清洁

答案：c

44、后穹隆穿刺下列哪项是对的

爱辅助网：www.aifuzhu.top

- a 仰卧位用4 号针头
- b 膀胱结石位用九号针头
- c 随意卧位，几号针头都可以
- d 坐卧位用 5 号针头
- e 侧卧位用 12 号针头

答案： b

45、关于塑料尼龙类的节育器消毒，正确的是

- a 75%酒精浸泡 30 分钟
- b 95%酒精浸泡 30 分钟
- c 经无菌水冲洗后使用
- d 煮沸消毒
- e 高压灭菌

答案： a

46、母乳喂养时，避免乳头皲裂最主要的措施是：

- a 喂哺前消毒乳头
- b 苯甲酸雌二醇涂乳头防皲裂
- c 保持正确吸乳姿势
- d 喂哺前清洗乳头
- e 让新生儿早吸吮多吸吮母乳

答案： c

47、病人被确诊膀胱阴道瘘，漏管开口于阴道壁左侧，请问病人术后最佳卧位是：

- a 仰卧位
- b 俯卧位
- c 右侧卧位
- d 侧卧位
- e 左侧卧位

答案： c

48、为中、重度营养不良患儿补液时，哪项不正确：

- a 补液总量应适当减少
- b 补液速度稍慢
- c 注意补充热量和蛋白质
- d 注意补钙、补镁
- e 不应补钾

答案： e

49、小儿呼吸系统疾病护理要点哪项不妥：

- a 卧床休息
- b 勤翻身拍背吸痰

c 护理操作要集中进行

d 室内通风换气

e 咳喘较重者平卧

答案： e

50、护理青紫型先心病患儿，要保证入量防止脱水，其目的是：

爱辅助网： www.aifuzhu.top

- a 防止心力衰竭
- b 防止肾衰
- c 防止休克
- d 防止血栓栓塞
- e 防止便秘

答案：d

51、对白血病患者使用化疗药时，错误的操作是：

- a 化疗药物多静脉给药
- b 鞘内用药时应快速给药
- c 密切观察化疗药物的毒性反应
- d 注射时应确认静脉通畅时方能注入
- e 操作时最好带一次性手套

答案：b

52、胰岛素使用时应除外哪一项：

- a 餐前 15-30 分钟注射
- b 皮下注射
- c 计量准确
- d 每次更换注射部位
- e 肌内注射

答案：e

53、格林-巴利综合征瘫痪病人护理措施哪项不正确：

- a 补充营养
- b 耐心解释病情
- c 保护瘫痪肢体，有利恢复
- d 鼓励咳嗽，清除痰液
- e 绝对卧床，避免做肢体被动活动

答案：e

54、服用水杨酸制剂时，哪项不正确：

- a 空腹服用
- b 出汗时及时更衣
- c 必要时加服维生素k
- d 防止受凉
- e 同时服用氢氧化铝

答案：a

55、下列哪一项对诊断麻疹恢复期最有意义：

- a 发热、流涕、咳嗽
- b 结合膜充血、流泪

c 手心、脚心有斑丘疹

d 咽红、口腔粘膜充血

e 皮肤呈麦麸样脱屑，棕褐色色素沉着

答案：e

56、一位心梗病人心电监护时发现一提前出现的宽大畸形的 qrs 波群，t 波与 qrs 主波方向相反，你认为这个 qrs 最可能是：

爱辅助网：www.aifuzhu.top

- a 窦性心律不齐
- b 交界区早搏
- c 房性早搏
- d 室性早搏
- e 正常现象

答案：d

57、某幼儿班，近半个月连续出现 10 余名 3-4 岁幼儿精神不振、食欲不振，其中 5 名儿童发热、巩膜黄染。对于为患病幼儿，最正确的处理措施是：

- a 立即疏散该班
- b 立即注射甲肝疫苗
- c 立即注射甲肝疫苗和丙种球蛋白
- d 立即检查肝功能
- e 立即注射乙肝疫苗

答案：c

58、男、50 岁、在家用煤气加热器淋浴时出现头晕、头痛、乏力、胸闷、心悸、恶心等症状。对其进行抢救的首要措施是：

- a 立即将病人搬到室外空气新鲜处
- b 吸氧
- c 给与止痛药
- d 保持呼吸道通畅
- e 松解衣服

答案：a

59、男、18 岁、喷洒农药 3 小时后发生头晕、恶心、腹痛、呼吸有蒜味、神志清楚。患者喷洒时反穿背心短裤，在清除患者被污染的皮肤时忌用温开水的原因：

- a 防止烫伤患者皮肤
- b 防止皮肤血管扩张，促进毒物吸收
- c 抑制呼吸中枢
- d 无法清除毒物
- e 防止毒物对热发生反应

答案：b

60、王某、冠心病 14 年、因心前区疼痛症状加重就诊，在诊室门口护士见到该病人突然晕倒、意识丧失、颈动脉搏动消失、呼吸停止、瞳孔扩大。此时护士应进行哪项抢救措施：

- a 吸氧
- b 人工呼吸
- c 向胸骨中下 1/3 处捶击 1-2 次
- d 心脏按压
- e 静脉输液

答案：c

61、男性、40 岁。饱食后上腹剧痛，伴恶心、呕吐、腹胀 2 小时。血淀粉酶 2000 温氏单位、尿淀粉酶 80 温氏单位。下列哪项不作为重点观察内容：

a 生命体征

b 腹胀、腹痛、肠鸣音

c 血气分析、血、尿淀粉酶结果

爱辅助网：www.aifuzhu.top

- d 呕吐次数
- e 尿量、意识

答案：d

62、男性、50 岁。腹股沟肿块 2 年，考虑腹股沟直疝和斜疝鉴别诊断最有意义的是：

- a 疝块的形状
- b 嵌顿的程度
- c 包块的位置
- d 发病的年龄
- e 回纳疝块后压住内环口，增加腹压后肿块是否在出现

答案：e

63、男性、头部被木棍击伤，x 显示：颅骨凹陷0.7cm。适宜的处置为：

- a 立即手术
- b 50%葡萄糖注射
- c 严密观察病情变化
- d 20%甘露醇 125ml 快速点如入
- e 垫纱布卷包扎

答案：c

64、男性、30 岁、病毒性肝炎 5 年。现肝、脾肿大、肝功能损坏，wbc $4 \times 10^9/l$ 。为确诊是否为门脉高压，最有意义的检查是：

- a 食道钡餐检查
- b 直肠镜检查
- c 骨髓检查
- d 脐周有无静脉曲张
- e 经皮脾静脉造影

答案：a

65、女性、26 岁、右侧卵巢肿物 2 年，1 小时前突然有下腹剧痛伴恶心、呕吐。妇科查体：子宫（-）、右侧附件有手拳大小的囊性肿物、边界清、活动差、左附件（-）、旗诊断是：

- a 肿瘤破裂
- b 右侧附件肿瘤蒂扭转
- c 左附件炎性包块
- d 肿瘤感染
- e 肿瘤恶变

答案：b

66、女、5 岁、浮肿三天伴肉眼血尿，以急性肾炎住院。护士应该在饮食方面知道患儿注意：

- a 低盐饮食，1-2g/日
- b 可以自由选择自己喜欢的零食
- c 高蛋白饮食
- d 浮肿消退后可以进食普食
- e 限制糖的摄入

答案：a

67、某三岁小儿、急性溃疡性口炎。下列护理措施中哪项是错误的：

- a 3%过氧化氢溶液清洗口腔
- b 0.1%利凡诺溶液清洗口腔
- c 西瓜霜粉剂涂患处

爱辅助网: www.aifuzhu.top

- d 2%碳酸氢钠溶液清洗口腔
- e 1%复方龙胆紫溶液涂口腔

答案: d

68、男、25 岁、结肠息肉住院。明日行内镜下结肠息肉切除术，术前准备直接影响疗效的是:

- a 术前流质饮食
- b 术前消除紧张、恐惧心理
- c 术前常规肛门指诊
- d 肠道清洁
- e 术前是否用镇静药

答案: d

69、男、25 岁、结肠息肉住院。明日行内镜下结肠息肉切除术。术前肠道准备哪项是错误的:

- a 番泻叶
- b 硫酸镁
- c 甘露醇
- d 蓖麻油
- e 乙二醇平衡液

答案: c

70、男、25 岁、结肠息肉住院。明日行内镜下结肠息肉切除术。术后饮食应该是:

- a 正规饮食
- b 流食三天。少渣饮食一周
- c 流食一周
- d 流食一天、少渣饮食 2-3 天
- e 流食一天后、正常饮食

答案: c

71、男性、25 岁、左腰部刺伤入院。bp70/50mmhg、伤口持续溢出淡红色液体、左上腹触痛、但无肌紧张及反跳痛。诊断应首先考虑:

- a 脾破裂
- b 胃穿孔
- c 肠破裂
- d 肾损伤
- e 胰腺损伤

答案: d

72、男性、25 岁、左腰部刺伤入院。bp70/50mmhg、伤口持续溢出淡红色液体、左上腹触痛、但无肌紧张及反跳痛。为明确诊断首选哪项检查:

- a b 超检查
- b 伤口溢出液淀粉酶测定
- c 钡餐检查
- d 钡剂灌肠

e 胃镜检查

答案：a

73、男性、25 岁、左腰部刺伤入院。bp70/50mmhg、伤口持续溢出淡红色液体、左上腹触痛、但无肌紧张及反跳痛。该病例处理原则：

爱辅助网：www.aifuzhu.top

- a 非手术治疗
- b 再次出现休克时手术探查
- c 出现腹膜炎表现时探查
- d 立即手术探查
- e 出现肉眼血尿时探查

答案: d

74、题目选项 (b1 型题)

- a、p-r 间期不变、小于 0.2 秒、无 qrs 群脱落
- b、p-r 间期不变、可正常或延长、有 qrs 群脱落
- c、p-r 间期大于 0.2s、无 qrs 群脱落
- d、p 波与 qprs 群无关系
- ep-r 间期逐渐延长直至 qrs 群脱落

第 i 度房室传导阻滞时: a b c d e

第 ii 度 i 型房室传导阻滞时: a b c d e

第 ii 度 ii 型房室传导阻滞时: a b c d e

第 iii 度房室传导阻滞时: a b c d e

答案: bced

75、题目选项 (b1 型题)

- a、1: 5000 高锰酸钾液坐浴
- b、禁食、保持胃肠减压通畅
- c、肛管排气
- d、清洁灌肠、清除肠道粪便
- e、洗胃

女性、肛周脓肿切开引流术后第一天: a b c d e

女性、结肠癌术后第一天: a b c d e

女性、结肠癌术前清洁肠道: a b c d e

答案: abd

76、题目选项 (b1 型题)

- a、大网膜不易包裹、穿孔率高
- b、麦氏点压痛位置高
- c、压痛可以在任何部位
- d、症状、体征与病理改变往往不一致
- e、阵发性腹痛、间歇期不痛、无局部体征

妊娠中、后期合并阑尾炎时: a b c d e

小儿阑尾炎的特点: a b c d e

老年人阑尾炎: a b c d e

答案: abd

77、题目选项 （b1 型题）

- a、硬肿症患儿体温过低
- b、硬肿症患儿有感染危险
- c、硬肿症患儿有潜在并发症：肺出血
- d、硬肿症患儿营养失调
- e、硬肿症患儿知识缺乏

爱辅助网：www.aifuzhu.top

与免疫功能低下有关：a b c d e

与早产寒冷有关：a b c d e

与严重微循环障碍有关：a b c d e

答案：abc

78、三腔二囊管的护理措施哪项是正确的：(x 型题)

a 插管前仔细检查、确保各管腔通畅

b 经鼻腔插管到胃里、先向食管囊注气、在相胃囊注气

c 出血停止后立即拔管

d 定时抽吸胃管、注意观察出血是否停止

e 气囊压迫一般 3-4 日为限

答案：ade

79、护士在协助医师为一位房颤病人进行电转复治疗时应采取的措施：

a 呼唤病人确定病人已入睡

b 术中用热水袋为病人保暖

c 固定病人四肢以防电极移位

d 放电时提醒医护人员离开病人

e 用干纱布包裹电极以防灼伤皮肤

答案：acde

80、恶性肿瘤 x 线片可见：

a 骨皮质完好

b 阴影清晰

c 无骨膜反应

d 轮廓欠明确

e 边界不明

答案：de

81、对脊柱骨折合并截瘫的病人护理重点：

a 提供心理社会支持

b 多给与生活照顾

c 预防三大并发症

d 满足营养需要、多进纤维多的食物

e 进行下肢被动活动

答案：abcde

82、甲状腺一侧切除后发生窒息的可能源有：

a 出血压迫气管

b 喉头水肿

c 气管塌陷

d 喉返神经损伤

e 喉上神经损伤

答案： ab

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/096102120230011011>