

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、患者，女性，55 岁。因高速车祸 4 小时入院，伤后当时浅昏迷，GCS 评分 5 分，呼吸急促(38 次/分)伴口严重发绀，面部严重肿胀，脉搏摸不到，手足发冷，血压 5

0/30mmHg。假如你是现场救护人员，首先实施的抢救措施是 0

- A、立即建立静脉通路、抗休克治疗
- B、进行创伤严重度评分
- C、立即送往医院
- D、气管插管、给氧
- E、仔细检查，明确诊断

【答案】： D

2、血红蛋白低于或等于?时，应嘱患者卧床休息，活动时动作要缓慢，避免突然体位改变()

- A、30g/L
- B、40g/L
- C、60g/L
- D、80g/L
- E、100g/L

【答案】： C

3、患者，女性，58 岁，慢性支气管炎病史 10 年，慢阻肺病史 5 年。护士在夜间查房时发现患者剧烈咳嗽后突感上胸刺痛、胸闷、呼吸困难，不能平卧，查体：左侧

胸廓膨隆、呼吸运动减弱、叩诊呈鼓音，听诊左肺呼吸音明显减弱，应考虑为 0

- A、肺梗死
- B、急性心肌梗塞
- C、自发性气胸
- D、支气管哮喘
- E、胸腔积液

【答案】： C

4、对成人进行胸外心脏按压时，双手应该 0

- A、双手掌根重叠
- B、双手指重叠
- C、掌心紧贴胸壁
- D、手指紧贴胸壁
- E、掌根压胸壁

【答案】： A

5、有关脑震荡表现不正确的是 0

- A、逆行性健忘
- B、颅内压增高
- C、血压下降
- D、意识障碍不超过 30 分钟
- E、生理反射迟钝

【答案】： B

6、艾滋病的主要传播途径是 0

- A、饮食传播
- B、母婴传播
- C、蚊虫叮咬
- D、血液传播
- E、性接触传播

【答案】： E

7、糖尿病昏迷患者使用胰岛素时应注意补充 O

- A、 Na^+
- B、 Cl^-
- C、 Ca^{2+}
- D、 K^+
- E、 Mg^{2+}

【答案】： D

8、“熊猫眼征”提示)

- A、颅中窝骨折
- B、颅后窝骨折
- C、颅前窝骨折
- D、颅盖骨折
- E、颅盖线性骨折

【答案】： C

9、危重病人长期取仰卧位时最易发生压疮的部位是 O

- A、坐骨结节处
- B、骶尾部
- C、大转子处
- D、肩胛骨
- E、第七颈椎

【答案】： B

10、在基础生命支持评估呼吸情况时，评估时间不应超过 O

- A、5 秒 钟
- B、10 秒钟
- C、15 秒 钟
- D、20 秒钟

【答案】： B

11、糖尿病酮症酸中毒的表现错误的是 O

- A、酮体生成过多

B、水肿

C、治疗前，血钾偏高或正常

D、携氧功能障碍

【答案】： B

12、急性敌百虫中毒禁用 0 溶液洗胃。0

A、清水、生理盐水

B、1:5000 高锰酸钾溶液

C、2%重曹溶液

D、牛奶、蛋清水

E、活性炭

【答案】： C

13、锐器伤的职业防护措施中有错的是 0

A、在有可能接触病人血、体液时必须戴手套

B、手术中用弯盘存放锐器后再传递

C、抽吸药液后必须立即用双手操作套上针帽

D、锐器不可与其他医疗垃圾混放

E、用砂轮划痕后垫纱布再瓣安瓿

【答案】： C

14、高血压脑出血的主要发病机制是 0

A、小动脉壁受损出血

B、微动脉瘤的形成与破裂

C、脑淀粉样血管病

D、脑软化后出血

E、脑动脉结构异常

【答案】： B

15、骨折现场急救，错误的是 0

A、重点检查有无内脏损伤

B、开放性骨折应现场复位

C、取清洁布类包扎伤口

D、就地取材，固定伤肢

E、平托法搬移脊柱骨折病人

【答案】： B

16、急救时医师下达口头医嘱，以下错误的选项是 0。

- A、护士要进行口头复述，经医生确认后方可执行。
- B、待抢救结束后 30 分钟内补下医嘱。
- C、补下医嘱的时间为录入医嘱的时间。
- D、由参加抢救的经治或值班医师补下医嘱。
- E、以上均正确

【答案】： C

17、男性，50 岁，车祸后 6 小时入院，神志淡漠，四肢冰冷，血压 9.33/6.67KPa(70/50mmHg) 诊断为 0

- A、轻度低血容量性休克
- B、中度低血容量性休克
- C、重度低血容量性休克
- D、中度感染性休克
- E、重度感染性休克

【答案】： B

18、抢救口服有机磷农药中毒病人洗胃时最常用的洗胃液是 0

- A、0.9%氯化钠注射液、温开水
- B、热开水
- C、2%碳酸氢钠
- D、1:5000 高锰酸钾溶液
- E、5%葡萄糖注射液

【答案】： A

19、休克早期血压的变化 0

- A、收缩压下降，脉压差小
- B、收缩压升高，脉压差大
- C、收缩压正常，脉压差小
- D、收缩压下降，脉压差大
- E、血压无变化

【答案】： C

20、地震发生现场，某患者出现大量肠管脱出，此时首先要做的是 0

- A、进行保护性包扎
- B、把肠管回纳腹腔
- C、暂时不予处理
- D、马上紧急处理
- E、给予止痛药

【答案】： A

21、关于呼吸的观察不正确的是 0

- A、成人安静时每分钟 16~20 次
- B、每分钟超过 24 次称呼吸增快，每分钟少于 10 次称呼吸减慢
- C、潮式呼吸和间歇呼吸属于节律异常的呼吸
- D、呼吸困难分为吸气性、呼气性和混合性三类
- E、呼气时发出鼾声是由于喉头痉挛引起

【答案】： E

22、中度有机磷农药中毒病人的血胆碱酯酶活性为 0

- A、70%~50%
- B、50%~30%
- C、30%~29%
- D、<20%
- E、80%~70%

【答案】： B

23、消化性溃疡最常见的并发症是 0

- A、穿孔
- B、出血
- C、幽门梗阻
- D、感染
- E、癌变

【答案】： B

24、适用于卷轴带开始及终了的包扎方法是 0

- A、蛇形
- B、螺旋形
- C、“8”字形
- D、环形
- E、螺旋反折形

【答案】： D

25、急性镇静安眠药中毒时，可选用)药物促进苏醒，同时还有拮抗呼吸抑制作用。

- ()
- A、美蓝
 - B、VK1
 - C、解碘定
 - D、阿托品
 - E、纳络酮

【答案】： E

26、斜正重症酸中毒时，根据二氧化碳结合力和 FH 值应给予 0

- A、甘露醇
- B、碳酸氢钠
- C、葡萄糖
- D、氯化钠

E、转化籍

【答案】： B

27、以上哪种情况应禁忌洗胃 0

A、急性有机磷农药中毒

B、急性安定中毒

C、

飘药中毒

D、强酸、强碱中毒

E、食物中毒

【答案】： D

28、高危药品效期管理要做到以下 0

A、先进先出

B、近效期先用

C、严格储藏

D、严格保养

E、以上全都是

【答案】： E

29、终止室颤最迅速、最有效的措施是 0

A、立即胸外心脏按压

B、立即给予除颤

C、尽快给予气管插管

D、立即给予球囊-面罩通气

E、立即给予肾上腺素 1mg 静脉注射

【答案】： B

30、患者男性，46 岁。诊断为“上消化道出血”收住院，为明确出血原因，首选的检查方法是)

A、大便隐血试验

B、X 线钡剂造影

C、内镜检查

D、血常规检查

E、B 超检查

【答案】： C

31、膀胱刺激征是指 0

- A、尿失禁、尿多
- B、排尿困难、尿滴沥
- C、尿痛、尿急
- D、夜尿增多、尿频
- E、尿频、尿急、尿痛

【答案】： E

32、对清除肠内毒物有积极意义的洗胃时限是 0

- A、食物中毒 3 小时内
- B、食物中毒 4 小时内
- C、食物中毒 6 小时内
- D、食物中毒 8 小时内
- E、食物中毒 10 小时内

【答案】： C

33、患者，男性，23 岁，踝关节扭伤 6 小时，局部肿胀、疼痛明显，需进行冷敷，其目的是()

- A、促进末梢循环
- B、促进炎症的消散
- C、促进炎症的局限
- D、减轻局部出血、疼痛
- E、使血管扩张，减轻深部组织充血

【答案】： D

34、休克代偿期血压的变化)

- A、收缩压下降，脉压正常
- B、血压无变化
- C、收缩压正常，脉压小
- D、收缩压正常，脉压大

E、收缩压升高，脉压大

【答案】： C

35、应该首先急救的损伤是 0

- A、包膜下脾破裂
- B、开放性气胸
- C、脑震荡
- D、下肢开放性骨折
- E、单根双处肋骨骨折

【答案】： B

36、胸膜腔穿刺抽出不凝血常因为 0

- A、肋骨骨折
- B、张力性气胸
- C、心脏损伤
- D、开放性气胸
- E、血胸

【答案】： E

37、如果一次注入洗胃液过多会引起 0

- A、胃内压升高引起反射性心跳加快
- B、胃内压降低引起反射性心跳廉停
- G、胃内压升高毒物吸收增加
- D、胃内压降低毒物吸收增加

【答案】： C

38、在对未建立高级气道的心跳呼吸骤停患者进行 CR 时，应进行 0 次人工通气。

- A 、 1
- B 、 2
- C 、 3
- D、 4
- E 、 5

【答案】： B

39、药品冰箱温度应维持在什么范围?0

A、2-6℃

B

- 、 2-8℃
- C 、 3-8℃
- D、 4-6℃

【答案】： B

40、胸部多根多处肋骨骨折的治疗要点 0

- A、保持呼吸道通畅
- B、鼓励患者咳嗽排痰
- C、卧床休息
- D、给精神安慰
- E、制止胸壁的浮动，纠正呼吸障碍预防外伤性湿肺发生

【答案】： E

41、气管插管留置的时间一般最多为 ()h

- A、 48
- B、 12
- C、 72
- D、 24

【答案】： C

42、左侧心力衰竭患者的脉象改变 0

- A、奇脉
- B、洪脉
- C、交替脉
- D、水冲脉
- E、细脉

【答案】： C

43、以下均属于致命性心律失常，除外的是 0

- A、心室扑动
- B、室性心动过速
- C、

心室颤动

D、心房颤动

E、心室率小于 45 次/分的心动过缓

【答案】： D

44、在灾难现场通常以黑颜色醒目的卡片或胶带表示患者的分类是 0

A、死亡

B、重伤

C、危重伤

D、中重伤

E、致命伤

【答案】： E

45、风湿性心瓣膜病最易累及的是 0

A、二尖瓣

B、主动脉瓣

C、三尖瓣

D、二尖瓣+三尖瓣

E、主动脉+肺动脉瓣

【答案】： A

46、口对口人工呼吸的吹气量应达到()

A、2400mL 以上

B、500mL

C、1/3 肺活量

D、达到病人肺部

E、使病人胸廓抬起

【答案】： E

47、患者男性，自感心慌、头晕。查体；心率 84 次\分，脉搏 52 次\分，心律不规则，

心率快慢不一，心音强弱不等，该患者可能出现了 0

A、二联律

B、 三联律

C

- 、脉搏短绌
- D、 心动过缓
- E、脉搏异常

【答案】： C

48、为了准确测量患者的血压，应尽量做到四定，即 0

- A、定时间、定部位、定体位、定血压计
- B、定时间、定部位、定血压计、定人员
- C、定时间、定部位、定体位、定记录格式
- D、定时间、定体位、定部位、定听诊器
- E、定时间、定体位、定部位、定袖带

【答案】： A

49、诊断心跳骤停的简捷依据是 0

- A、血压测不到
- B、神志突然消失
- C、呼吸突然停止
- D、大动脉搏动消失

【答案】： D

50、救治中毒的原则错误的是 0

- A、促速毒物的排泄
- B、尽早使用特效解毒剂
- C、立即终止机体与毒物的接触
- D、毒物不明确的先诊断再抢救

【答案】： D

51、严重创伤性休克后，首先应预防的是 0

- A、感染
- B、输血并发症
- C、急性心力衰竭
- D、肠麻痹

E、急性呼吸窘迫综合征

【答案】： A

52、有关骨折急救处理，下列哪项错误)

- A、 首先应止血及包扎伤口
- B、无夹板时，可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架
- C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定
- D、脊椎骨折患者不可采取手法复位
- E、搬动脊椎骨折患者时，应采取一人抱肩， 一人抬腿的方法

【答案】： E

53、患者家属王某，女性，26岁。在得知丈夫因病情危重，抢救成功的可能性不大

时，非常忧郁，伤心哭泣。护士在安慰她时，以下做法中不恰当的是 0

- A、当她表示想独自一人安静一会时，为她提供一个适当的环境
- B、坐在她身边，轻轻递给她纸巾
- C、阻止她哭泣，告诉她要坚强
- D、在她停止哭泣时，鼓励她说出悲伤的原因
- E、轻轻握住她的手，默默陪伴她

【答案】： C

54、有机磷农药中毒最早出现的临床表现是 0

- A、平滑肌痉挛和腺体分泌增加
- B、全身肌肉发生强直性痉挛
- C、头痛、头晕、乏力
- D、共济失调
- E、谵妄、意识障碍

【答案】： A

55、患者，女性，35岁。因头部外伤报诊为”脑挫裂伤”急诊入院。接诊时发现，

患者神志不清，口鼻腔出血且分泌物多，口唇发绀，呼吸困难。该患者目前最确切的首要护理诊断是 0

- A、有窒息的危险
- B、气体交换受损
- C、有受伤的危险
- D、有感染的危险
- E、有脑疝的危险

【答案】： A

56、随时有猝死危险的心律失常是 0

- A、阵发性室性心动过速
- B、阵发性室上性心动过速
- C、二度房室传导阻滞
- D、一度房室传导阻滞
- E、室性期前收缩呈二联律

【答案】： A

57、一工厂突发火灾，数十伤员转运到急诊科，此时分诊护士的首要任务是 0

- A、迅速检伤，按照病情危重程度分类
- B、做好常规来诊患者的解释工作
- C、发现危重患者立即投入抢救中
- D、配合治疗区护士共同参与抢救
- E、准备与来诊家属沟通

【答案】： A

58、成人心肺复苏时胸外按压的深度为 0

- A、至少胸廓前后径的一半
- B、至少 3cm
- C、至少 5cm
- D、至少 6cm

E、45cm

【答案】： C

59、患者患有心脏病但活动量不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸

困难或心绞痛。其心功能分级应为 0

- A、心功 1 能级
- B、心功能 2 级
- C、心功能 3 级
- D、心功能 4 级
- E、以上都不是

【答案】： A

60、患者，男性，50 岁。因车祸致胸腹部剧痛 2 小时入院，查体：

BP80/48mmHg P120 次/分，脉搏细速， R30 次/分，氧饱和度 78%。神志清，左侧呼吸音消失。全腹肌紧张，压痛、反跳痛明显，移动性浊音(+)，骨盆分离征(+)。拟为“多发伤 1 多发肋骨骨折，左侧血气胸；2 腹部闭合伤，肝破裂；3 骨盆骨折，后腹膜血肿”入院。患者突然发生意识丧失，心率 150 次/分，血压 66/45mmHg，应立即 0

- A、加快输液
- B、留置深静脉，输血，准备手术
- C、立即转送急诊监护室
- D、床边手术
- E、留置尿管，记录进出量

【答案】： B

61、常用的晶体溶液，不包括下列哪项 0

- A、0.9%NaCl
- B、50%葡萄糖溶液
- C、4%NaHCO₃
- D、林格氏液

【答案】： B

62、急性颅内压增高病人典型的生命体征表现是 0

- A、脉快，呼吸急促
- B、脉快，血压降低
- C、脉快，血压高
- D、脉慢，呼吸慢
- E、脉慢，血压低

【答案】： D

63、慢性特发性血小板减少性紫素最常见于 0

- A、婴幼儿
- B、青少年
- C、青年女性
- D、青年男性
- E、中年人

【答案】： C

64、在使用球囊-面罩通气时，可尽量减少空气进入患者胃内的做法是 0

- A、增加通气频率，减少通气量
- B、减少每分钟通气次数
- C、尽可能延长每次通气时间
- D、用尽全力给予最大量的通气
- E、通气量能使患者胸廓明显隆起即可

【答案】： E

65、严重低钾血症患者主要死于 0

- A、心肌收缩性降低
- B、心肌传导降低
- C、心肌自律降低
- D、肾功能严重障碍
- E、呼吸衰竭

【答案】： A

66、下面禁止转运的指征不正确的是)

- A、心跳、呼吸停止;
- B、有气管插管指征,但未插管的;
- C、血流动力学不稳定;
- D、血压偏高

【答案】: D

67、危重症患者家属最主要的心理需求为 0

- A、病情保障与获取信息
- B、照顾患者
- C、接近息者
- D、获得支持
- E、自身舒适

【答案】: A

68、下列哪一项是多发伤的临床特点)

- A、创伤后全身反应较轻,死亡率不高
- B、较少发生休克
- C、低氧血症发生率高
- D、多发伤等同于多处伤
- E、不易发生漏诊和误诊

【答案】: C

69、呼吸性酸中毒应先处理的问题是 0

- A、控制感染
- B、促进咳痰
- C、单纯高浓度吸氧
- D、给予碱性液体
- E、解除呼吸道梗阻,改善换气

【答案】: E

70、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

- A、仰头举颏法
- B、双手推举下颌法
- C、托颊法
- D、环状软骨压迫法
- E、托颈法

【答案】： A

71、男性，30 岁。车祸伤现场发现左股部伤口有大量鲜血涌出，此时最先应检查的是 0

- A、触诊足背和胫后动脉
- B、检查肢体感觉
- C、检查膝腱或跟腱反射
- D、足部主动活动有无缺失
- E、左下肢主动活动有无缺失

【答案】： A

72、患者，男性，30 岁。 一小时前 5 米高处坠落，由同事送至医院，根据创伤机制能量来源分类，海创伤能量成分为 0

- A、热力学能量
- B、 电力学能量
- C、机械能量(√)
- D、化学能量
- E、放射学能量

【答案】： C

73、心脏骤停首选的治疗措施是 0

- A、 心肺复苏
- B、安置起搏器
- C、开通静脉输液

D、通畅呼吸道

E、高浓度吸氧

【答案】： A

74、关于损伤的现场急救，下列描述正确的是 0

- A、对休克患者首要措施是立即送医院抢救
- B、对于发现有心排骤停的伤员应首先将其移出现场，然后进行 COR
- C、作详细的全身检查
- D、尽快解决各种呼吸道阻塞，维持呼吸道通畅
- E、发现有活动性出血的伤口应现场进行清创术

【答案】： D

75、一次性出血量超过()时可引起全身症状。()

- A、250ml
- B、800ml
- C、400-500ml
- D、600ml
- E、1000ml

【答案】： C

76、进行 CPR 的前提条件是 0

- A、无反应、无呼吸
- B、无反应、有呼吸
- C、无意识
- D、无反应

【答案】： A

77、纠正呼吸性酸中毒，最主要的措施是 0

- A、输碱性溶液
- B、纠正电解质紊乱
- C、改善通气
- D、使用脱水剂
- E、以上都不是

【答案】： C

78、休克早期微循环灌流的特点是 0

- A、少灌少流

B 、多灌少流

C、

不灌不流

D、少灌多流

E、多灌多流

【答案】： A

79、初期复苏所讲 ABC 中，通常 A 是指 0

A、开放气道

B、口对口(鼻)人工呼吸

C、胸外心脏按压

D、药物治疗

E、病情观察

【答案】： A

80、关于急性应激障碍的陈述，正确的是 0

A、一般在刺激后 1 天内发病

B、以急剧、严重的精神打击为直接原因

C、表现平静

D、应激消除者症状历时 20 天左右

E、通常 6 个月内症状缓解

【答案】： B

81、患者，男，70 岁。胸痛心悸伴晕厥 1 次。体检示： BP140/80mmHg
HR72 次/分，

早搏 2—3 次/分。收入 ICU 后，心电监护见室颤。拟使用电除颤，下
列那一项是首

次双向波除颤最常用的能量 0

A、100J

B、200J

C、300J

D、150J

E、360J

【答案】： B

82、高渗昏迷患者输液 4h 应输入总量的()

A 、 1/3

B、 1/2

C 、 2/3

D、 1/4

E、 3/4

【答案】： A

83、用于动脉出血的止血方法为 0

A、加加压包扎止血法

B、指压止血法

C、屈肢加垫止血法

D、填塞止血法

【答案】： B

84、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

A、仰头举颊法

B、双手推举下颌法

C、托颊法

D、环状软骨压迫法

E、托颈法

【答案】： A

85、患者，女性，40 岁，车祸时头部受伤，出现头痛、呕吐而急诊入院。为预防脑水

肿，降低颅内压，应采取的体位是 0

A、端坐卧位

B、头高足低位

C、半坐卧位

D、头低足高位

E、中凹卧位

【答案】： B

86、气管插管的适应症为 0

- A、颈椎骨折脱位
- B、主动脉瘤压迫气管
- C、喉头水肿
- D、呼吸道分泌物过多

【答案】： D

87、休克时正确的补液原则是 0

- A、补液“宁多勿少”
- B、需多少补多少
- C、补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
- D、失多少补多少
- E、如血压正常不必补液

【答案】： B

88、门脉高压症中最常见的原因(为)

- A、胃溃疡
- B、肝硬化
- C、肠梗阻
- D、胆道出血
- E、黄疸

【答案】： B

89、见尿补钾要求成人每小时尿量不少于()

- A、10ml
- B、30ml
- C、50ml
- D、70ml
- E、90ml

【答案】： B

90、患者，男性，70岁，突发急性广泛心肌梗死，经治疗疼痛有所好转，继而出现呼吸困难、咳嗽、发绀、咳大量粉红色泡沫痰，其咳嗽病因是 0

- A、急性肺淤血
- B、急性肺不张
- C、急性肺水肿
- D、急性肺炎
- E、急性胸膜炎

【答案】： C

91、危重症患者家属病情保障方面的需求，家属最关心的是 0

- A、患者安全
- B、患者饮食
- C、患者舒适
- D、患者心理
- E、患者支持

【答案】： A

92、患者，男性，52岁。因车祸致胸腹联合伤，左侧多发性肋骨骨折(连枷)伴大量血气胸；脾破裂伴腹腔内出血。神志清，BP75/46mmHg，R38次/分，心率126次/分，律齐，医护人员到达现场后首先要对患者进行哪一项伤情评估 0

- A、意识状态
- B、气道和呼吸情况
- C、进行化验检查
- D、循环情况
- E、仔细的胸部检查

【答案】： B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/096125142221010143>