

2024 贵州省余庆县《执业药师之西药学专业二》考试通关秘籍题库及答案（夺冠系列）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及记忆障碍药是

- A: 胞磷胆碱
- B: 利斯的明
- C: 多奈哌齐
- D: 吡拉西坦

答案：D

2. （2020 年真题）可用于预防 HIV（人免疫缺陷病毒）感染者巨细胞病毒视网膜炎的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 恩替卡韦
- C: 金刚烷胺
- D: 更昔洛韦

答案：D

3. 可以引起低钾血症和低镁血症，增加洋地黄中毒危险的是

- A: 呋塞米
- B: 胺碘酮
- C: 硫酸镁
- D: 克拉霉素

答案：A

4. 治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物是

- A: 氯霉素
- B: 红霉素
- C: 青霉素
- D: 磺胺嘧啶

答案：D

5. 雄激素可降低的体内物质是

- A: 高密度脂蛋白（HDL）
- B: 低密度脂蛋白（LDL）
- C: 乳酸脱氢酶（LDH）
- D: 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）

答案：A

6. 对于万古霉素，描述错误的是

- A: 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染
- B: 快速静滴会出现红人综合征
- C: 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用
- D: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

答案：C

7. 阻断 H₂ 受体的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 哌仑西平
- C: 氢氧化铝
- D: 雷尼替丁

答案：D

8. 治疗可能引起结晶尿的药物是()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 呋喃妥因
- C: 左氧氟沙星
- D: 氯霉素

答案: A

9. 属于 CYP3A4 底物 / 抑制剂，可能会增加他汀类药物肌肉不良反应危险性的是

- A: 利福平
- B: 地高辛
- C: 红霉素
- D: 烟酸

答案: C

10. 法莫替丁可用于治疗

- A: 心肌梗死
- B: 急慢性胃炎
- C: 十二指肠穿孔
- D: 十二指肠溃疡

答案: D

11. 使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

- A: 氯化钾
- B: 氯化钙
- C: 硫酸镁
- D: 果糖

答案: A

12. 氟西汀的作用机制是

- A: 抑制 5-HT 及去甲肾上腺素的再摄取
- B: 抑制突触前膜对去甲肾上腺素的再摄取
- C: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解
- D: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度

答案：D

13. 不易透过血-脑屏障，药理作用单一，主要用于治疗膀胱过度活动症的非选择性 M 受体阻断药是

- A: 黄酮哌酯
- B: 索利那新
- C: 奥昔布宁
- D: 托特罗定

答案：D

14. 应用最广泛的口服抗凝血药是

- A: 肝素
- B: 维生素 K
- C: 达比加群酯
- D: 华法林

答案：D

15. 与其他 NSAID 合用时疗效并不增强，但可增加其他部位出血风险的是

- A: 塞来昔布
- B: 阿司匹林
- C: 吲哚美辛

D: 对乙酰氨基酚

答案: B

16. (2017 年真题) 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法, 错误的是 ()

A: 为控制的细菌或真菌感染不宜使用

B: 可用于过敏性皮炎的治疗

C: 若继发细菌或真菌感染, 可与抗菌药或抗真菌药联合使用

D: 面部、阴部和皱褶部位的湿疹, 需长期使用强效制剂

答案: D

17. 华法林起效缓慢, 深静脉栓塞治疗的初期, 需同时联合使用的是 ()

A: 维生素 B

B: 维生素 B

C: 依诺肝素

D: 维生素 B

答案: C

18. 嵌入 DNA 干扰转录 RNA 的抗恶性肿瘤药是

A: 环磷酰胺

B: 吉非替尼

C: 5-氟尿嘧啶

D: 多柔比星

答案: D

19. 低分子量肝素发挥抗凝作用主要抑制的凝血因子是

A: 因子 IXa

B: 因子 Xa

C: 因子 IIa

D: 凝血酶III (AT—III)

答案: B

20. 使用呋塞米时，较少发生耳毒性的情况是

A: 口服方式给药

B: 同时使用氨基糖苷类药物

C: 频繁静脉输注给药

D: 快速静脉输注给药

答案: A

21. 下述不属于胃黏膜保护剂的是

A: 前列腺素

B: 枸橼酸铋钾

C: 硫糖铝

D: 谷氨酰胺

答案: D

22. (2017 年真题) 眼底散瞳检查宜选用 ()

A: 拉坦前列素滴眼剂

B: 氯霉素滴眼剂

C: 托吡卡胺滴眼剂

D: 碘苷滴眼剂

答案: C

23. 偏头痛，三叉神经痛选用

A: 多奈哌齐

- B: 布桂嗪
- C: 丙戊酸钠
- D: 佐匹克隆

答案：B

24. 下述种类的利尿药中，利尿作用最强的是

- A: 噻嗪类利尿剂
- B: 袂利尿剂
- C: 留钾利尿剂
- D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：B

25. 属于长效 B₂ 受体激动剂的平喘

- A: 多索茶碱
- B: 布地奈德
- C: 沙丁胺醇
- D: 沙美特罗

答案：D

26. 主要用于房颤与心房扑动(房扑)的复律、复律后窦性节律的维持和危及生命的室性心律失常的是()

- A: 维拉帕米
- B: 奎尼丁
- C: 利卡多因
- D: 普萘洛尔

答案：B

27. 以下药物治疗高血压时，给药次数为一日 2 次给药的是

- A: 硝苯地平缓释片
- B: 硝苯地平控释片
- C: 非洛地平缓释片
- D: 氨氯地平片

答案：A

28. 急性心肌梗死引起的急性室性心动过速可选用

- A: 硝苯地平
- B: 利多卡因
- C: 美西律
- D: 阿托品

答案：B

29. 静脉注射可以治疗单纯疱疹病毒脑炎，局部可以用于疱疹病毒性角膜炎的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 阿糖腺苷
- C: 干扰素
- D: 奥司他韦

答案：B

30. 可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，适用于各种原因引起的刺激性干咳的药物是

- A: 福尔可定
- B: 苯丙哌林
- C: 喷托维林
- D: 右美沙芬

答案：B

31. 关于氨基糖苷类药物作用特点的说法,错误的是()

- A: 氨基糖苷类药物主要扣制细菌蛋白质合成,影响细菌细胞壁黏肽的合成
- B: 氨基糖苷类药物对多数需氧的革兰阴性杆菌具有很强的杀菌作用
- C: 氨基糖苷类药物常见的不良反应为耳毒性和肾毒性
- D: 氨基糖苷类药物是浓度依赖型速效杀菌剂

答案: A

32. 无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性,可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

- A: 环丙孕酮
- B: 屈螺酮
- C: 地屈孕酮
- D: 甲羟孕酮

答案: C

33. 静脉滴注给药用于真菌性肺炎的药物是

- A: 特比萘芬
- B: 灰黄霉素
- C: 两性霉素 B
- D: 酮康唑

答案: C

34. (2019 年真题) 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料, 紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是 ()

- A: 聚氯乙稀
- B: 乙醇

C: 聚乙烯醇蓖麻油

D: 邻苯二甲酸二辛酯

答案: C

35. 长春碱可用于治疗()。

A: 急性淋巴细胞白血病

B: 绒毛膜上皮癌

C: 晚期前列腺癌

D: 晚期睾丸肿瘤

答案: D

36. 一般剂量长期疗法

A: 湿疹

B: 变态反应性疾病

C: 中毒性感染和休克

D: 顽固性支气管哮喘

答案: D

37. (2016 年真题) 可抑制细菌 β -内酰胺酶的是

A: 替考拉宁

B: 磷霉素

C: 舒巴坦

D: 利福平

答案: C

38. 患者女,58 岁血糖升高 10 年,口服二甲双胍治疗:高血压病史 5 年未规律治疗近期查体:血压 158/95mmHg 尿常规示蛋白尿(++) 适宜该患者使用的降压药物是()

- A: 依那普利
- B: 甲基多巴
- C: 硝苯地平
- D: 普萘洛尔

答案：A

39. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是

- A: 巯嘌呤
- B: 长春瑞滨
- C: 吉西他滨
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

40. 患者，女性，57 岁。高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 维拉帕米
- C: 普萘洛尔
- D: 阿托品

答案：D

41. 大剂量应用甲氨蝶呤后，可用()进行解救

- A: 亚叶酸钙
- B: 苯溴马隆
- C: 丙磺舒
- D: 别嘌醇

答案：A

42. 与顺铂联合应用可致严重肾毒性的药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 氟尿嘧啶
- C: 利妥昔单抗
- D: 阿糖胞苷

答案：C

43. 降压不引起重要器官血流量减少，不影响脂和糖代谢的药物是

- A: 拉贝洛尔
- B: 普萘洛尔
- C: 依那普利
- D: 可乐定

答案：C

44. 焦虑型、夜间醒来次数较多者

- A: 谷维素
- B: 氯美扎酮
- C: 夸西泮
- D: 氟西泮

答案：D

45. 属于III类抗心律失常药的是

- A: 胺碘酮
- B: 普罗帕酮
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：A

46. 因抑制 P-糖蛋白使地高辛浓度增加 70%~100%的是

- A: 硫酸镁
- B: 克拉霉素
- C: 呋塞米
- D: 胺碘酮

答案：D

47. 导致胃肠道溃疡及出血风险较其他传统非甾体抗炎药低的是

- A: 吲哚美辛
- B: 塞来昔布
- C: 布洛芬
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

48. 通过产生一氧化氮(NO)松弛血管平滑肌，以扩张静脉为主的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝酸甘油
- C: 双嘧达莫
- D: 硝苯地平

答案：B

49. 首选用于伤寒、副伤寒的是()

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 两性霉素 B
- D: 克林霉素

答案：A

50. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。若患者不能耐受万古霉素时，可选择替代的药物是（）

- A: 替考拉宁
- B: 头孢曲松
- C: 阿米卡星
- D: 头孢哌酮

答案：A

51. 利福平抗结核杆菌的作用原理是

- A: 与锌离子络合、影响戊糖代谢
- B: 抑制蛋白质合成
- C: 抑制分枝菌酸合成
- D: 抑制 RNA 多聚酶

答案：D

52. 患者，女，十二指肠溃疡，幽门螺杆菌(+)，可选用

- A: 苄星青霉素
- B: 万古霉素
- C: 阿莫西林
- D: 双氯西林

答案：C

53. 治疗重型幼年型糖尿病的是

- A: 二甲双胍
- B: 胰岛素

C: A 和 B 均无效

D: 磺酰脲类

答案: B

54. 易发生持续干咳不良反应的药品是

A: 福辛普利

B: 硝苯地平

C: 硝酸甘油

D: 氢氯噻嗪

答案: A

55. 属于第四代头孢菌素的药物的是()。

A: 头孢拉定

B: 头孢吡肟

C: 头孢氨苄

D: 头孢哌酮

答案: B

56. 沙丁胺醇用于预防治疗时，宜选用

A: 雾化吸入溶液

B: 干粉吸入方法

C: 口服制剂

D: 气雾剂

答案: C

57. 下列药物中，与蛋白同化激素无相互作用的是

A: 华法林

B: 环孢素

C: 青霉素

D: 他克莫司

答案: C

58. 西米替丁的作用原理是

A: 阻断 β 受体

B: 阻断 β 受体

C: 阻断 H1 受体

D: 阻断 H2 受体

答案: D

59. (2018 年真题) 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是 ()

A: 双氯芬酸

B: 塞来昔布

C: 阿司匹林

D: 对乙酰氨基酚

答案: C

60. (2020 年真题) 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

A: 预防过敏反应

B: 预防出血过多

C: 预防癌症复发

D: 预防粒细胞缺乏

答案: D

61. 氨甲环酸的作用机制是()

- A: 刺激血小板生成
- B: 激活凝血因子
- C: 促使毛细血管收缩
- D: 对抗纤维蛋白溶解

答案：D

62. 选择性抑制延髓咳嗽中枢，并具有微弱的阿托品样作用，适用于各种原因引起的无痰干咳的药物是

- A: 喷托维林
- B: 福尔可定
- C: 右美沙芬
- D: 苯丙哌林

答案：A

63. 对偶发性失眠者可选择()。

- A: 唑吡坦
- B: 氟西泮
- C: 夸西泮
- D: 艾司唑仑

答案：A

64. 典型不良反应除消化道反应，还有耳毒性和肾毒性的药物是

- A: 长春碱类
- B: 多柔比星
- C: 环磷酰胺
- D: 顺铂

答案：D

65. 甲氧苄啶联用利福平使

- A: 半衰期缩短
- B: 白细胞减少风险增加
- C: 肾毒性增加
- D: 抗凝作用增强

答案：A

66. (2021 年真题) 属于乙酰胆碱酯酶抑制剂，用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物 ()

- A: 多奈哌齐
- B: 吡拉西坦
- C: 尼莫地平
- D: 依达拉奉

答案：A

67. 有关阿莫西林特点的说法正确的是 ()

- A: 口服吸收差，生物利用度小
- B: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效
- C: 耐酸、耐酶
- D: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

答案：B

68. 关于胺碘酮描述，正确的是

- A: 特异性针对房颤有效
- B: 只对室性心动过速有效
- C: 只对室上性心动过速有效
- D: 对室上性和室性心动过速都有效

答案：D

69. 肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

- A: 可待因
- B: 布桂嗪
- C: 哌替啶
- D: 阿司匹林

答案：C

70. 喹诺酮类药物作用机制

- A: 抑制细菌糖代谢
- B: 干扰细菌核酸代谢
- C: 抑制细菌细胞壁合成
- D: 抑制细菌蛋白质合成

答案：B

71. 长期大量应用可致视神经炎、视力下降、视野缩小，出现盲点的是

- A: 异烟肼
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 乙胺丁醇

答案：D

72. 维生素 A 缺乏时可引起

- A: 脚气病
- B: 角膜软化
- C: 坏血病
- D: 成人佝偻病

答案：B

73. 秋水仙碱的注意事项错误的是

- A: 不可用于长期痛风的预防
- B: 肾功能下降时可造成蓄积
- C: 可致可逆性维生素 B
- D: 尽量避免静脉注射和长期口服给药

答案: C

74. 主要治疗双相情感障碍躁狂发作，宜选用的药物是

- A: 利培酮
- B: 阿立哌唑
- C: 碳酸锂
- D: 氯氮平

答案: A

75. (2016 年真题) 耐甲氧西林金黄色葡萄菌感染宜首选的抗菌药物是

- A: 罗红霉素
- B: 头孢他啶
- C: 头孢曲松
- D: 利奈唑胺

答案: D

76. 与柔红霉素合用，可能增加心脏毒性的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 肝素
- C: 放线菌素
- D: 氧烯洛尔

答案: D

77. 缺铁性贫血患者通常口服铁剂治疗，如有条件进行铁蛋白测定，停药应在血清铁蛋白上升到

A: $20\sim 30\mu\text{g/L}$

B: $10\sim 15\mu\text{g/L}$

C: $3\sim 5\mu\text{g/L}$

D: $30\sim 50\mu\text{g/L}$

答案：D

78. 可引起脊髓水平镇痛、镇静和轻度呼吸抑制的受体是

A: $\mu 1$ 受体

B: K 受体

C: $\mu 2$ 受体

D: δ 受体

答案：B

79. 米诺环素属于

A: β -内酰胺类

B: 氨基糖苷类

C: 酰胺醇类

D: 四环素类

答案：D

80. 关于氢氧化镁的叙述正确的是

A: 口服易吸收

B: 不影响排便

C: 中和胃酸作用强而迅速

D: 对溃疡面有保护作用

答案：C

81. 肾上腺糖皮质激素类药物的共同药理作用不包括

- A: 抗休克
- B: 免疫抑制
- C: 抗炎
- D: 抗病毒

答案：D

82. 广谱肠道驱虫药，用于治疗钩虫（尤其是美洲钩虫）、蛔虫感染的药物是

- A: 甲硝唑
- B: 三苯双脒
- C: 吡喹酮
- D: 乙胺嘧啶

答案：B

83. 克拉霉素与阿呋唑嗪合用，阿呋唑嗪的血药浓度水平显著升高，这是因为克拉霉素抑制

- A: p-糖蛋白
- B: 血浆蛋白
- C: CYP3A4
- D: UGT287

答案：C

84. 不可用于降低眼压的药物是

- A: 毛果芸香碱滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂

C: 卡替洛尔滴眼剂

D: 利福平滴眼剂

答案: D

85. 坦洛新与华法林合用，华法林游离药物浓度增加，这是因为二者竞争

A: UGT287

B: p 一糖蛋白

C: CYP3A4

D: 血浆蛋白

答案: D

86. 入睡困难患者首选哪种催眠药物

A: 劳拉西泮

B: 氯硝西泮

C: 谷维素

D: 艾司唑仑

答案: D

87. 下列药物中不用于抗心律失常的是

A: 单硝酸异山梨酯

B: 美西律

C: 胺碘酮

D: 比索洛尔

答案: A

88. 可与阿司匹林发生相互作用的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 呋塞米

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/097040025046010024>