

2020年上海市《妇产科护理学》测试卷

考试须知：

- 1、考试时间：180 分钟。
- 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
- 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的地方填写您的答案。
- 4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。
- 5、答案与解析在最后。

姓名：_____

考号：_____

得分	评卷人

一、A1(共 30 题)

1. 妊娠合并糖尿病有确诊意义的是()。
 - A. 妊娠期有“三多”症状,且本次妊娠伴有巨大儿,尿糖阳性
 - B. 有糖尿病家庭史特别是不明原因的死胎、死产、巨大儿分娩史
 - C. 空腹血糖 $\geq 5.8\text{mmol/L}$
 - D. 服50g糖1小时抽静脉血测血糖值 $\geq 7.8\text{mmol/L}$
 - E. 口服糖耐量试验结果有两项超过正常值
2. 负压吸引术最大的并发症是()。
 - A. 误吸
 - B. 感染
 - C. 漏吸
 - D. 组织残留
 - E. 子宫穿孔
3. 关于III度胎盘早剥说法错误的是()。

- A. 临床表现为恶心、呕吐、出冷汗
 - B. 胎位扪不清, 胎心听不清
 - C. 多见于重度子痫前期孕妇
 - D. 会突然发生的持续性腹痛
 - E. 阴道流血量与贫血程度成正比
4. 对前庭大腺炎患者正确的护理措施是()。
- A. 急性期卧床休息
 - B. 外阴冲洗每日1次
 - C. 伤口愈合后1:800呋喃西林溶液坐浴每日2次
 - D. 外阴擦洗每日1次
 - E. 切开引流处每2天换药1次
5. 原发性痛经的临床特点不包括()。
- A. 多在月经初潮6个月内发病
 - B. 月经第1天疼痛最剧烈
 - C. 常见于青少年期
 - D. 妇科检查无异常发现
 - E. 下腹疼痛是主要症状
6. 剖宫产手术后3周, 突然阴道大量出血, 最可能的是()。
- A. 凝血机制障碍
 - B. 胎盘附着部位, 子宫内膜修复不良
 - C. 子宫复旧不良
 - D. 胎盘残留
 - E. 子宫切口感染、出血
7. 关于刚分娩的成熟新生儿1分钟的心率和呼吸数, 下列属于正常值的是()。
- A. 心率160次, 呼吸数50~80次

- B. 心率140次,呼吸数50-80次
 - C. 心率120次,呼吸数40~60次
 - D. 心率120次,呼吸数50~80次
 - E. 心率110次,呼吸数60~80次
8. 关于妊娠期间治疗淋病,下列说法正确的是()。
- A. 多合并支原体感染应给予抗支原体药物
 - B. 用药必须足量、及时
 - D. 临床症状消失为治愈
 - E. 青霉素过敏可选用喹诺酮类药物
9. 自然分娩,产后2小时观察内容不包括()。
- A. 乳汁分泌情况
 - B. 血压及脉搏
 - C. 子宫收缩情况
 - D. 膀胱充盈情况
 - E. 阴道流血量
10. 关于梅毒的实验室诊断,下列说法正确的是()。
- A. 血清液实验在感染后出现阳性,到二期时为阴性
 - B. 血清学试验敏感性高,在感染后即为阳性
 - C. 性病研究室试验(VDRL)可做定量、定性实验,易于操作,敏感性高,结果快,目前应用最广泛
 - D. 暗视野显微镜检查找螺旋体已废用期梅毒时硬下疳表面的渗出物中含大量梅毒螺旋体,但到二期梅毒时肿大的淋巴结抽出液中已找不到螺旋体
11. 孕妇由于妊高征应用硫酸镁治疗,在治疗过程中出现膝反射消失,呼吸浅而慢,每分钟10次。此患者除立即停药外应给下述哪种药()。
- A. 静注低分子右旋糖酐
 - B. 肌注山莨菪碱

- C. 静注10%葡萄糖酸钙
 - D. 静注50%葡萄糖
 - E. 5%葡萄糖静脉滴注
12. 脐带中的静脉数是()。
- A. 1条
 - B. 2条
 - C. 3条
 - D. 4条
 - E. 5条
13. 过期妊娠指妊娠达到或超过()。
- A. 44周末
 - B. 40周末
 - C. 43周末
 - D. 41周末
 - E. 42周末
14. 不孕伴有痛经的妇女常发生()
- A. 子宫内膜结核
 - B. 卵巢肿瘤
 - C. 多囊卵巢综合征
 - D. 子宫肌瘤
 - E. 子宫内膜异位症
15. 葡萄胎患者术后避孕首选()。
- A. 口服避孕药
 - B. 皮下埋置
 - C. 宫内节育器

- D. 针剂避孕药
- E. 阴茎套
16. 最可能出现的胎儿异常为()。
- A. 无脑儿
- B. 脊柱裂
- C. 先天愚型
- D. 消化道闭锁
- E. 脑积水
17. 无损伤、简便、经济的预测排卵的方法是()。
- A. 宫颈黏液评分
- B. 内分泌激素测定
- C. 超声检查
- D. 基础体温测定
- E. 腹腔镜检查
18. 关于宫内节育器放置术后的护理, 正确的是()。
- A. 腰酸腹胀一般不需处理
- B. 节育器脱落多发生于放置后3~6个月
- C. 节育器嵌顿确诊后应立即行门诊手术
- D. 发生感染者给予抗生素治疗并取出节育器
- E. 出血常发生于放置后3个月内
19. 子宫的功能不包括()。
- A. 产生女性激素
- B. 可孕育胎儿
- C. 形成月经
- D. 精子进入输卵管通道

- E. 将胎儿娩出
20. 确诊不明原因性不孕首先选用()。
- A. 腹腔镜子宫镜联合检查
 - B. 输卵管通气实验
 - C. B超检查
 - D. 输卵管通液试验
 - E. 子宫输卵管碘油造影
21. 关于雌激素的作用, 下列说法正确的是()。
- A. 对下丘脑和垂体仅产生负反馈作用
 - B. 使宫颈黏液分泌增多而稀薄
 - D. 促进水钠排泄
 - E. 使阴道上皮角化现象消失
22. 慢性宫颈炎与宫颈癌早期肉眼难以鉴别, 为确诊应考虑诊断方法是()。
- A. 宫颈及宫颈管活组织检查
 - B. 氮激光肿瘤固有荧光
 - C. 阴道镜检查
 - D. 宫颈刮片细胞学检查
 - E. 宫颈碘试验
23. 会阴切开缝合术的产妇, 术后宜采取的体位是()。
- A. 俯卧位
 - B. 侧卧位
 - C. 伤口侧卧位
 - D. 平卧位
 - E. 半卧位
24. 了解胎儿宫内发育情况的人工监护方法为()。

- A. 测量子宫底高度
 - B. 超
 - B. 听诊胎心
 - D. 测量血压
 - E. 测量孕妇的骨盆各径线
25. 有关产褥期护理, 下述哪项不对()。
- A. 产后24小时鼓励产妇产下床活动
 - B. 饮食应富于营养
 - D. 测体温、脉搏、呼吸, 每日2次
 - E. 产后适宜多取蹲位
26. 目前最常用的推算预产期的依据是()。
- A. 胎儿大小和宫底高度
 - B. 初觉胎动时间
 - C. 早孕反应开始的时间
 - D. 末次月经开始之日
 - E. 末次月经干净之日
27. 行产钳术时未行适度的会阴切开可导致()。
- A. 会阴III度裂伤
 - B. 胎膜残留
 - C. 胎盘小叶缺损
 - D. 胎盘滞留
 - E. 宫颈裂伤
28. 通过外阴检查不能发现的疾病是()。
- A. 子宫脱垂
 - B. 前庭大腺囊肿

- C. 外阴溃疡
- D. 阴道炎
- E. 阴道前、后壁膨出

29. 妊娠合并心脏病孕妇,分娩时应做下列哪项措施()。

- A. 胎儿娩出后,腹部放置沙袋加压
- B. 宫口开全后,鼓励孕妇屏气用力,以尽快结束分娩
- C. 第二产程中应肌注吗啡
- D. 急性心力衰竭时应即刻剖宫产结束分娩
- E. 为预防分娩期心力衰竭,产前要达到洋地黄饱和量

30. 容易合并胎盘植入的是()。

- A. 羊水栓塞
- B. 前置胎盘
- C. 胎盘早剥
- D. 过期妊娠
- E. 重度子痫前期

二、A2(共 20 题)

31. 钱女士,初产妇,产后2周出现弛张热,下腹疼痛并且压痛明显,下肢肿胀疼痛,皮肤紧张发白。最可能的诊断是()。

- A. 急性盆腔结缔组织炎
- B. 急性盆腔腹膜炎
- C. 血栓性静脉炎
- D. 子宫肌炎
- E. 产后关节炎

32. 华女士,28岁,结婚2年未孕,月经正常,激素测定未见异常,输卵管通畅试验正常。日前首选哪项检查()。

- A. 腹腔镜检查

B. 子宫输卵管造影

C. 卵巢功能检查

D. 性交试验

E. 子宫输卵管造影

33. 钱女士, 28岁, 被诊断为前置胎盘患者。她在孕期腹部触诊、听诊可以见到的诊断是

A. 子宫持续性收缩、胎位不清、胎心消失

B. 阵发性子宫收缩、松弛不全、胎心音弱

E. 子宫强制性收缩、宫底升高、血压下降、胎心消失

34. 吕女士, 24岁, 孕37周来诊, 查血压89/59mmHg, 心率102次/分, 心脏听诊杂音粗糙, 口唇稍紫, 杵状指。建议患者()。

A. 此次终止妊娠, 半年后再次妊娠

B. 立即终止妊娠

C. 可继续妊娠

D. 继续妊娠, 分娩后建议做绝育手术

E. 出现心衰后方考虑终止妊娠

35. 董女士, 33岁, 经产妇, 第1胎曾分娩巨大儿, 后2年妊娠 I 次在23周时破膜不久流产。最可能造成此次流产的原因是()。

A. ABO血型不合

B. 子宫肌瘤

C. 卵巢黄体功能不足

D. 宫颈内口松弛

E. 染色体异常

36. 赵女士, 28岁, 产褥妇, 产后3日后开始发热、腹痛, 持续5日。体温39. 2℃, 血压90/60mmHg。急性痛苦面容, 下腹压痛。妇科检查: 子宫如妊娠4个月大, 触痛明显子宫左侧触及如手拳大、有压痛实性肿块。本例应诊断为()。

A. 急性盆腔腹膜炎

- B. 弥漫性腹膜炎
- C. 急性子宫肌炎
- D. 急性盆腔结缔组织炎
- E. 急性子宫内膜炎

37. 患者, 女性, 已婚, 停经52天, 阴道少许出血2天, 今日突发左下腹剧痛伴明显肛门坠胀感。体检示: 血压75/50mmHg, 脉率116次/分, 下腹部压痛、反跳痛明显, 移动性浊音(+); 妇科检查示: 宫颈举痛, 左侧附件有压痛。此时最恰当的紧急处理是

- A. 输注平衡液抗休克
- B. 中西医结合止血
- C. 边纠正休克边开腹手术
- D. 保胎治疗
- E. 立即开腹探查

38. 邓女士, 30岁, 已婚, 习惯性流产, 每次自然流产均发生于妊娠5~6个月, 最可能的原因是()。

- A. 子宫颈内口功能不全
- B. 黄体功能不全
- C. 合并内科疾患
- D. 受精卵发育异常
- E. 卵巢发育异常

39. 王女士, 27岁, 初产妇, 妊娠41周, 规律宫缩11小时。检查胎儿估计体重3000g, 枕左前位, 胎头高浮, 胎心率160次/分。骨盆不小, 宫口开大2cm。尿雌激素/肌酐比值为7。此种情况恰当的分娩方式是()。

- A. 静脉滴注缩宫素加速产程
- B. 等待宫口开全行胎头吸引术助娩
- C. 尽快行剖宫产术
- D. 等待宫口开全行产钳助娩
- E. 左侧卧位, 吸氧, 静注10%葡萄糖液

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/097054025026010003>