专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年福建省石狮市《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库大全（真题汇编）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.对于硼酸的描述，错误的是()

A：清洗外耳道，适量擦拭外耳道，一日3次

B：作为滴耳剂的常用规格是10ml：4g

C：用于急、慢性中耳炎

D：滴耳；成人一次1～2滴，一日3次

答案：B

2.对抗香豆素类过量引起出血可选用

A：垂体后叶素

B：鱼精蛋白

C：维生素K

D：维生素

答案：C

3.以下不属于呋塞米的不良反应的是

A：胃肠道反应

B：降低血糖

C：耳毒性

D：高尿酸血症

答案：B

4.（2016年真题）属于碳青霉烯类

A：头孢吡肟

B：氨曲南

C：头孢美唑

D：亚胺培南

答案：D

5.维A酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

A：一日一次，固定时间使用

B：一日二次，早、晚使用

C：一日一次，睡前使用

D：一日一次，晨起使用

答案：C

6.不属于糖皮质激素对代谢的影响的是

A：增强钙离子的吸收

B：增高肝糖原

C：升高血糖

D：提高蛋白质的分解代谢

答案：A

7.抑制磷酸二酯酶而加强心肌收缩力的药物是()

A：地高辛

B：毛花苷丙

C：米力农

D：螺内酯

答案：C

8.属于DNA多聚酶抑制剂的是

A：长春瑞滨

B：吉西他滨

C：甲氨蝶呤

D：巯嘌呤

答案：B

9.下述不属于胃黏膜保护剂的是

A：前列腺素

B：枸橼酸铋钾

C：谷氨酰胺

D：硫糖铝

答案：C

10.外源性及内源性凝血途径的交汇点是

A：凝血因子Xa

B：凝血因子ⅩⅠa

C：凝血因子Ⅱa

D：凝血因子ⅠXa

答案：A

11.布美他尼属于下列哪类利尿药

A：中效利尿药

B：保钾利尿药

C：碳酸酐酶抑制药

D：强效利尿药

答案：D

12.高血钾的肾损伤患者禁用下列哪种利尿药()

A：依他尼酸

B：螺内酯

C：山梨醇

D：呋塞米

答案：B

13.治疗慢性室性心律失常的药物是()

A：维拉帕米

B：奎尼丁

C：胺碘酮

D：美西律

答案：D

14.大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿液呈黄色

A：维生素B

B：维生素B

C：维生素B

D：维生素C

答案：C

15.替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

A：恶性淋巴瘤

B：慢性淋巴细胞白血病

C：脑瘤

D：纤维瘤

答案：C

16.伴有（）的患者在应用ACEI首剂治疗时可能出现严重低血压

A：蛋白尿

B：干咳

C：低钠血症

D：脑水肿

答案：C

17.与长春新碱合用可增强神经系统及血液系统毒性

A：异烟肼

B：替尼泊苷

C：非格司亭

D：铂类

答案：A

18.对焦虑型、夜间醒来次数较多或早醒者可选用的苯二氮?类镇静催眠药是

A：地西泮

B：非苯二氮?类药物

C：苯二氮?类药物

D：氟西泮

答案：D

19.下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

A：不良反应少，可用于治疗儿童的急、慢性腹泻

B：不被胃肠道吸收，不进入血液循环

C：属于抗动力药

D：具有吸附、收敛的作用

答案：C

20.属于嘧啶类的是

A：制霉菌素

B：特比萘芬

C：卡泊芬净

D：氟胞嘧啶

答案：D

21.长期大量服用维生素A会出现

A：严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

B：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

C：疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

D：视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

答案：C

22.掩盖低血糖反应的抗心律失常药是()

A：奎尼丁

B：胺碘酮

C：利多卡因

D：普萘洛尔

答案：D

23.属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的调节血脂药是()

A：辛伐他汀

B：依折麦布

C：非诺贝特

D：烟酸

答案：A

24.（2017年真题）影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是（）

A：乙胺嘧啶

B：奎宁

C：青蒿素

D：伯氨喹

答案：A

25.以下哪种心律失常禁用强心苷

A：心房扑动

B：室性心动过速

C：心房颤动

D：室上性心动过速

答案：B

26.下列哪种维生素可用于慢性铁中毒的治疗

A：维生素E

B：维生素C

C：维生素B1

D：维生素B2

答案：B

27.属于血小板糖蛋白GPⅡb/Ⅲa受体阻断剂的是

A：替格瑞洛

B：替罗非班

C：阿司匹林

D：双嘧达莫

答案：B

28.不可用于降低眼压的药物是

A：卡替洛尔滴眼剂

B：拉坦前列素滴眼剂

C：利福平滴眼剂

D：毛果芸香碱滴眼剂

答案：C

29.下列选项中，属于四环素禁用的人群有()

A：妊娠期妇女

B：月经期妇女

C：精神病患者

D：中、老年人

答案：A

30.肝功能不全的心衰患者可选用

A：地尔硫䓬

B：地高辛

C：普萘洛尔

D：美西律

答案：B

31.患者女，55岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急人院，查体：138／90mmHg，心率120次／分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A：8天

B：2天

C：6天

D：4天

答案：D

32.细胞内液的主要阳离子是

A：钾

B：镁

C：钠

D：钙

答案：A

33.癫痫小发作选用

A：苯妥英钠

B：乙琥胺

C：苯巴比妥

D：丙戊酸钠

答案：B

34.（2017年真题）可能引起中性粒细胞减少的药物（）

A：丙硫氧嘧啶

B：左甲状腺素

C：鲨肝醇

D：碘，碘化物

答案：A

35.下列药物能抑制尿酸生成的是

A：秋水仙碱

B：丙磺舒

C：非布司他

D：呋塞米

答案：C

36.口服吸收差，血药浓度低，仅适用于肠道感染及下尿路感染的是()

A：磺胺嘧啶

B：诺氟沙星

C：呋喃唑酮

D：甲氧苄啶

答案：C

37.下述关于甘油的描述，错误的是()

A：属于渗透性泻药

B：用于便秘的治疗

C：孕妇慎用

D：属于润滑性泻药

答案：A

38.主要作用于有丝分裂M期，干扰微管蛋白合成的药物是

A：顺铂

B：高三尖杉酯碱

C：氟尿嘧啶

D：多柔比星

答案：B

39.引起睫状肌麻痹，适用于治疗虹膜睫状体炎、检查眼底前的散瞳、验光配镜屈光度检查的药物是

A：碘苷

B: 阿托品

C: 奥布卡因

D: 20%甘露醇

答案：B

40.作用机制是抑制纯化的HIV-1和HIV-2蛋白酶，与蛋白酶的活性部位直接结合，是蛋白酶的竞争性抑制剂，这种竞争性结合阻碍了病毒颗粒成熟过程中病毒前体多蛋白的裂解过程，由此产生的不成熟的病毒颗粒不具有感染性，无法建立新一轮感染，该类药物是

A: 核苷类反转录酶抑制药

B: 蛋白酶抑制药

C: 非核苷类反转录酶抑制药

D: 整合酶抑制剂

答案：B

41.属于芳基乙酸类的是

A: 吲哚美辛

B: 对乙酰氨基酚

C: 塞来昔布

D: 阿司匹林

答案：A

42.西咪替丁的作用原理是()

A: 阻断 β 受体

B: 阻断 α 受体

C: 阻断H

D: 阻断H

答案：D

43.利伐沙班的药理作用是

A：抑制血小板聚集

B：阻止了Xa对凝血酶原的作用

C：抑制已与纤维蛋白结合的凝血酶

D：抑制游离凝血酶

答案：B

44.小剂量碘主要用于

A：呆小病

B：黏液性水肿

C：抑制甲状腺素的释放

D：单纯性甲状腺肿

答案：D

45.血浆半衰期最长的强心苷类药物是

A：多巴酚丁胺

B：米力农

C：洋地黄毒苷

D：地高辛

答案：C

46.下述种类的利尿药中，利尿作用最强的是

A：噻嗪类利尿剂

B：碳酸酐酶抑制剂

C：留钾利尿剂

D：袢利尿剂

答案：D

47.茶碱浓度20μg/ml时会出现

A：呼吸、心跳停止

B：心动过速、心律失常

C：为有效的治疗浓度

D：恶心、呕吐、失眠

答案：B

48.（2018年真题）不属于减鼻充血药的是（）

A：麻黄碱

B：羟甲唑啉

C：伪麻黄碱

D：色甘酸钠

答案：D

49.异丙托溴铵的作用机制是

A：阻断白三烯受体

B：抑制磷酸二酯酶

C：阻断α受体

D：阻断M受体

答案：D

50.治疗地高辛中毒引起窦性心动过缓的药物是

A：阿托品

B：阿利吉仑

C：沙库巴曲缬沙坦

D：胺碘酮

答案：A

51.维生素K

A：抑制血小板聚集

B：促进四氢叶酸类辅酶的循环利用

C：促进凝血因子合成

D：促进纤溶

答案：C

52.下列哪个药物没有散瞳作用

A：毛果芸香碱

B：托吡卡胺

C：硫酸阿托品

D：去氧肾上腺素

答案：A

53.下列关于镇痛药物的禁忌证，错误的是

A：多痰患者禁用可待因

B：心源性哮喘禁用吗啡

C：室上性心动过速禁用哌替啶

D：颅脑损伤患者禁用羟考酮

答案：B

54.临床最常用的强心苷类正性肌力药是

A：米力农

B：多巴酚丁胺

C：依那普利

D：地高辛

答案：D

55.常作为根除幽门螺杆菌治疗的抗菌药物之一的是

A: 克林霉素

B: 红霉素

C: 克拉霉素

D: 万古霉素

答案：C

56.2~3分钟起效，5分钟达最大效应的硝酸酯类药物是

A: 硝酸甘油

B: 普萘洛尔

C: 哌唑嗪

D: 硝苯地平

答案：A

57.弱效（使LDL-ch水平降低＜30%）的他汀类调血脂药

A: 小剂量氟伐他汀

B: 小剂量阿托伐他汀

C: 依折麦布

D: 大剂量阿托伐他汀

答案：A

58.属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的药品是

A: 氟他胺

B: 托瑞米芬

C: 乙烯雌酚

D: 他莫昔芬

答案：A

59.（2018年真题）具有强大的抗凝血因子Xa功能及微弱的抗凝血酶作用,可用于预防深静脉血栓形成的药物是（）

A：尿激酶

B：华法林

C：那屈肝素钙

D：阿加曲班

答案：C

60.（2021年真题）关于抗心力衰竭药物沙库巴曲缬沙坦的说法，错误的是（）

A：血钾水平>5

B：适用于射血分数降低的慢性心力衰竭（NYHAⅡ-Ⅳ级，LVEF≤40%）成年患者

C：通过抑制脑啡肽酶，同时阻断血管紧张素Ⅱ的1型受体（AT1）起效

D：与血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）合用具有协同作用

答案：D

61.（2019年真题）既可用于男性性功能减退，又可用于女性绝经后晚期乳腺癌治疗的药物是（）

A：特拉唑嗪

B：坦洛新

C：西地那非

D：十一酸睾酮

答案：D

62.阿昔洛韦的作用靶点是

A: 脱氧核糖核酸聚合酶

B: 神经氨酸酶

C: HIV-1反转录酶

D: HIV-1和HIV-2蛋白酶

答案：A

63.（2018年真题）可与奎尼丁发生与P糖蛋白有关的相互作用的药物是（）

A: 低分子肝素

B: 肝素钠

C: 达比加群酯

D: 华法林

答案：C

64.早产儿、妊娠后期及哺乳期妇女禁用下列哪种药物

A: 氯霉素

B: 红霉素

C: 罗红霉素

D: 青霉素

答案：A

65.患者，男，24岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

A: 药物性肝炎

B: 出血性膀胱炎

C: 骨髓抑制

D: 肺纤维化

答案：D

66.维生素C的主要适应证是

A：治疗厌食症

B：治疗佝偻病

C：防治坏血病

D：治疗脂溢性皮炎

答案：C

67.（2016年真题）12岁以下儿童禁用的非甾体抗炎药是

A：双氯芬酸

B：阿司匹林

C：尼美舒利

D：塞来昔布

答案：C

68.哮喘急性发作首选的治疗药物是

A：短效B2受体激动制

B：吸入性糖皮质激素

C：白三烯受体阻断剂

D：磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

69.患者，男，24岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

A：神经毒性

B：出血性膀胱炎

C：药物性肝炎

D：骨髓功能抑制

答案：D

70.12%复方氨基酸注射液（18AA）的静脉滴速为

A: 不超过40滴/分

B: 滴速20～30滴/分

C: 不超过15滴/分

D: 滴速80～100滴/分

答案：B

71.袢利尿药中，静脉给药维持时间最长的是()

A: 布美他尼

B: 托拉塞米

C: 依他尼酸

D: 呋塞米

答案：B

72.患者，女，49岁。身高164cm，体重55kg，因更年期月经不调，经药物治疗效果不佳，而行“子宫切除术”。无药物过敏史。

A: 米诺环素

B: 替考拉宁

C: 拉氧头孢

D: 克拉霉素

答案：C

73.因为能增强β-肾上腺素受体阻断药对心脏的抑制作用，所以禁止与普萘洛尔合用的药物是

A: 二甲双胍

B: 尼麦角林

C：倍他司汀

D：丁苯酞

答案：B

74.金刚烷胺和美金刚合用

A：增加肾毒性

B：可增加抗胆碱不良反应的危险

C：增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

D：增加锥体外系不良反应的风险

答案：C

75.多日化疗所致恶心及呕吐的药物预防方案是

A：建议用单一药物，如地塞米松、5-HT3受体阻断剂或多巴胺受体阻断剂(如甲氧氯普胺)预防呕吐

B：推荐化疗前用三药方案，包括单剂量5-HT3受体阻断剂、地塞米松和NK-1受体阻断剂

C：在化疗期间每日使用HT3受体阻断剂，地塞米松应连续使用至化疗结束后2～3天，必要时可以考虑加入阿瑞匹坦

D：推荐第1天采用5-HT3受体阻断剂联合地塞米松，第2和第3天继续使用地塞米松

答案：C

76.急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

A：胺碘酮

B：利多卡因

C：普萘洛尔

D：奎尼丁

答案：B

77.变异型心绞痛宜选用

A：地尔硫

B：维拉帕米

C：硝苯地平

D：普萘洛尔

答案：C

78.为最受推荐的常规避孕药，择期手术和长期卧床者，需在手术前一个月停止使用的是

A：孕激素

B：长效避孕药

C：短效口服避孕药

D：雌激素

答案：C

79.长期大量服用维生素K

A：视物模糊、疲乏、乳腺肿大

B：疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

C：视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

D：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案：A

80.适用于肥胖及单用饮食控制无效的糖尿病患者的是

A：西格列汀

B：胰岛素

C：二甲双胍

D：格列本脲

答案：C

81.属于肾小管上皮细胞钠离子通道抑制剂的是()

A：阿米洛利

B：氢氯噻嗪

C：乙酰唑胺

D：呋塞米

答案：A

82.高血压合并痛风者不宜使用

A：阿替洛尔

B：依那普利

C：氢氯噻嗪

D：硝苯地平

答案：C

83.呋塞米的利尿作用机制主要是

A：特异性阻滞Na+通道

B：抑制Na+-H+交换

C：抑制Na+-K+-2Cl-同向转运子

D：抑制碳酸酐酶

答案：C

84.可用于恶性淋巴瘤的药物是

A：氟尿嘧啶

B：利妥昔单抗

C：阿糖胞苷

D: 甲氨蝶呤

答案：C

85.患者，女，63岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入（PCI）治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

A: 氯吡格雷

B: 双氯芬酸

C: 华法林

D: 奥美拉唑

答案：A

86.焦虑型、夜间醒来次数较多者宜选用

A: 氯美扎酮

B: 谷维素

C: 氟西泮

D: 夸西泮

答案：C

87.低度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A: 5-HT3受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

B: 5-HT3受体阻断剂+口服地塞米松

C: 奥美拉唑+口服地塞米松

D: 每日化疗前，应用5-HT3受体阻断剂或口服地塞米松

答案：D

88.在物理降温配合下，可使体温降至正常以下，用于人工冬眠疗法的药物是

A：地西泮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/097116103050010024