

# 母婴护理员理论考核试题

## 一、选择题

1.部分女婴于出生后( )天可见阴道流出少量血性分泌物,类似于月经,可持续数天,称假月经。[单选题]

- A、4~5
- B、4~7
- C、5~7✓
- D、6~8

2.( )进入十二指肠发挥多种消化酶的消化作用。[单选题]

- A、胰岛素
- B、胰液✓
- C、胃液
- D、胆汁

3.巨大儿的定义为胎儿体重等于或超过( )千克。[单选题]

- A、3 千克
- B、4 千克✓
- C、5 千克
- D、6 千克

4.出生后机体内环境的调节主要依靠肾脏维持,随着生理要求的提高,肾功能迅速增长,到( )岁后各项肾功能按体重或体表面积计算已接近成人水平。[单选题]

- A、1✓

B、 2

C、 3

D、 4

5.以下不是婴儿缺水的表现是( )。 [单选题]

A、 舌苔厚

B、 眼屎多

C、 好动✓

D、 大便过干

6.出生时婴儿的腕部骨骼均是软骨,( )岁左右腕骨才全部钙化完成。 [单选题]

A、 8

B、 9

C、 10✓

D、 12

7.出生( )个月的婴幼儿,能够对大声音做出反应:惊跳、眨眼、哭、笑等。 [单选题]

A、 1~2✓

B、 2~3

C、 3~4

D、 4~5

8.产褥期锻炼从分娩第二天即可开始,每天做( ),以后逐渐增加运动次数及运动量 [单选题]

A、 5~8 次

B、 5~9 次

C、 5~10 次✓

D、5~12 次

9.早产儿出生后( )天出现生理性黄疸。[单选题]

A、1~2

B、2~3

C、3~5✓

D、4~6

10.产妇每天还需要补充一定量的钙剂,约( )毫克。[单选题]

A、200~400

B、400~600

C、600~800✓

D、800~1000

11.( )个月前的婴儿唾液淀粉酶很少,,因此在此之前不宜喂婴儿淀粉类食物(如米糊)。[单选题]

A、1

B、2

C、3✓

D、4

12.孕末期孕妇要求每天摄入( )毫克铁,供给胎儿储备用。[单选题]

A、25

B、35✓

C、30

D、20

13.联合国儿童基金会将儿童期定为( )。[单选题]

- A、0~16 岁
- B、0~17 岁
- C、0~18 岁✓
- D、0~20 岁

14.后囟门在出生后()周闭合。[单选题]

- A、2~4
- B、4~6
- C、6~8✓
- D、8~10

15.会阴无伤口者,在产后第三天即可淋浴,但禁止盆浴,浴室温度 30°C左右,水温在 42°C左右,每次( )分钟为宜。[单选题]

- A、5~8 分钟
- B、5~9 分钟
- C、5~10 分钟✓
- D、6~15 分钟

16.生长发育消耗的能量是儿童特有的,在出生后的 3 个月内约( )%的能量用于生长发育[单选题]

- A、25
- B、30✓
- C、35
- D、40

17.如给新生儿喂奶的产妇过多食用巧克力,会对婴儿的发育产生不良影响。巧克力中所含的( )会损伤婴儿的神经系统和心脏,并使肌肉松弛,排尿量增加,导致婴儿消化不良,睡觉不稳,出现爱哭闹的现象。[单选题]

- A、一元碱
- B、二元碱
- C、不可溶兴碱
- D、可可碱✓

18.生长 28 周以后分娩的婴儿叫( )。[单选题]

- A、早产儿✓
- B、有生机儿
- C、晚产儿
- D、畸形儿

19.准妈妈的体温如果持续超过( )就会使胎盘、子宫的血流量减少,需要尽快去医院,请求医生帮助。[单选题]

- A、37°C
- B、37.5°C
- C、38°C✓
- D、39°C

20.( )是指包裹在某些神经突起外面的一层类似电线绝缘体的磷脂类物质。[单选题]

- A、髓核
- B、髓鞘✓
- C、髓海
- D、髓祥

21.婴幼儿暴怒发作时可对其采用( )进行冷处理,但必须保证婴幼儿的安全。[单选题]

- A、怒斥法

B、抽打法

C、不理不睬法

D、暂时隔离法✓

22.以下不是婴儿的骨骼组成部分的是( ) [单选题]

A、髌骨

B、坐骨

C、耻骨

D、颞骨✓

23.母乳喂养的婴儿,其( )的成长是吸收妈妈乳汁中的钙来利用的。 [单选题]

A、神经

B、肾脏

C、骨骼✓

D、皮肤细胞

24.正常婴儿出生时的平均体重为 3kg,后半年平均每月增加( ) [单选题]

A、150g

B、200g

C、250g✓

D、300g

不用看

25.手眼协调的动作是( )岁婴幼儿发现问题和解决问题的主要方式,也是开发智力、促进心理发展的有效手段。 [单选题]

A、3~6

B、0~3✓

C、6~9

D、9~12

26.建议孕妈从( )起自己数胎动。一旦发现异常情况,及时到医院就诊。[单选题]

A、14 周

B、18 周

C、24 周

D、28 周✓

27.告诫产妇不要憋尿,每( )小时解小便 1 次,以防发生尿路感染。[单选题]

A、1~2 小时

B、2~3 小时

C、3~4 小时✓

D、4~5 小时

28.婴儿出生时脊柱是直的,弯曲是随着( )逐渐形成的。[单选题]

A、骨骼发育

B、语言发育

C、食欲增加.

D、动作发育✓

29.胎儿四肢运动,如拳打、脚踢,一般持续( )。[单选题]

A、1~15 秒✓

B、1~18 秒

C、1~12 秒

D、1~20 秒

30.胎儿窘迫的原因很多,不包括哪一项( ) [单选题]

A、产妇本身有高血压

B、产妇本身糖尿病

C、产妇产前期等并发症

D、产妇心情不好 ✓

31.分娩后( )小时可以下床慢慢走动、上厕所等。 [单选题]

A、9

B、10

C、11

D、12 ✓

32.新生儿心脏重( )克。 [单选题]

A、15~20

B、20~25 ✓

C、25~30

D、30~35

33.如果平均每天分泌出 600~800 毫升乳汁,每天都要从乳汁里丢失约( )克以上的钙。 [单选题]

A、100 毫克

B、150 毫克

C、200 毫克 ✓

D、250 毫克

34.第一产程指从开始出现规律宫缩,直至宫口开全( )厘米 [单选题]

A、 8

B、 10✓

C、 12

D、 15

35.蛋白质、胰蛋白酶早在( )孕周已分泌足量,因此新生儿对蛋白质能很好地消化吸收[单选题]

A、 22~24

B、 24~26

C、 26~28✓

D、 28~30

36.胎儿窘迫的原因很多,如脐带绕颈、胎盘功能不良( )或是产妇有高血压等。[单选题]

A、 产妇发烧

B、 吸入胎便✓

C、 妊娠反应

D、 发育不良

37.( )为骨骼肌肉系统的基本指标。[单选题]

A、 握力

B、 张力

C、 压力和体力

D、 握力和背肌力✓

38.胎儿头占身长的( )[单选题]

A、 1/2✓

B、 1/3

C、1/4

D、1/5

39.第二乳磨牙萌出的时间为( ) [单选题]

A、20~30 ✓

B、20~22

C、2~25

D、18~25

40.( )是最常用的离差评价法之一。它以均值(X)为基准值,以其标准差(S)为离散距,制成生长发育评价标准。 [单选题]

A、育曲线图评价法

B、发育等级评价法 ✓

C、体型图评价法

D、费尔斯综合评价法

41.婴儿血循环时间平均值为( )秒,学前期儿童需 15 秒,以后则需 18~20 秒。 [单选题]

A、10

B、11

C、12 ✓

D、13

42.( )是指用身体某些发育指标的水平制成标准年龄,来评价婴幼儿身体发育状况的方法。 [单选题]

A、育曲线图评价法

B、发育等级评价法

C、发育年龄评价法 ✓

D、费尔斯综合评价法

43.膀胱内压力( )时易出现膀胱输尿管反流而诱发尿道感染。[单选题]

- A、降低
- B、增高✓
- C、不平衡
- D、不稳

44.新生儿肠的长度约为身长的( )倍。[单选题]

- A、8✓
- B、9
- C、10
- D、12

45.婴儿的骨骼则是由以下三块骨头连接在一起的,不包括( )。[单选题]

- A、髌骨
- B、坐骨
- C、耻骨
- D、骨连结✓

46.营养状况的评价不包括( ) [单选题]

- A、体格生长的测量
- B、膳食调查
- C、视力的检查✓
- D、实验室的检查

47.表示一个女人愿意帮助其他女人分娩,叫作( )分娩。[单选题]

- A、助乐
- B、享乐
- C、陪伴
- D、导乐✓

48.新生儿胃容量为( )毫升,3 个月时为 120 毫升,1 岁时为 250 毫升。[单选题]

- A、30~35✓
- B、35~40
- C、40~45
- D、45~50

49.古典式的子宫剖开方式,子宫破裂的机会则会增加( )左右。[单选题]

- A、2 倍
- B、3 倍
- C、4 倍✓
- D、5 倍

50.新生儿胃容量为( )毫升。[单选题]

- A、20~30
- B、30~23
- C、30~35✓
- D、34~38

51.以下不是肾脏的正确分类是( )。[单选题]

- A、消化器官✓
- B、排泄器官

C、调节器官

D、内分泌器官

52.手部的精细动作要到( )岁左右才能完成。[单选题]

A、 3

B、 4

C、 5✓

D、 6

53.新生女婴尿道仅长( )厘米,外口暴露且接近肛门,易受粪便污染。[单选题]

A、 1✓

B、 2

C、 3

D、 4

54.新生儿红斑( )天后自然消失。[单选题]

A、 1~2✓

B、 2~3

C、 3~4

D、 4~5

55.为了避免会阴的损伤,在接生时会采取( )的方法,将分娩带给母亲的伤害降到最低[单选题]

A、 会阴侧切✓

B、 会阴竖切

C、 会阴横切

D、 会阴斜切

56.以下不属于补钙的最好方法的是( ) [单选题]

A、通过产褥汗✓

B、晒太阳

C、运动

D、食物补钙

57.一般来说,如母亲每天分泌约 700~800 毫升的乳汁,哺乳期的妈妈平均每天丢失钙约( )毫克。 [单选题]

A、 110~140

B、 150~200

C、 210~240✓

D、 250~270

58.如果吮手指习惯在 1 岁以内未能纠正,则可持续至 2~3 岁,极少数可持续到( )岁以后。 [单选题]

A、 11

B、 12

C、 13✓

D、 14

59.出生时婴儿的腕部骨骼均是软骨( )岁左右腕骨才全部钙化完成。 [单选题]

A、 8

B、 9

C、 10✓

D、 12

60.产妇分娩后应给予以下营养食物,除了( ) [单选题]

- A、高热量
- B、高蛋白
- C、含丰富维生素
- D、高糖类✓

61.新生儿心脏重( )克,占体重的 0.8%。[单选题]

- A、5~10
- B、10~15
- C、15~20
- D、20~25✓

62.会阴无伤口的产妇,在产后( )即可淋浴。[单选题]

- A、第一天
- B、第二天
- C、第三天✓
- D、第四天

63.前囟门凹陷可见于( )或重度营养不良。[单选题]

- A、发烧
- B、感冒
- C、头疼
- D、脱水✓

64.通常自然分娩产妇在产后( )便可下床适当活动。[单选题]

- A、12 小时✓
- B、13 小时

C、14 小时

D、15 小时

65.食物中茶叶所含( )的会妨碍铁吸收。 [单选题]

A、草酸

B、叶酸

C、鞣酸✓

D、茶多酚

66.根据统计,足月的胎儿在母体内的时间,有将近( )%为安静睡眠期。 [单选题]

A、25✓

B、30

C、35

D、40

67.婴儿的后囟在( )个月左右闭合。 [单选题]

A、2

B、3✓

C、4

D、6

68.婴儿缺少维生素 C,易引起( )下出血,在膝关节上下局部有肿胀、压痛,两腿外展。 [单选题]

A、黏膜

B、筋膜

C、腹膜

D、骨膜✓

69.一般而言,考泊指数为( )以下有瘦的倾向。[单选题]

A、 15✓

B、 16

C、 17

D、 18

70.手眼协调的动作是( )岁婴幼儿发现问题和解决问题的主要方式。[单选题]

A、 3~6

B、 0~3✓

C、 6~9

D、 9~12

71.婴儿血循环时间平均值为( )秒。[单选题]

A、 12✓

B、 13

C、 14

D、 15

72.新生儿唾液腺未发育好,唾液少,口腔较干燥。( )个月分泌增加,6~7 个月分泌更加旺盛。[单选题]

A、 3~4✓

B、 4~5

C、 5~6

D、 2~3

73.血循环时间平均值在学前期儿童时期需( )秒。[单选题]

A、 14

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/098033105024006034>