

# 胃肠外科考试试题

## 目录

胃肠外科考试试题 .....	1
胃肠外科初级医师考试试题 .....	1
一、单项选择题 .....	1
二、多选题 .....	10
三、X型题 .....	12
四、X型题 .....	14
胃肠外科中级、高级考试试题 .....	16
一、单项选择题 .....	16
二、多选题 .....	24
三、X型题 .....	27
四、X型题 .....	28

## 胃肠外科初级医师考试试题

### 一、单项选择题

1. 十二指肠与空肠分界的解剖标志是() [单选题]\*

- A. 胃膈韧带
- B. 胃肝韧带
- C. 胃脾韧带

D. 胃结肠韧带

E. Tre庇韧带 ✓

2. 下列哪项不属于胃癌根治术后的早期并发症() [单选题]\*

A. 胃出血

B. 吻合口瘘

C. 倾倒综合征 ✓

D. 吻合口梗阻

E. 十二指肠残端破裂

3. 十二指肠溃疡的好发部位是() [单选题]\*

A. 十二指肠球部 ✓

B. 十二指肠水平部

C. 十二指肠降部

D. 十二指肠升部

E. 十二指肠与空肠交界处

4. 对胃十二指肠溃疡急性穿孔并发休克者护理时, 错误做法是() [单选题]\*

A. 取半卧位 ✓

B. 维持水、电解质和酸碱平衡

C. 使用抗生素

D. 保持有效胃肠减压

E. 禁食、禁饮

5. 肠梗阻病人的共同临床特征是() [单选题]\*

A. 腹痛、腹胀、呕吐、停止排便 ✓

- B. 腹痛、呕吐、肠鸣音亢进、腹胀
- C. 腹部阵发性绞痛、排黏液血便、肠型、恶心
- D. 腹部胀痛、肠鸣音消失、肌紧张、溢出性呕吐
- E. 腹胀、恶心呕吐、肠型、停止排便排气

6. 下列不属于肠梗阻的基本处理的是 () [单选题]\*

- A. 禁食
- B. 胃肠减压
- C. 灌肠 ✓
- D. 使用抗菌药
- E. 补液、纠正水电解质及酸碱失衡

7. 肠梗阻时行胃肠减压的主要目的不是下列哪一项 () [单选题]\*

- A. 减少肠腔内细菌和毒素
- B. 减轻腹胀
- C. 降低肠腔内压力，改善肠壁循环
- D. 监测梗阻部位及程度
- E. 改善呼吸循环状况 ✓

8. 麦氏点位于 () [单选题]\*

- A. 左髂前上棘与脐连线中外1/3 交界处
- B. 右髂前上棘与脐连线中外1/3 交界处 ✓
- C. 左髂前上棘与脐连线中内1/3交界处
- D. 右髂前上棘与脐连线中内1/3 交界处
- E. 右髂前上棘与脐连线中外2/3交界处

9. 血栓性外痔的主要临床表现为() [单选题]\*

- A. 脓血便
- B. 柏油样便
- C. 果酱样便
- D. 黏液便
- E. 剧烈疼痛 ✓

10. 肛裂最突出的临床表现() [单选题]\*

- A. 排便时及排便后肛门剧烈疼痛 ✓
- B. 反复便秘
- C. 便血
- D. 肛门瘙痒
- E. 反复脓肿形成

11. 以下对大肠癌术后结肠造口病人的护理措施中, 正确的是() [单选题]\*

- A. 结肠造口一般于术后1周开放 ✓
- B. 当造口袋内容物超过1/2 时, 应及时更换
- C. 结肠造口开放后即应开始扩肛以防造口狭窄
- D. 术后7-10天切忌灌肠以免影响伤口愈合
- E. 造口开放前应用干的无菌纱布敷盖结肠造口, 避免感染

12. 男性, 27岁, 用力排便后肛门剧烈疼痛, 伴滴少量鲜血。肛门检查: 截石位6点位见一暗红色柔软

团状物。以下对该病人的护理中错误的是() [单选题]\*

- A. 便后用1:5000 高锰酸钾温水坐浴 ✓
- B. 行直肠指检以明确诊断

C. 嘱病人多喝水和进粗纤维食物

D. 可行扩肛疗法

E. 形成良好的排便习惯

13. 痔手术后2-3天饮食宜选择() [单选题]\*

A. 普食

B. 流食

C. 多吃水果蔬菜

D. 少渣 ✓

E. 高蛋白高脂肪

14. 妊娠期急性阑尾炎的特点是() [单选题]\*

A. 体温无明显升高

B. 呕吐不明显

C. 腹部体征明显

D. 中毒症状不明显

E. 压痛点上移 ✓

15. 以下不适宜做直肠指检的疾病是() [单选题]\*

A 直肠息肉

B 肛裂 ✓

C 内痔

D 外痔

E 肛瘘

16. 某患者行肛瘘切除术后, 每日须行温水坐浴和换药, 合理的安排是() [单选题]\*

A 清晨先换药 B 先大便，再坐浴后换药 ✓

C 先大便后坐浴 D 先坐浴后换药

E 先温水坐浴

17. 大肠癌最常见的转移方式为() [单选题]\*

A. 直接浸润

B. 血行转移

C. 淋巴转移 ✓

D. 种植播散

E. 胎盘垂直转移

18. 以下哪项检查可作为大肠癌高危人群的初筛方法() [单选题]\*

A. 内镜检查

B. X线钡剂灌肠

C. CEA 测定

D. 直肠指检

E. 粪便隐血试验 ✓

19. 肛裂“三联症”是指同时存在() [单选题]\*

A. 肛裂、“前哨痔”及肛乳头肥大 ✓

B. 肛裂、肛瘘、痔

C. 肛裂、直肠肛管周围脓肿、肛瘘

D. 肛裂、混合痔及肛乳头肥大

E. 肛裂，肛瘘及肛乳头肥大

20. 若要进行多种成分血输血时，首先要输[单选题]\*

- A 白蛋白
- B 血小板 ✓
- C 红细胞
- D 血浆
- E 冷沉淀

21. 患者女性，60岁。因肠癌化疗时穿刺部位出现肿胀，下列正确的处理是() [单选题]\*

- A. 立即停止给药，局部注射解毒剂，然后拔针
- B. 立即停止给药，拔针，然后局部注射解毒剂
- C. 立即停止给药，不拔针，接注射器回抽溢出的药液和注射解毒剂后，再拔针 ✓
- D. 立即停止给药，不拔针，接注射器回抽溢出的药液后，再拔针

22. 胃肠减压护理，下列哪一项不正确() [单选题]\*

- A. 病人应禁食
- B. 保持减压管通畅
- C. 胃管堵塞禁止冲洗 ✓
- D. 注意口腔护理
- E. 记录吸出液的量及性质

23. 腌制食物与肝癌发病有一定的关系，是因为腌制食物中含有() [单选题]\*

- A. 亚硝酸盐 ✓
- B. 黄曲霉素
- C. 偶氮苯类物质
- D. 较高的铁
- E. 较高的苯

24. 全营养混合液不包括() [单选题]\*

- A. 氨基酸
- B. 脂肪乳
- C. 葡萄糖
- D. 皮质激素 ✓
- E. 电解质

25. 关于肠内营养, 下列哪项是错误的() [单选题]\*

- A. 肠内营养常需经导管输入
- B. 营养液的输入应缓慢
- C. 为方便使用, 应一次大量推注营养液 ✓
- D. 肠内营养的并发症包括腹胀和腹泻
- E. 应用肠内营养者需胃肠道功能正常或存在部分功能

26. 应考虑为绞窄性肠梗阻的腹部X 线表现是() [单选题]\*

- A. 多个阶梯状排列的气液平面
- B. 上段肠腔扩张
- C. 膈下游离气体
- D. 孤立、胀大的肠袢且位置较固定 ✓
- E. 胀气肠袢呈“鱼肋骨刺”样改变

27. 以下诊断胃十二指肠溃疡急性穿孔的最有意义的依据是() [单选题]\*

- A. 上腹部明显压痛
- B. 板状腹
- C. 腹式呼吸减弱



D. 移动性浊音阳性

E. X线检查时膈下有游离气体/

28. 患者，男性，42岁，急性阑尾炎发病5天，腹痛减轻但仍发热，右下腹可触及压痛的肿块，处理应

为() [单选题]\*

A 暂不手术，用广谱抗生素治疗 ✓

B 立即手术，切除肿块

C 立即手术，腹腔引流

D 立即手术，切除阑尾

E不需要手术，用广谱抗生素

29. 绞窄性肠梗阻腹痛的特点是() [单选题]\*

A. 阵发性绞痛

B. 持续性腹痛阵发性加剧

C. 持续性隐痛

D. 全腹胀痛

E. 刀割样疼痛 ✓

30. 肠痿病人行负压引流时的正确护理是()?[单选题]\*

A. 引流管的顶端应放置在肠腔内

B. 负压越大越好，以免引流不畅

C. 冲洗液以蒸馏水为好

D. 冲洗速度越快，冲得越干净

E. 一般每天的冲洗量为2000—4000ml 左右 ✓

## 二、多选题

1. 胃肠减压的护理要点有() [多选题]\*

A 保持通畅 ✓

B 妥善固定 ✓

C 观察记录引流液的色、质量 ✓

D 引流装置定期更换 ✓

E 停止口服 ✓

2. 腹部闭合性损伤未明确诊断时的处理原则是() [多选题]\*

A. 禁食 ✓

B. 静脉补液 ✓

C. 禁用镇痛剂 ✓

D. 严密观察病情 ✓

E. 不随意搬动病人 ✓

3. 低钾血症时, 可出现下列那些症状() [多选题]\*

A. 先盐后糖

B. 先晶后胶 ✓

C. 先快后慢 ✓

D. 液种交替 ✓

E. 尿畅补钾

4. 低钾血症可见于() [多选题]\*

A. 长期不能进食者 ✓

B. 严重呕吐患者 ✓

C. 急性肾功能衰竭少尿期病人

D. 代谢性碱中毒病人 ✓

E. 大量注射葡萄糖，并与胰岛素合用者 ✓

5. 肠内营养最常见的并发症是胃肠道反应，其原因包括() [多选题]\*

A. 营养液浓度过高 ✓

B. 输注的速度过快 ✓

C. 营养液温度过低 ✓

D. 添加药物和营养液不相容 ✓

E. 营养液受到污染 ✓

6. 针对肠内营养可能发生吸入性肺炎，应该() [多选题]\*

A. 开始肠内营养时，必须明确营养管的位置 ✓

B. 可通过X 线证实鼻胃管的位置 ✓

C. 灌注营养液时，病人应采取半卧位 ✓

D. 发现有误吸现象，应立即停止肠内营养 ✓

E. 对存在误吸危险的病人，应改为经十二指肠或空肠喂养 ✓

7. 腹部损伤的急救措施包括() [多选题]\*

A. 首先处理严重的复合伤 ✓

B. 疑有内脏损伤者禁食，输液 ✓

C. 防止休克 ✓

D. 妥善处理脱出的脏器 ✓

E. 取半卧位观察呼吸与血循环

8. 倾倒综合征的处理方法() [多选题]\*

A 禁食、禁饮

B 进食需少量多餐 ✓

C 以高蛋白、高糖类为宜

D 进干食 ✓

E 餐后平卧20-30 ✓

9. 胃十二指肠溃疡急性穿孔临床表现的要点有() [多选题]\*

A 呕血、黑便

B 突发性上腹部刀割样疼痛 ✓

C 有膈下游离气体 ✓

D 明显腹膜刺激征 ✓

E 肝浊音界缩小、消失 ✓

10. 急性阑尾炎的护理诊断是() [单选题]\*

A.疼痛 ✓

B. 焦虑

C. 体液不足

D. 潜在并发症

E. 体液过多

### 三、X 型题

男性，65岁，胃溃疡伴瘢痕性幽门梗阻。今晨在气管内麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术，术毕返回病房。

术后留置胃管、腹腔引流管。现麻醉未醒。(共7分)

1. 目前该病人最重要的护理问题是： B [单选题]\*

A.疼痛 ✓

B. 潜在并发症：窒息

C. 潜在并发症：出血

D. 潜在并发症：感染

E. 潜在并发症：吻合口瘘

2. 应给病人安置何种体位：() [单选题]\*

A. 低半卧位

B. 平卧，头侧向一侧 ✓

C. 仰卧位

D. 头低脚高位

E. 头高脚低位

3. 术后第1天，以下观察内容中最主要是观察有无：() [单选题]\*

A. 胃排空延迟

B. 吻合口瘘

C. 倾倒综合征

D. 肛门排气

E. 术后出血 ✓

4. 术后第1天，胃管引流出鲜红色血性液400ml，正确的处理是() [单选题]\*

A. 继续观察

B. 停止胃肠减压

C. 应用止血药、输血 ✓

D. 加快输液速度

E. 马上送手术室止

5. 拔除胃管后第3日，病人问护士吃些什么?回答是：() [单选题]\*

A. 面条

B. 蛋汤、菜汤、藕粉 ✓

C. 牛奶

D. 豆浆

E. 米饭

6. 病人进食后出现上腹饱胀，呕吐，呕吐物为食物，不含胆汁。考虑可能并发() [单选题]\*

A. 倾倒综合征

B. 吻合口梗阻 ✓

C. 十二指肠残端破裂

D. 输出襻梗阻

E. 输入襻梗阻

7. 怀疑有上述并发症时，首选的检查是：() [单选题]\*

A. X 线造影 ✓

B. 粪便隐血试验

C. 胃镜检查

D. 胃酸测定

E. 血常规

#### 四、X 型题

男，49岁，6年前出现排便时出血，多为便纸上带血，时有鲜血附于粪便表现，无局部疼痛，无肿块

脱出，往往于进食辛辣食物、大便硬结时发作和症状加重。体检：截石位，在齿状线上1cm 约7点处触及柔软团状肿块，无触痛，指套退出无染血。(3分)

1. 引起该病人便血的原因首选：[单选题]\*

A. I 期内痔 ✓

B. II 期内痔

C. III 期内痔

D. 血栓性外痔

E. 混合痔

2. 对于该病人的处理方案中错误的是：() [单选题]\*

A. 鼓励病人多饮水增加膳食中纤维含量 ✓

B. 注射硬化剂

C. 便后1:5000高锰酸钾温水坐浴

D. 胶圈套扎疗法

E. 痔切除术

3. 对于该病人的护理，以下说法不妥的是() [单选题]\*

A. 嘱病人多吃粗粮 ✓

B. 服用泻药助排便

C. 养成定时排便习惯

D. 避免久站、久坐、久蹲

E. 便后用1:5000 高锰酸钾溶液热坐浴。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/098040123076006036>