北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试答案》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：化脓性关节炎后期关节已有破坏与增生，强直已不可避免时，最恰当的治疗方法是（　　）。A.避免负重

B.加强活动

C.固定于功能位

D.行关节融合术

E.物理疗法

2、单项选择题：成年人股骨头血液供应中不包括下列哪个血管（　　）。A.髓腔内滋养动脉

B.外骺动脉

C.内骺动脉（圆韧带动脉）

D.上骺动脉

E.下骺动脉

3、单项选择题：对”先天性髋脱位”的论述，下列正确的是（　　）。A.较常见的先天性畸形，女多于男，左侧比右侧多

B.发病原因迄今不明

C.病理发生在髋臼、股骨头、颈、关节囊的原发性病变和继发性病变

D.治疗越早，效果越好

E.以上都是正确的

4、单项选择题：患儿女性，4岁，因肘部外伤并肿胀，活动障碍急诊入院。查体：肘部肿胀明显，可见皮下淤斑。据X线片诊断为肱骨髁上骨折。患者手部尺侧皮肤感觉消失，拇指不能内收，余四指并指无力，考虑诊断为（　　）。A.正中神经损伤

B.尺神经损伤

C.桡神经损伤

D.正中神经返支损伤

E.桡神经浅支损伤

5、单项选择题：人工髋关节置换时，髋臼外展角应为（　　）。A.40～50

B.大于60

C.小于40

D.40～60

E.30～40

6、单项选择题：诊断成人腰椎结核最可靠的依据是（　　）。A.低热盗汗、乏力、食欲不振

B.贫血、血沉增快

C.腰痛、活动困难、棘突叩痛

D.X线片示椎间隙窄，椎体邻缘模糊

E.结核菌素试验阳性

7、单项选择题：患者，25岁，搬重物后腰痛，检查发现腰部活动明显受限，右侧骶棘肌痉挛伴压痛，右直腿抬高45。时，诉腰痛，加强试验（-），感觉、肌力反射均正常，诊断应最先考虑（　）。A.腰椎间盘突出症

B.腰扭伤

C.髋关节扭伤

D.梨状肌综合征

E.第三腰椎横突综合征

8、单项选择题：9岁女性患儿，8天前突发左髋剧痛，左下肢活动受限，伴畏寒，高热，全身不适及食欲不振，急重病容，贫血，体温38.7℃，脉搏100次/分，左大腿近端肿胀，皮温升高，但外观无异常，腹股沟韧带中点稍下方深压痛，最可能的诊断是（　）。A.左髋关节急性风湿性关节炎

B.左髋关节急性化脓性关节炎

C.左髋关节结核

D.左大腿软组织炎症

E.左股骨近端恶性肿瘤

9、单项选择题：骨水泥的化学命名是（　）。A.聚甲基丙烯酸甲酯

B.超高分子高密度聚乙烯

C.过氧化二甲酰

D.甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚物

E.钛合金

10、单项选择题：正常的下肢负重力线中，下列哪3点连成的直线是正确的（　）。A.髂前上棘、髌骨中点、内踝下缘

B.髂前上棘、髌骨中点、第一趾蹼

C.股骨大转子、髌骨中点、内踝下缘

D.股骨大转子、髌骨中点、第一趾蹼

E.髂前上棘、髌骨中点、踝关节中点

11、单项选择题：有关骨肉瘤的血生化检查，下列哪项是错误的（　）。A.骨生化检查可以作为观察病情转归的重要参考指标

B.临床大部分骨肉瘤患者碱性磷酸酶升高

C.骨肉瘤复发时，碱性磷酸酶将不会升高

D.碱性磷酸酶在手术和化疗后明显下降

E.骨肉瘤复发时，碱性磷酸酶升高

12、单项选择题：在一个两部门经济中，已知消费函数为0=100+0.8y，投资I=300亿元，则均衡的国民收入为（　）亿元。A.2000

B.1000

C.1200

D.2400

13、单项选择题：下述哪一项不是急性血源性骨髓炎的早期诊断依据（　）。A.起病急、高热

B.患部持续疼痛不敢活动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098043051015006063