专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024河北省鹿泉区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题完整版（真题汇编）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者,男,52岁,BMI28kg/m2,既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病,患者诉昨晚8点起右大脚趾关节处疼痛难忍宜使用的药物是

A: 碳酸氢钠

B: 别嘌醇

C: 非布司他

D: 秋水仙碱

答案：D

2.6～12个月婴儿甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

A: 25μg

B: 6μg/kg

C: 5μg/kg

D: 4μg/kg

答案：B

3.组胺H

A: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁

B: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁

C: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁

D: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁

答案：B

4.糖皮质激素禁用于低血钾患者是因为

A: 抑制免疫功能只抗炎不抗菌

B: 抑制蛋白质合成

C: 促进胃酸分泌

D: 水钠潴留

答案：D

5.促进微管的装配，抑制其解聚，从而使纺锤体失去正常功能，细胞有丝分裂停止的药物是

A: 他莫昔芬

B: 吲哚美辛

C: 紫杉醇

D: 长春碱类

答案：C

6.患儿，男，7岁。长期偏食。近1个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下4cm，脾肋下1cm。血常规：Hb70g／L，RBC3．0×1012／L，Ret2．0%，WBC、P1t均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

A: 蓝色

B: 红色

C: 绿色

D: 黑色

答案：D

7.分解痰液中的黏液成分如黏多糖和黏蛋白，使黏痰液化，痰液黏度降低而易于咳出的祛痰药是

A：碘化钾

B：氨溴索

C：氯化铵

D：表面活性剂

答案：B

8.属于第四代头孢菌素常用药物的是()。

A：头孢吡肟

B：头孢拉定

C：头孢克肟

D：头孢克洛

答案：A

9.下列保肝药中属于必需磷脂类的是

A：复方甘草酸苷

B：多烯磷脂酰胆碱

C：甘草酸二铵

D：联苯双酯

答案：B

10.患者，男性，48岁，醉酒呕吐后出现发热、咳脓痰1周，头孢唑林治疗4天后体温稍下降，但痰量仍较多，有臭味，考虑厌氧菌感染，应加用以下哪种药物

A：阿奇霉素

B：阿米卡星

C：甲硝唑

D: 氟康唑

答案：C

11.雌激素类药和孕激素类药均可用于()

A: 前列腺癌

B: 晚期乳腺癌

C: 乳房胀痛

D: 绝经期综合征

答案：A

12.弱效(使LDL-ch水平降低<30%)的他汀类调血脂药是()

A: 小剂量氟伐他汀

B: 大剂量阿托伐他汀

C: 依折麦布

D: 小剂量阿托伐他汀

答案：A

13.（2019年真题）关于蒙脱石散的作用特点及临床使用的说法，错误的是（）

A: 直接服用或调成糊状、丸状服用

B: 不被胃肠道吸收，对中枢神经及心血管系统无不良影响

C: 腹泻患者宜在两餐之间服用

D: 对伴有感染的腹泻患者，应联合应用有效的抗菌药物治疗

答案：A

14.抑制胃酸分泌作用最强的药物是

A: 奥美拉唑

B: 雷尼替丁

C：西咪替丁

D：尼扎替丁

答案：A

15.长期大量应用双嘧达莫治疗缺血性心脏病时,可能导致患者缺血加重,甚至病情恶化可能的原因是（）

A：双嘧达莫抵抗

B：治疗反应变异

C：冠状动脉窃血

D：抗血小板药物继发失效

答案：C

16.与醛固酮受体竞争性结合，拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

A：乙酰唑胺

B：甘露醇

C：氨苯蝶啶

D：螺内酯

答案：D

17.缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

A：铁剂

B：叶酸

C：维生素B12

D：维生素C

答案：A

18.（2020年真题）急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

A：长春新碱

B：甲氨蝶呤

C：环磷酰胺

D：曲妥珠单抗

答案：A

19.酰胺醇类药的主要作用靶点是

A：细胞壁丙氨酰丙氨酸

B：核糖体的50S亚基

C：核糖体的30S亚基

D：细胞内膜PBP

答案：B

20.（2019年真题）长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是（）

A：乙胺丁醇

B：吡嗪酰胺

C：链霉素

D：利福平

答案：C

21.（2020年真题）患者，男，66岁。BMI24kg/m2，高血压病史15年，冠心病史3年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服1片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体:血压163/83mmHg，心率80次1分。临床诊断为:(1)心绞痛急性发作;(2)心功能不全、心功能III级;(3)高血压病3级;(4)高脂血症。

A: 呋塞米
B: 贝那普利
C: 阿托伐他汀
D: 氨氯地平
答案：A

22.作用于细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的抗菌药物是
A: 磺胺甲唑
B: 利奈唑胺
C: 甲氧苄啶
D: 呋喃妥因
答案：A

23.甲羟孕酮口服用于功能失调性子宫出血(功血)止血的用法用量是
A: 口服，一次10～20mg，每4～8小时一次，连用2～3日；血止后每隔3日递减1/3剂量，直至维持量每日100mg，连续用药至血止后21日停药
B: 于月经后半周期(撤药性出血的第16～25日)开始口服，一次10mg，一日1次，连用10～14日，酌情应用3～6个周期
C: 口服一日4～8mg，连服5～10日
D: 一日30mg，连服6个月
答案：A

24.关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是
A: 对于不同的手术，选择疗程不同
B: 用药期间需定期测定血红蛋白
C: 用药过量可导致出血并发症
D: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药

答案：D

25.H1受体拮抗剂的各项叙述，错误的是

A：可用于治疗变态反应性失眠

B：主要用于治疗变态反应性疾病

C：主要代表药有法莫替丁

D：可用于治疗妊娠呕吐

答案：C

26.（2017年真题）升高高密度脂蛋白胆固醇水平的（）

A：烟酸

B：叶酸

C：维生素B2

D：泛酸钙

答案：A

27.下列说法正确的是

A：沙美特罗适用于缓解支气管痉挛的急性症状

B：长效β2受体激动剂不适合初始用于快速恶化的急性哮喘发作

C：异丙托溴铵口服可提高疗效

D：氨茶碱可与青霉素合用

答案：B

28.婴儿和哺乳期妇女禁用()作为泻药。

A：乳果糖

B：硫酸镁

C：聚乙二醇4000

D：酚酞

答案：D

29.属于抗纤维蛋白溶解药的是

A：氨甲环酸

B：酚磺乙胺

C：艾曲泊帕乙醇胺

D：甲萘氢醌

答案：A

30.主要用于在抗雌激素辅助治疗后或治疗过程中复发的，或是在抗雌激素治疗中进展的绝经后（包括自然绝经和人工绝经）雌激素受体阳性的局部晚期或转移性乳腺癌，该药物是

A：来曲唑

B：氟维司群

C：依西美坦

D：他莫昔芬

答案：B

31.（2019年真题）患者，女，36岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午10点及下午4点，有时夜间痛醒，进食后缓解，X线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（）

A：奥美拉唑

B：颠茄

C：多潘立酮

D：甲氧氯普胺

答案：A

32.服用异烟肼进行抗结核治疗的患者,为预防周围神经炎,应补充的维生素是（）

A：维生素B2

B：维生素

C：维生素B6

D：维生素A

答案：C

33.属于磷酸二酯酶抑制剂的是

A：替格瑞洛

B：替罗非班

C：氯吡格雷

D：双嘧达莫

答案：D

34.作用机制为直接改变破骨细胞的形态学，从而抑制其功能，首先阻止破骨细胞的前体细胞黏附于骨组织，进而对破骨细胞的数量和活性产生直接的影响，该药物是

A：阿仑膦酸钠

B：降钙素

C：骨化三醇

D：雷洛昔芬

答案：A

35.属于第三代头孢菌素的药物是()。

A：头孢哌酮

B：头孢拉定

C：头孢吡肟

D: 头孢氨苄

答案：A

36.用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

A: 长春碱类

B: 紫杉醇

C: 伊立替康

D: 多柔比星

答案：C

37.对革兰阳性菌作用强，而对革兰阴性菌作用弱的药物是

A: 第一代头孢菌素

B: 第四代头孢菌素

C: 第三代头孢菌素

D: 第二代头孢菌素

答案：A

38.慢性充血性心力衰竭宜

A: 停用洋地黄

B: 快速洋地黄化

C: 不宜使用洋地黄

D: 常规剂量的洋地黄

答案：D

39.以下为广谱抗病毒药的是

A: 阿糖腺苷

B: 碘苷

C: 更昔洛韦

D: 利巴韦林

答案：D

40.患者，女，45岁。因持续的烧心和反酸就诊，诊断为胃食管反流病，宜选用的抑酸药物是（）

A: 乳酶生

B: 米索前列醇

C: 雷尼替丁

D: 吉法酯

答案：C

41.肝素过量所致出血的解救药物是()

A: 维生素K

B: 鱼精蛋白

C: 蛇毒血凝酶

D: 酚磺乙胺

答案：B

42.用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能够出现寒战、咽痛、心率加快等症状，其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应，这种反应称为

A: 金鸡纳反应

B: 吉海反应

C: 青霉素脑病

D: 瑞夷综合征

答案：B

43.属于 α 受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

A：克罗米通

B：过氧化氢

C：麻黄碱

D：酮替芬

答案：C

44.促进钙吸收()

A：阿仑膦酸钠

B：葡萄糖酸钙

C：依降钙素

D：阿法骨化醇

答案：D

45.（2019年真题）长期使用可能导致血钾升高的降压药物是（）

A：氨氯地平

B：贝那普利

C：美托洛尔

D：硝普钠

答案：B

46.属于胆碱酯酶抑制药的是

A：金刚烷胺

B：司来吉兰

C：石杉碱甲

D：溴隐亭

答案：C

47.以下所列药物中，能促进小肠对维生素D的吸收是

A: 雌激素
B: 硫糖铝
C: 矿物油
D: 考来烯胺
答案：A

48.尼尔雌醇属于
A: 孕激素
B: 糖皮质激素
C: 雌激素
D: 雄激素
答案：C

49.不宜与三环类抗抑郁药合用
A: 酚甘油滴耳液
B: 赛洛唑啉
C: 羟甲唑啉
D: 麻黄碱
答案：D

50.患者，男，62岁。高血压病史10年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压162/80mmHg，心率72次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙D。
A: 双氯芬酸
B: 氨基葡萄糖
C: 碳酸钙D
D: 辛伐他汀

答案：A

51.可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是()

A：头孢米诺

B：头孢唑林

C：头孢他啶

D：头孢呋辛

答案：C

52.（2015年真题）患者，女，45岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是（）。

A：格列齐特

B：雷尼替丁

C：硝苯地平

D：双氯芬酸

答案：D

53.静脉溶栓首选的药物是

A：维生素K

B：达比加群酯

C：重组人促红素

D：阿替普酶

答案：D

54.肾上腺皮质功能不全采用

A：糖皮质激素替代疗法

B：抗结核药与糖皮质激素合用

C: 抗菌药物与糖皮质激素合用

D: 早期、大剂量、短期应用糖皮质激素

答案：A

55.关于 α 葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

A: 临床用于各型糖尿病

B: 可单用于老年患者或餐后高血糖患者

C: 易导致低血糖

D: 口服吸收很少

答案：C

56.属于超短效胰岛素/胰岛素类似物的是

A: 普通胰岛素

B: 精蛋白锌胰岛素

C: 门冬胰岛素

D: 甘精胰岛素

答案：C

57.须用专属性极强的解毒剂右雷佐生保护心肌的药物是

A: 环磷酰胺

B: 多柔比星

C: 曲妥珠单抗

D: 吉非替尼

答案：B

58.葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

A: 低钾血症

B: 低钠血症

C：高钾血症

D：高钠血症

答案：C

59.为强心苷中极性最低，且口服可完全吸收的药物是()

A：毛花苷丙

B：去乙酰毛花苷丙

C：洋地黄毒苷

D：地高辛

答案：C

60.（2016年真题）患者，女，26岁，妊娠3个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

A：阿莫西林

B：头孢氨苄

C：左氧氟沙星

D：青霉素G

答案：C

61.关于庆大霉素使用的叙述，错误的是

A：避免该药耳部滴用

B：应定期检查尿常规、血尿素氮、血肌酐，注意患者听力变化或听力损害先兆

C：与第一代注射用头孢菌素类合用时可能加重肾毒性

D：可静脉快速推注或静脉滴注给药

答案：D

62.过量引起严重心脏毒性的是

A: 哌唑嗪

B: 卡托普利

C: 地高辛

D: 氨氯地平

答案：C

63.烟酸缺乏时发生

A: 脚气病

B: 夜盲症

C: 成人佝偻病

D: 糙皮病

答案：D

64.患者男性，29岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压85/60mmHg，脉率110次/分。

A: 吸氧，给予普萘洛尔

B: 减少药物剂量

C: 给予肾上腺素

D: 给予糖皮质激素

答案：C

65.（2021年真题）用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是（）

A: 毛果芸香碱滴眼液

B: 硫酸阿托品眼用凝胶

C: 雷珠单抗注射液

D: 聚乙二醇滴眼液

答案：B

66.（2017年真题）可用于治疗重度痤疮,但妊娠期妇女避免使用的药物是（）

A：克拉霉素

B：特比萘芬

C：克罗米通

D：异维A酸

答案：D

67.可加速毒物排泄的药物是

A：呋塞米

B：氨苯蝶啶

C：乙酰唑胺

D：氢氯噻嗪

答案：A

68.使用多塞平治疗无效时可换用的抗抑郁药是

A：丙米嗪

B：氯米帕明

C：吗氯贝胺

D：阿米替林

答案：C

69.妊娠期妇女合8岁以下儿童禁用的抗生素是

A：头孢菌素类

B：大环内酯类

C：青霉素类

D：四环素类

答案：D

70.用于治疗焦虑、镇静、催眠、惊厥症、肌紧张性头痛的药物是

A：唑吡坦

B：卡马西平

C：苯巴比妥

D：地西泮

答案：D

71.可抑制鲨烯环氧酶的活性，属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是

A：制霉菌素

B：阿莫罗芬

C：联苯卡唑

D：特比萘芬

答案：D

72.通过保护胃黏膜起到到抗消化性溃疡目的的药物是

A：奥美拉唑

B：西咪替丁

C：碳酸钙

D：硫糖铝

答案：D

73.抗利尿作用最明显的阿片类镇痛药物是

A：苯巴比妥

B：吗啡

C：地西泮

D：苯妥英钠

答案：B

74.长期大量服用维生素B6会出现

A：视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

B：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

C：严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

D：疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：C

75.血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)应避免与其联合应用的是()

A：留钾利尿药

B：人促红素

C：β受体阻断药

D：噻嗪类利尿药

答案：A

76.高血压合并冠心病不宜选用()

A：普萘洛尔

B：肼屈嗪

C：氢氯噻嗪

D：胍乙啶

答案：D

77.（2019年真题）与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是（）

A：葡醛内酯

B：还原型谷胱甘肽

C：甘草酸二铵

D：多烯磷脂酸胆碱

答案：B

78.（2020年真题）可引起心脏Q-T间期延长的药物是

A：克林霉素

B：左氧氟沙星

C：头孢呋辛

D：磺胺甲噁唑

答案：B

79.作用机制是抑制纯化的HIV-1和HIV-2蛋白酶，与蛋白酶的活性部位直接结合，是蛋白酶的竞争性抑制剂，这种竞争性结合阻碍了病毒颗粒成熟过程中病毒前体多蛋白的裂解过程，由此产生的不成熟的病毒颗粒不具有感染性，无法建立新一轮感染，该类药物是

A：蛋白酶抑制药

B：核苷类反转录酶抑制药

C：整合酶抑制剂

D：非核苷类反转录酶抑制药

答案：A

80.长期大量应用可致视神经炎、视力下降、视野缩小，出现盲点的是

A：异烟肼

B：利福平

C：乙胺丁醇

D：链霉素

答案：C

81.伴有炎性肠病、溃疡、胃肠道梗阻和腹部手术史的糖尿病患者,不宜使用的降糖药物是（）

A：比格列

B：阿卡波糖

C：二甲双胍

D：格列美脲

答案：B

82.下列关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述，错误的是

A：对癌细胞和正常体细胞都有“杀灭”作用

B：静脉滴注可致患者发生过敏样反应或其他超敏反应

C：优点是选择性“杀灭”，就是只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害

D：贝伐单抗作用机制较为特殊，作用于血管内皮生长因子

答案：A

83.特布他林的平喘作用维持时间是

A：3~5分钟

B：10~20分钟

C：10~12小时

D：4~6小时

答案：D

84.（2020年真题）口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

A：喷昔洛韦

B：伐昔洛韦

C：泛昔洛韦

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/098113040042007022