

2024 甘肃省康乐县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题内部题库及参考答案（培优 B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗痤疮时，正确的用法是
- A: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用？
 - B: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶？
 - C: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用？
 - D: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏？

答案：B

2. 左心衰竭最早出现的症状是
- A: 端坐呼吸
 - B: 夜间阵发性呼吸困难
 - C: 劳力性呼吸困难
 - D: 粉红色泡沫样痰

答案：C

3. 患者男，73 岁，胃溃疡病史 2 年，半年前出现静止性震颤搓丸样运动迟缓，面具脸，慌张步态该患者应使用的药物是（）
- A: 多巴丝肼（苄丝肼左旋多巴）
 - B: 甲基多巴
 - C: 多奈哌齐
 - D: 司来吉兰

答案：A

4. 联合用药可使异烟肼失去抗菌作用的中成药

- A: 昆布片（碘）
- B: 蛇胆川贝液（苦杏仁苷）
- C: 丹参片（丹参酮）
- D: 香连片（黄连）

答案：A

5. （2015 年真题）下列关于肾功能不全患者给药方案调整的方法，错误的是（）。

- A: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或给减少给药剂量
- B: 肾功能不全者首选肝胆代谢和排泄的药物
- C: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠来碱化尿液，以促进药物排泄，防止药源性疾病
- D: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用双通道（肝肾）消除的药物

答案：C

6. 乙醇、对乙酰氨基酚等血浆药物浓度升高，地西泮、利多卡因分布容积增大、消除缓慢，是由于

- A: 胆汁分泌缺乏
- B: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低
- C: 肾功能随年龄增长而减退
- D: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长

答案：B

7. 患者，男，56 岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg（+），HBV-DNA ≥ 20000 IU/ml。ALT200U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素 α 和核苷（酸）类抗病毒药物。

- A: 血小板计数 $<100 \times 10^9$ /L，应减量
- B: 中性粒细胞计数 $\leq 0.75 \times 10^9$ /L，应减量
- C: 出现体温升高、肌肉酸痛可服用对乙酰氨基酚
- D: 中性粒细胞计数 $<0.5 \times 10^9$ /L，应停药

答案：A

8. 解救氰化物中毒的是

- A: 二巯丁二钠
- B: 亚硝酸异戊酯
- C: 盐酸戊乙奎醚
- D: 单价抗毒血清

答案：B

9. 一般不会出现中性粒细胞增多的中毒事例是

- A: 铅中毒
- B: 催眠药中毒
- C: 乙醇中毒
- D: 汞中毒

答案：C

10. 用于氰化物中毒解救的药物是

- A: 阿托品
- B: 碘解磷定
- C: 毛果芸香碱
- D: 亚甲蓝

答案：D

11. (2015 年真题) 过敏性疾病患者可出现 ()。

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 血小板增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 红细胞/血红蛋白减少

答案：A

12. 常用缓泻药的作用机制不包括

- A: 容积性
- B: 润湿性
- C: 膨胀性
- D: 刺激性

答案：B

13. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用法与用量为

- A: 0.5gtid
- B: 0.5gqd
- C: 0.1gtid
- D: 0.2gqd

答案：D

14. (2019 年真题) 餐后服用可以增加吸收的药物是

- A: 维生素 B2 片
- B: 头孢拉定胶囊
- C: 磷酸铝凝胶

D: 左甲状腺素钠片

答案: A

15. 宜睡前应用，用药后 1~2 小时不应排尿的是

A: 舌下片

B: 咀嚼片

C: 含漱剂

D: 阴道栓剂

答案: D

16. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，HR108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 西地兰？

B: 普萘洛尔？

C: 胺碘酮？

D: 普罗帕酮？

答案: A

17. 吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

A: 呋塞米

B: 胰岛素

C: 氯丙嗪

D: 西咪替丁

答案: A

18. 患儿，男，5 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 维生素 A
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 D
- D: 维生素 C

答案：C

19. 饮食对粪外观的影响,食绿叶菜

- A: 酱色
- B: 黑褐色
- C: 红色
- D: 暗绿色

答案：D

20. (2019 年真题) 患者，男，65 岁，因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院，诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 氨溴索
- C: 羧甲司坦
- D: 右美沙芬

答案：D

21. 用药后可出现非痛风性多关节痛的抗结核药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平

C: 吡嗪酰胺

D: 链霉素

答案：C

22. 防心绞痛药物

A: 甘草合剂

B: 去氨加压素

C: 胃黏膜保护剂

D: 硝酸甘油

答案：D

23. 对局部发生水疱和糜烂者可选用

A: 10%氧化锌软膏

B: 溃疡膏

C: 赛庚啶

D: 10%樟脑软膏

答案：A

24. 与环丙沙星有相互作用，合并使用时应做血药浓度监测的药物是

A: 异丙托溴铵气雾剂

B: 茶碱片

C: 孟鲁司特钠咀嚼片

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：B

25. 可导致手、足、脸以及内部器官不正常发育的兴奋剂是

A: 精神刺激剂

B: 蛋白同化激素

C: B 受体阻断剂

D: 人生长激素

答案: D

26. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的兴奋剂是

A: 普萘洛尔

B: 可卡因

C: 人生长激素

D: 麻黄碱

答案: D

27. 分解尿酸成为可溶性产物，可诱发抗体生成而使疗效下降，尤其适用于放疗或化疗所致的高尿酸血症的药物是

A: 枸橼酸氢钾钠

B: 拉布立酶

C: 苯溴马隆

D: 非布司他

答案: B

28. 属于 COMT 抑制剂的是

A: 司来吉兰

B: 苯海索

C: 普拉克索

D: 恩托卡朋

答案: D

29. 某患者，诊断为抑郁症，服用帕罗西汀 6 周，无明显效果，现考虑更换 MAOIs 类药物，必须先停用帕罗西汀

A: 2 周

B: 3 天

C: 1 周

D: 5 天

答案：A

30. 应用铁剂的影响因素预防铁负荷过重，表现为铁的吸收与体内储存量有关，缺铁性贫血者的吸收率为

A: 10%~20%

B: 0.3

C: 10%~30%

D: 0.4

答案：B

31. 餐前 30min 服用的药物是

A: 复方氢氧化铝

B: 奥美拉唑

C: 阿托伐他汀

D: 伊托必利

答案：A

32. 高血压合并心力衰竭不宜用下哪种药物

A: 氢氯噻嗪

B: 卡托普利

C: 普萘洛尔

D: 哌唑嗪

答案：C

33. 促使儿茶酚胺释放，减少药物吸收

- A: 地西洋
- B: 胰岛素
- C: 氨茶碱
- D: 呋塞米

答案：B

34. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

- A: 蔗糖
- B: 葡萄糖
- C: 馒头
- D: 无糖饼干

答案：B

35. 横纹肌溶解症是下列哪种降脂药的不良反应

- A: 烟酸及衍生物
- B: ACE I 类
- C: HMG-CoA 还原酶抑制剂
- D: 弹性酶

答案：C

36. 可在尿中结晶，送服药物时要喝约 250ml 水，服药后也要多喝水，保持高尿流量的药物是

- A: 卡马西平
- B: 左氧氟沙星

C: 头孢哌酮

D: 特拉唑嗪

答案: B

37. 长期服用可引起男性性功能障碍的药物是

A: 奥美拉唑

B: 非布司他

C: 甲硝唑

D: 西咪替丁

答案: D

38. 可促进肾小管对钠的重吸收，从而造成水钠潴留，易引起药源性高血压的药物是

A: 阿司匹林

B: 地塞米松

C: 重组人促红细胞生成素

D: 麻黄碱

答案: B

39. 自我药疗时，初治滴虫性阴道炎，每日口服甲硝唑 800mg 连续用药时间为

A: 5 天

B: 3 天

C: 7 天

D: 1 天

答案: C

40. 容易引湿的药物是

- A: 牛痘菌苗
- B: 阿扑吗啡
- C: 胃蛋白酶
- D: 青霉素类

答案：C

41. 患者女.80 岁高血压病史 28 年近日自觉憋气昨夜出现呼吸困难,不能平躺喘憋咳粉红色泡沫样痰诊断为心力衰竭应选用的药物是 ()

- A: 硝酸异山梨酯
- B: 胺碘酮
- C: 氟桂利嗪
- D: 呋塞米

答案：D

42. 患者，女，63 岁，因“突发左上肢麻木，伴头晕 2 小时”入院，诊断为缺血性脑卒中，患者既往有高血压病史 20 年，可选用哪种药物进行溶栓治疗

- A: 阿司匹林
- B: 巴曲酶
- C: 阿替普酶
- D: 华法林

答案：C

43. 适宜餐中服用的是

- A: 奥利司他
- B: 多潘立酮
- C: 吲哚美辛
- D: 氟伐他汀

答案：A

44. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的是()

- A: 叶酸
- B: 克拉维酸钾
- C: 奥美拉唑
- D: 苜丝肝

答案：C

45. 高血压病的治疗原则低危患者（）

- A: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗
- B: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗
- C: 立即进行抢救治疗
- D: 立即使用抗高血压药物

答案：A

46. 降纤治疗

- A: 低分子肝素
- B: 阿替普酶
- C: 阿司匹林
- D: 巴曲酶

答案：D

47. 处方是医疗机构的重要医疗文书，具有

- A: 技术性、有效性和经济性
- B: 技术性、经济性和合法性
- C: 法律性、技术性和经济性
- D: 经济性、法律性和合理性

答案：C

48. 患儿男，2 岁，误服水银后应选用的洗胃液是（）

A: 1:5000 高锰酸钾溶液

B: 淀粉溶液

C: 鸡蛋清

D: 牛奶与水等量混合

答案：C

49. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

A: 急性肾盂肾炎

B: 急迫性尿失禁

C: 膀胱炎

D: 压力性尿失禁

答案：A

50. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 肺炎链球菌

B: 支原体

C: 铜绿假单胞菌

D: 衣原体

答案：C

51. (2019 年真题) 患者，男，28 岁，外出进餐后出现腹泻，一日 6 次，水样便，无发热和腹痛症状。宜选用的药物是

- A: 奥美拉唑肠溶胶囊
- B: 复方阿嗪米特肠溶片
- C: 干酵母片
- D: 蒙脱石散

答案：D

52. 抗高血压药物属于利尿剂的是 ()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氨氯地平
- C: 依那普利
- D: 缬沙坦

答案：A

53. 静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是

- A: 6 小时以上
- B: 4 小时以上
- C: 1 小时以上
- D: 2 小时以上

答案：D

54. 偶可引起接触性皮炎

- A: 地塞米松粘贴片
- B: 氯己定
- C: 甲硝唑含漱制剂
- D: 硼酸甘油

答案：B

55. 高血压首选的利尿剂是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

56. 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐

- A: 妇女绝经后骨质疏松
- B: 老年性骨质疏松
- C: 原发性骨质疏松
- D: 抗癫痫药所致的骨质疏松

答案：B

57. 青蒿素与乙胺嘧啶联用增效的机制是

- A: 作用于不同的靶点
- B: 促进机体的利用
- C: 竞争性拮抗作用
- D: 延缓或降低抗药性

答案：D

58. 既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

- A: 丙咪嗪
- B: 氟伏沙明
- C: 阿米替林
- D: 帕罗西汀

答案：B

59. 振奋精神增加供氧能力的兴奋剂是

- A: 苯丙胺
- B: 阿托品
- C: 甲睾酮
- D: 呋塞米

答案：A

60. 可作为急性胰腺炎的症状指标是

- A: 血清淀粉酶降低？
- B: 磷酸激酶降低？
- C: 血清淀粉酶升高？
- D: 磷酸激酶升高？

答案：C

61. 半衰期 150-200h，属于长效磺胺类药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 替硝唑
- C: 磺胺多辛
- D: 磺胺甲噁唑

答案：C

62. #NAME?

- A: #NAME?
- B: #NAME?
- C: #NAME?
- D: #NAME?

答案：D

63. 吩噻嗪类抗精神病药中毒出现

- A: 谵妄、躁狂、幻觉
- B: 心血管毒性
- C: 肌肉震颤、抽搐
- D: 明显的锥体外系症状

答案：D

64. 阿莫西林片的适宜服药时间是

- A: 餐后
- B: 餐前
- C: 清晨
- D: 餐中

答案：B

65. 甲状腺危象应选用的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 胰岛素
- C: 格列本脲
- D: 大剂量碘剂

答案：D

66. (2019 年真题) 患者，男，25 岁，有癫痫病史 2 年，一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦，癫痫控制良好，近期因社区获得性肺炎入院。

下列药物中最可能影响患者基础疾病控制的是

- A: 头孢曲松
- B: 莫西沙星

C: 阿奇霉素

D: 阿莫西林

答案: B

67. (2015 年真题) 易经乳汁分泌的药物的特征是 ()。

A: 蛋白结合率高

B: 分子量小

C: 脂溶性大

D: 弱酸性

答案: C

68. (2021 年真题) 头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合, 可导致 ()

A: 溶液变色

B: 产生气体

C: 微浑浊或沉淀

D: 产生胶状不溶物

答案: C

69. 能用结论较肯定的药物就不用新药, 即

A: 禁止用试验性药

B: 用药必须有明确的指征和适应证

C: 选用对胎儿危害较小的药物

D: 可用可不用的药物应尽量不用或少用

答案: A

70. 患者, 男, 58 岁, 患有高胆固醇血症, 长期服用辛伐他汀 40mgqd。患者用药期间应定期监测的生化指标是

A: AIT

B: BUN

C: Hb

D: RBC

答案：A

71. 可引起血清尿素氮降低的是

A: 急性胰腺炎

B: 胃溃疡

C: 肾衰竭

D: 严重肝病

答案：D

72. 可以与多种金属离子结合发生沉淀，影响药物吸收的是

A: 食盐中的氯化钠

B: 食醋中的醋酸

C: 酒中的乙醇

D: 茶叶中的鞣酸

答案：D

73. 转复并维持窦性心律

A: 华法林

B: 血凝酶

C: 硝苯地平

D: 多非利特

答案：D

74. 处方中“溶液”的规范书写是

- A: Liq
- B: Dil
- C: Dos
- D: Mist

答案：A

75. 患者，男性，45 岁，无痛性肉眼血尿 6 个月来诊，患者于 6 个月前无意中发现排尿全程尿色发深，呈酱油色，无腰痛，尿频，排尿困难，排尿后尿不尽，结合尿常规检查，诊断为良性前列腺增生。

- A: 奥昔布宁
- B: 非那雄胺
- C: 坦索罗辛
- D: 特拉唑嗪

答案：B

76. 病毒神经氨酸酶抑制剂（扎那米韦、奥司他韦）使用的最佳时间是

- A: 在流感症状严重 24 小时内
- B: 在流感症状初始 48 小时内
- C: 在流感症状严重时
- D: 在流感症状初始时

答案：B

77. 解救急性乙醇中毒的是（）

- A: 纳洛酮
- B: 二巯丁二钠
- C: 双复磷
- D: 亚硝酸钠

答案：A

78. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,依那普利的妊娠毒性分级是()

A: X 级

B: A 级

C: D 级

D: C 级

答案: C

79. 脂质体药物属于

A: E 级高危药品

B: D 级高危药品

C: B 级高危药品

D: C 级高危药品

答案: D

80. 热应激时液体丢失所致的以有效循环血容量不足为特征的临床综合征是

A: 热衰竭

B: 热射病

C: 热痉挛

D: 休克

答案: A

81. 急性化脓性中耳炎局部治疗,鼓膜穿孔后可使用

A: 3%过氧化氢溶液

B: 2%酚甘油滴耳液

C: 2%过氧化氢溶液

D: 3%酚甘油滴耳液

答案：A

82. 中枢性降压药是

A: 胍苯哒嗪

B: 利血平

C: 拉贝洛尔

D: 可乐定

答案：D

83. 出血是肝素最常见的不良反应，对明显出血者选用的特异性拮抗药是

A: 鱼精蛋白

B: 烯丙吗啡

C: 氟马西尼

D: 地塞米松

答案：A

84. 妊娠后期长期使用，可导致胎儿严重出血，甚至死胎的药物是

A: 叶酸拮抗剂

B: 雌孕激素、雄激素

C: 阿司匹林

D: 沙利度胺

答案：C

85. 女性红细胞沉降率的正常范围值

A: 0~5mm/h

B: 0~20mm/h

C: 0~10mm/h

D: 0~15mm/h

答案: B

86. 饭后半小时服用的药物是 ()

A: 枸橼酸铋钾

B: 吉法酯

C: 雷贝拉唑

D: 瑞巴派特

答案: B

87. 属于容积性泻药的药物是

A: 硫酸镁

B: 乳果糖

C: 比沙可啶

D: 甘油栓

答案: A

88. 急性细菌性扁桃体炎患者常表现为 ()

A: 红细胞增多

B: 血红蛋白减少

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 中性粒细胞增多

答案: D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/105141343114012033>