

## 2024 甘肃省庄浪县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题王牌题库（B 卷）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，46 岁。肝硬化腹水患者，长期使用噻嗪类利尿药不会引起

- A: 低钾血症
- B: 高尿酸血症
- C: 低钙血症
- D: 低氯性碱中毒

**答案：C**

2. （2019 年真题）服用异烟肼进行抗结核治疗的患者，为预防周围神经炎，应补充的维生素是（）

- A: 维生素 B2
- B: 维生素 B6
- C: 维生素 A
- D: 维生素

**答案：B**

3. 下列不可用于治疗前列腺增生的是

- A: 特拉唑嗪
- B: 西地那非
- C: 非那雄胺
- D: 坦洛新

**答案：B**

4. 下列不属于治疗前列腺增生的药物是

- A: 西地那非
- B: 非那雄胺
- C: 坦洛新
- D: 特拉唑嗪

**答案：A**

5. 对大多数肠杆菌科细菌和厌氧菌有活性，但对铜绿假单胞菌、不动杆菌及革兰阳性菌（尤其是肠球菌和耐青霉素肺炎球菌）的活性不及其他碳青霉烯类药物的是

- A: 西司他丁
- B: 亚胺培南
- C: 厄他培南
- D: 美罗培南

**答案：C**

6. （2016 年真题）会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性（感觉障碍、痉挛）的行为是

- A: 冷水浴
- B: 日光浴
- C: 接触塑料制品
- D: 饮用热饮

**答案：A**

7. 由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别神经毒性较严重的是

- A: 亚叶酸钙

- B: 卡铂
- C: 顺铂
- D: 奥沙利铂

**答案: D**

8. 慢性肾上腺皮质功能减退症宜用

- A: 地塞米松
- B: 氢化可的松
- C: 倍他米松
- D: 泼尼松

**答案: B**

9. 重症肌无力、癫痫患者避免使用的抗菌药是

- A: 甲硝唑
- B: 左氧氟沙星
- C: 哌拉西林
- D: 米诺环素

**答案: B**

10. 以下使用雌激素类药物的方法错误的是

- A: 女性子宫切除后患者采用周期性治疗，即用药 3 周后停药 1 周
- B: 男性患者采用周期性治疗。即用药 3 周后停药 1 周
- C: 有子宫的女性在周期的最后 5~7 日加用孕激素
- D: 应用最低有效量，时间尽可能缩短，以减少可能发生的不良反应

**答案: C**

11. 抑制 DNA 回旋酶，使 DNA 复制受阻，导致 DNA 降解而细菌死亡的药物是

- A: 甲氧苄啶
- B: 红霉素
- C: 利福平
- D: 诺氟沙星

**答案：D**

12. (2018 年真题) 不易发生“双硫仑样”反应的药物是 ( )

- A: 头孢替安
- B: 头孢他啶
- C: 头孢曲松
- D: 头孢哌酮

**答案：B**

13. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞剂药物的是 ( )。

- A: 维拉帕米
- B: 氨氯地平
- C: 尼莫地平
- D: 硝苯地平

**答案：A**

14. 下述哪种疾病不适合外用糖皮质激素治疗

- A: 未根治的体股癣
- B: 异位性皮炎
- C: 固定性药疹
- D: 钱币状湿疹

**答案：A**

15. (2016 年真题) 某些慢性疾病使用泼尼松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐的给药时间是

- A: 上午 8 时左右
- B: 晚餐前
- C: 下午 4 时左右
- D: 中午 12 时左右

**答案：A**

16. 地高辛与其合用，可使血清地高辛浓度增加 70%~100% 的药物是

- A: 沙库巴曲缬沙坦
- B: 阿托品
- C: 阿利吉仑
- D: 胺碘酮

**答案：D**

17. 肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

- A: 阿司匹林
- B: 哌替啶
- C: 布桂嗪
- D: 可待因

**答案：B**

18. 抗菌活性强，并对  $\beta$ -内酰胺酶高度稳定，属于碳青霉烯类的抗菌药物是()。

- A: 头孢吡肟
- B: 亚胺培南
- C: 头孢美唑
- D: 氨曲南

**答案：B**

19. 长期服用呋塞米易发生的不良反应是（）

- A: 低钾血症
- B: 高氯血症
- C: 高钠血症
- D: 低尿酸血症

**答案：A**

20. 铁剂用于治疗

- A: 小细胞低血红蛋白性贫血
- B: 巨幼红细胞性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 溶血性贫血

**答案：A**

21. （2019 年真题）长期使用可能导致血钾升高的降压药物是（）

- A: 贝那普利
- B: 氨氯地平
- C: 美托洛尔
- D: 硝普钠

**答案：A**

22. 关于阿司匹林在心血管疾病治疗中的作用描述，错误的是

- A: 可抑制血小板聚集
- B: 抑制血管损伤后内膜增生
- C: 调节血脂
- D: 抑制细胞因子的合成

**答案：C**

23. 对短动作电位时程的心房肌无效，仅用于室性心律失常的是()

- A: 普萘洛尔
- B: 利卡多因
- C: 维拉帕米
- D: 奎尼丁

**答案：B**

24. 下列有关口服伪麻黄碱的描述，错误的是

- A: 兴奋肾上腺能  $\alpha$  受体，使鼻腔黏膜血管收缩
- B: 不宜与中枢神经系统抑制药、抗精神病药合用
- C: 属处方类鼻黏膜肿胀治疗药物
- D: 用药期间不宜饮酒

**答案：C**

25. 氯霉素的下述不良反应中，哪项是与剂量和疗程无关的严重反应

- A: 可逆的各类血细胞减少
- B: 不可逆的再生障碍性贫血
- C: 灰婴综合征
- D: 二重感染

**答案：B**

26. 服用叶酸治疗巨幼细胞贫血，需同时联合使用的药品是()

- A: 维生素 B1
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 B12

**答案：D**

27. 伴有（）的患者在应用 ACEI 首剂治疗时可能出现严重低血压

A: 低钠血症

B: 干咳

C: 脑水肿

D: 蛋白尿

**答案：A**

28. （2018 年真题）镇痛药的合理用药原则，不包括（）

A: “按时”给药，而不是“按需”给药

B: 用药剂量个体化，根据患者需要由小剂量开始逐渐加大剂量

C: 尽可能选口服给药

D: 按阶梯给药，对于轻度疼痛者首选弱阿片类药物

**答案：D**

29. 属于容积性泻药的是（）

A: 欧车前

B: 多库酯钠

C: 利那洛肽

D: 番泻叶

**答案：A**

30. 属于 PD-1 抑制剂，用于食管癌的二线治疗的抗肿瘤药是（）

A: 纳武利尤单抗

B: 环磷酰胺

C: 巯嘌呤

D: 氟尿嘧啶



**答案：A**

31. 下列哪类药物属于快速杀菌药()

- A: 多黏菌素 B
- B: 红霉素
- C: 氨基糖苷类
- D: 氯霉素类

**答案：C**

32. 硝酸酯类药发挥抗心绞痛作用时，体内参与的物质不包括

- A:  $\beta$  受体
- B: 钙离子
- C: cGMP 依赖性蛋白激酶
- D: 谷胱甘肽转移酶

**答案：A**

33. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60 / 40mmHg，血红蛋白 120g / L，白细胞  $12 \times 10^9$  / L，血小板  $30 \times 10^9$  / L，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒(正常值 13 秒)，骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 K1
- C: 维生素 C
- D: 低分子肝素

**答案：A**

34. 患者，女，49 岁。身高 164cm，体重 55kg，因更年期月经不调，经药物治疗效果不佳，而行“子宫切除术”。无药物过敏史。

- A: 替考拉宁
- B: 克拉霉素
- C: 米诺环素
- D: 拉氧头孢

**答案：D**

35. 铁剂用于治疗

- A: 小细胞低血红蛋白性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 巨幼细胞贫血

**答案：A**

36. 以下 PPI 中，主要代谢酶是 CYP3A4 的是

- A: 泮托拉唑
- B: 雷贝拉唑
- C: 兰索拉唑
- D: 奥美拉唑

**答案：C**

37. 非选择性 NSAID 可引起胃黏膜损伤的原因是

- A: 抑制 COX-2
- B: 抑制 AC
- C: 阻滞 ARB
- D: 抑制 COX-1

**答案：D**

38. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 链霉素引起的神经肌肉阻滞作用
- B: 链霉素引起的肾毒性
- C: 链霉素引起的过敏性休克
- D: 链霉素引起的神经毒性

**答案：C**

39. （2015 年真题）在痛风发作的急性期，应当首选的抗痛风药是（ ）。

- A: 别嘌醇
- B: 二氟尼柳
- C: 秋水仙碱
- D: 苯溴马隆

**答案：C**

40. （ ）与利福平合用时，在用利福平前和疗程中不需调整剂量

- A: 地高辛
- B: 氨茶碱
- C: 糖皮质激素
- D: 氯霉素

**答案：A**

41. （2017 年真题）属于抗雄性激素的肿瘤药是（ ）

- A: 他莫昔芬
- B: 阿那曲唑

C: 炔雌醇

D: 氟他胺

**答案: D**

42. 与多柔比星合用或配伍与多柔比星合用或配伍

A: 利福平

B: 阿糖胞苷

C:  $\beta$  受体阻断剂

D: 甲氨蝶呤

**答案: B**

43. 常用的外用痤疮治疗药不包括

A: 阿达帕林

B: 特比萘芬

C: 过氧苯甲酰

D: 维 A 酸

**答案: B**

44. 下列关于蛇毒血凝酶的给药途径，错误的是

A: 皮下注射

B: 口服给药

C: 静脉注射

D: 肌肉注射

**答案: B**

45. 地西泮用于

A: 神经源性尿崩症

B: 慢性脑功能不全

C: 早期帕金森病

D: 特发性震颤

**答案: D**

46. (2020 年真题) 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素 (NA) 再摄取, 增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A: 度洛西汀

B: 吗氯贝胺

C: 阿米替林

D: 舍曲林

**答案: A**

47. 用硝基咪唑类药物后出现神经系统反应的是

A: 有活动性中枢神经系统疾病者

B: 妊娠期妇女

C: 新生儿

D: 老人

**答案: A**

48. 硫酸亚铁的适应症是

A: 恶性贫血

B: 缺铁性贫血

C: 巨幼细胞贫血

D: 产后大出血

**答案: B**

49. 红霉素的作用机制是

- A: 与核蛋白 50s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- B: 与核蛋白 70s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- C: 与核蛋白 30s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- D: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程

**答案：A**

50. 对四环素不敏感的病原体是()

- A: 肺炎衣原体
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 螺旋体
- D: 肺炎支原体

**答案：B**

51. 患者，男，45 岁，因"咳嗽、咳痰 1 周，发热 2 天"入院，诊断为社区获得性肺炎，两次痰培养为金黄色葡萄球菌(MRSA)，适合选用的是

- A: 阿莫西林
- B: 万古霉素
- C: 双氯西林
- D: 苄星青霉素

**答案：B**

52. 以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

- A: 后马托品
- B: 东莨菪碱
- C: 新福林
- D: 阿托品

**答案：C**

53. 螺内酯利尿的作用机制是

- A: 抑制  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ - $2\text{Cl}^-$  转运系统
- B: 抑制  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ - $2\text{Cl}^-$  同向转运系统
- C: 拮抗醛固酮
- D: 抑制碳酸酐酶

**答案: C**

54. 防治新生儿出血症应选用

- A: 垂体后叶素
- B: 氨甲环酸
- C: 维生素
- D: 维生素 K

**答案: D**

55. 抑制二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 青霉素
- B: 磺胺甲
- C: 甲氧苄啶
- D: 红霉素

**答案: B**

56. 以下关于 5 型磷酸二酯酶抑制剂的描述，正确的是

- A: 主要经过肾脏代谢
- B: 代谢产物不具有活性
- C: 口服后生物利用度较高
- D: 口服吸收迅速

**答案: D**

57. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向选用

- A: 低分子肝素
- B: 氨甲环酸
- C: 维生素 K
- D: 尿激酶

**答案：C**

58. (2020 年真题) 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

- A: 长春新碱
- B: 环磷酰胺
- C: 甲氨蝶呤
- D: 曲妥珠单抗

**答案：A**

59. 患者，男性，55 岁。每年冬春季常有哮喘发作，近日来上呼吸道感染，咳嗽加哮喘，门诊测血压亦升高，治疗方案：给予抗感染及平喘治疗外，尚考虑给予降压药，其中欲选择一种  $\beta$  肾上腺素受体阻断药，应选用

- A: 吲哚洛尔
- B: 纳多洛尔
- C: 美托洛尔
- D: 普萘洛尔

**答案：C**

60. (2019 年真题) 与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是 ( )

- A: 甘草酸二铵



- B: 多烯磷脂酸胆碱
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 葡醛内酯

**答案: C**

61. 引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于 5 岁以下儿童的药物是

- A: 奥布卡因
- B: 阿托品
- C: 20%甘露醇
- D: 羟苄唑

**答案: B**

62. 下列药物属于第四代头孢菌素的是

- A: 头孢呋辛
- B: 头孢氨苄
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢噻肟

**答案: C**

63. 克拉霉素与阿呋唑嗪合用，阿呋唑嗪的血药浓度水平显著升高，这是因为克拉霉素抑制

- A: 血浆蛋白
- B: UGT287
- C: CYP3A4
- D: p-糖蛋白

**答案: C**

64. 作用于  $\gamma$ -氨基丁酸受体的药物是

- A: 佐匹克隆
- B: 苯巴比妥
- C: 卡马西平
- D: 苯妥英钠

**答案：A**

65. 能抑制 T

- A: 甲巯咪唑
- B: 卡比马唑
- C: 甲硫氧嘧啶
- D: 丙硫氧嘧啶

**答案：D**

66. 精神紧张、情绪恐惧所致的失眠

- A: 夸西泮
- B: 氯美扎酮
- C: 谷维素
- D: 氟西泮

**答案：B**

67. 下列哪类药物属于繁殖期杀菌药()

- A: 氯霉素类
- B: 多黏菌素 B
- C: 青霉素类
- D: 磺胺类

**答案：C**

68. 短效糖皮质激素是

- A: 氢化可的松
- B: 甲泼尼龙
- C: 地塞米松
- D: 氟氢可的松

**答案：A**

69. 以降低三酰甘油为主要治疗目标时，首选的调血脂药是

- A: 瑞舒伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 辛伐他汀
- D: 依折麦布

**答案：B**

70. 用于防止排异反应、糖皮质激素不能长期缓解的多种自身免疫性疾病的是()

- A: 环磷酰胺
- B: 硫唑嘌呤
- C: 甲泼尼龙
- D: 环孢素

**答案：A**

71. 雌激素替代疗法应在绝经后几年之内开始

- A: 8
- B: 2
- C: 6
- D: 4

**答案：C**

72. (2018 年真题) 属于 M 胆碱受体阻断剂的平喘药是 ( )

- A: 茶碱
- B: 孟鲁司特
- C: 噻托溴铵
- D: 沙美特罗

**答案: C**

73. 属于第一代头孢菌素口服制剂的是 ( )。

- A: 头孢拉定
- B: 头孢吡肟
- C: 头孢克洛
- D: 头孢克肟

**答案: A**

74. 治疗各种类型的癫痫选用

- A: 布桂嗪
- B: 佐匹克隆
- C: 丙戊酸钠
- D: 多奈哌齐

**答案: C**

75. 能治疗强心苷中毒引起的异位心律的是

- A: 阿托品
- B: 利血平
- C: 哌替啶
- D: 苯妥英钠

**答案: D**

76. 喷托维林为中枢性镇咳药。

- A: 喷托维林
- B: 沙丁胺醇
- C: 噻托溴铵
- D: 氨溴索

**答案：A**

77. (2017 年真题) 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法, 错误的是 ( )

- A: 为控制的细菌或真菌感染不宜使用
- B: 可用于过敏性皮炎的治疗
- C: 若继发细菌或真菌感染, 可与抗菌药或抗真菌药联合使用
- D: 面部、阴部和皱褶部位的湿疹, 需长期使用强效制剂

**答案：D**

78. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 巯嘌呤
- C: 长春瑞滨
- D: 吉西他滨

**答案：B**

79. (2019 年真题) 患者, 女, 63 岁, 因心绞痛急诊就医, 诊断为 ST 段抬高心肌梗死, 血压 175/95mmHg, 心率 110 次/分, 该患者适宜使用的药物是 ( )

- A: 氨氯地平
- B: 贝那普利

C: 美托洛尔

D: 硝普钠

**答案: C**

80. (2020 年真题) 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

A: 更昔洛韦

B: 恩替卡韦

C: 金刚烷胺

D: 阿昔洛韦

**答案: B**

81. 关于茶碱给药途径叙述不正确的是

A: 灌肠吸收慢

B: 肌注有刺激性

C: 进餐时或餐后服药，吸收较慢

D: 空腹口服吸收快

**答案: A**

82. 抑制二氢叶酸还原酶的药物是()

A: 甲氧苄啶

B: 庆大霉素

C: 磺胺嘧啶

D: 克拉霉素

**答案: A**

83. 阿哌沙班属于

A: 直接凝血酶抑制剂

B: 促凝血因子合成药

C: 凝血因子 Xa 抑制剂

D: 维生素 K 拮抗剂

**答案：C**

84. 一般剂量长期疗法

A: 湿疹

B: 变态反应性疾病

C: 中毒性感染和休克

D: 顽固性支气管哮喘

**答案：D**

85. 与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是()

A: 三磷酸腺苷

B: 二磷酸果糖

C: 碳酸钙

D: 葡萄糖

**答案：D**

86. 进行透析的急、慢性。肾衰竭患者静脉滴注复方氨基酸注射液（9AA），滴速为

A: 滴速 80~100 滴 / 分

B: 不超过 15 滴 / 分

C: 滴速 20~30 滴 / 分

D: 不超过 40 滴 / 分

**答案：B**

87. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

A: G

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/105142002114012033>