

2024 年河北省滦县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题大全【突破训练】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 服用帕罗西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果欲更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停用（）

- A: 10 天
- B: 7 天
- C: 14 天
- D: 5 天

答案：C

2. 洗胃液 1:5000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

- A: 乐果中毒
- B: 巴比妥类中毒
- C: 1605 中毒
- D: 3911 中毒

答案：B

3. (用药与尿液检查异常)甲氨蝶呤可能引起

- A: 尿蛋白
- B: 尿液 pH 增高
- C: 尿胆红素
- D: 尿液隐血

答案：A

4. 高血压伴低钾血症患者慎用的药物是()

- A: 美托洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 依那普利
- D: 氨氯地平

答案: B

5. 失神发作首选

- A: 丙戊酸钠
- B: 卡马西平
- C: 苯妥英钠
- D: 拉莫三嗪

答案: A

6. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

- A: 巨幼细胞性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 再生障碍性贫血

答案: C

7. 急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂

- A: 谷胱甘肽
- B: 二巯丁二钠
- C: 乙酰半胱氨酸

D: 纳洛酮

答案：D

8. 硝苯地平的别名是

A: 心痛定

B: 心得安

C: 安痛定

D: 消心痛

答案：A

9. 规范处方行为与操作流程，归属于用药错误预防策略中的

A: 环境与流程的优化与持续改进

B: 科学发展

C: 人员培训

D: 管理规范到位

答案：D

10. 关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),对钝痛如牙痛、头痛、神经痛等有较好的镇痛效果的是

A: 推荐应用地西泮(安定)片

B: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啶、舒马曲坦、佐米曲坦

C: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素 B1

D: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等

答案：D

11. (2015 年真题) 易经乳汁分泌的药物的特征是 ()。

A: 蛋白结合率高

- B: 分子量大
- C: 弱酸性
- D: 脂溶性大

答案：D

12. 有强烈的血管收缩作用，输液过程中不慎渗出血管，可致组织坏死的药物是

- A: 多巴胺
- B: 维拉帕米
- C: 去乙酰毛花苷
- D: 米力农

答案：A

13. 患者，女，29 岁，孕 25+6 周，近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状。化验结果为 Hb71g / L。诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

- A: 快速静脉注射
- B: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量
- C: 口服，每次 5ml，一日 3 次
- D: 先少量缓慢静注，观察无过敏反应，1 小时后继续静脉注射余下剂量

答案：D

14. 以下临床联合用药中，药物相互作用主要影响药效学的是

- A: 维生素 C 与多潘立酮同服吸收减少
- B: 氢氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用
- C: 四环素同服硫酸亚铁降低疗效
- D: 昆布片同服异烟肼导致药效降低

答案：B

15. 服用 α 受体阻断剂后，如果服用西地那非，建议服药间隔时间应为

- A: 4 小时
- B: 1 周
- C: 48 小时
- D: 24 小时

答案：A

16. 患者，男，1 岁，近期出现乏力、下肢步态不稳、行走困难、嗜睡。经临床检查，各项血细胞均偏低；血涂片中可见多数大卵圆形的红细胞，中性粒细胞分叶过多，可见 5 叶或 6 叶以上的分叶，偶可见巨大血小板。确诊为巨幼细胞贫血，应给予的治疗药物是

- A: 促红细胞生成素注射剂
- B: 输入新鲜血浆
- C: 叶酸片、维生素 B12 片
- D: 硫酸亚铁片

答案：C

17. 关于胃黏膜保护剂胃舒平的服药方式，正确的是

- A: 餐后服用
- B: 餐前服用，充分咀嚼后咽下
- C: 宜多饮水，减轻刺激
- D: 直接吞咽

答案：B

18. 患者，女，60 岁，现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理；因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度已 L1~L4 椎体 T 值-2.7SD，BMD749(mg / cm²)；股骨颈 T 值-2.2SD，BMD602(mg / cm²)。医生诊断为：绝经后骨质疏松症。

- A: 妊娠期妇女禁用
- B: 绝经期超过 2 年以上的妇女可以应用
- C: 患有血栓栓塞性疾病者禁用
- D: 肝、肾功能不全者可应用

答案：D

19. 能提高运动员的呼吸功能，增加供氧能力，并能振奋精神的兴奋剂

- A: 利尿剂
- B: 精神刺激剂
- C: 蛋白同化激素
- D: β -受体阻断剂

答案：D

20. 因体内肝酶不足，易发生灰婴综合征

- A: 氯霉素
- B: 米诺环素
- C: 阿奇霉素
- D: 庆大霉素

答案：A

21. (孕妇用药注意事项) 孕妇使用可导致胎儿甲状腺功能低下的药品是

- A: 胰岛素
- B: 甲巯咪唑
- C: 氮芥类

D: 青霉素类

答案：B

22. 医师咨询"他汀类药物合用伊曲康唑或环丙沙星等"，属于

A: 新药信息

B: 禁忌证

C: 给药途径

D: 药物相互作用

答案：D

23. 肠外营养 1g 脂肪能提供的热量是

A: 4kcal

B: 9kcal

C: 3kcal

D: 7kcal

答案：B

24. 以下血浆脂质水平检查结果中，不能判断为高脂血症的是

A: 三酰甘油(TG)高于同年龄正常值

B: 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-ch)高于同年龄正常值

C: 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-ch)高于同年龄正常值

D: 总胆固醇(Tc)高于同年龄正常值

答案：A

25. 患儿，男，50 天，体重 5kg，时值夏季，体温 37.9℃，出现烦躁，哭闹不安，无其他症状。其家人到药店询问购买退热药，药师应推荐（
）

A: 减少衣被，可物理降温或必要时就诊

- B: 阿司匹林泡腾片（500mg）1/10 片，溶于少量温开水服用
C: 对乙酰基酚片（500mg）1/10 片，溶于少量温开水服用
D: 阿苯片，半片，研碎后溶于少量温开水服务

答案：A

26. 尤其适用于胸膜炎伴胸痛的干咳患者的药品是

- A: 羧甲司坦
B: 苯丙哌林
C: 可待因
D: 右美沙芬

答案：C

27. 蛋白酶抑制剂（）

- A: PIs
B: NRTIs
C: NNRTIs
D: FIs

答案：A

28. 助消化药不宜与抗菌药物、吸附剂同时服用；如必须联用，应间隔的时间是

- A: 2~3 小时
B: 0.5 小时
C: 1 小时
D: 1.5 小时

答案：A

29. 部分药品的中文药名容易混淆，药师在审核处方时应格外小心，防止处方出现用药错误。下列处方中符合适应证的是

- A: 为肿瘤患者开具氟胞嘧啶
- B: 为社区获得性肺炎患者开具柔红霉素
- C: 为疱疹病毒患者开具阿糖胞苷
- D: 为闭塞性脑血管病、中心性视网膜炎患者开具曲克芦丁

答案：D

30. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

- A: 提供的信息丰富、详实
- B: 内容全面、细致
- C: 内容广泛、使用方便
- D: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等

答案：C

31. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 $8.0 \times 10^9/L$

- A: 双胍类
- B: 促胰岛素分泌剂
- C: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- D: 胰岛素增敏剂

答案：A

32. 药物对医学检查指标异常结果的影响，可能导致 γ -谷氨酰转移酶升高的药物是

- A: 氯氮平

B: 阿司匹林

C: 苯妥英钠

D: 胰岛素

答案: C

33. 下列药品中，属于药品类易制毒化学品的兴奋剂是

A: 芬太尼

B: 螺内酯

C: 麻黄碱

D: 可待因

答案: C

34. 在治疗蛔虫病的药物中，"排虫缓慢而可能发生蛔虫游走与穿孔"的是

A: 噻嘧啶

B: 阿苯达唑

C: 枸橼酸哌嗪

D: 噻苯达唑

答案: B

35. 在血液透析患者中每次给予元素铁

A: 60mgqd

B: 60mg tid

C: 100mg/次

D: 60mg bid

答案: C

36. 可提示完全梗阻性黄疸的是

- A: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- C: $>342 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

答案：C

37. IV级临床研究的结论或II、III级临床研究的推论属于循证医学证据推荐强度的

- A: E 级
- B: D 级
- C: B 级
- D: C 级

答案：D

38. 氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。

- A: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同
- B: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同
- C: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同
- D: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同

答案：A

39. 依据生物钟规律，适宜睡前服用的药品是

- A: 沙丁胺醇
- B: 氟伏沙明
- C: 奥利司他
- D: 苯海拉明

答案：A

40. 医疗机构制剂申请要求临床研究受试例数不得少于

- A: 80 例
- B: 40 例
- C: 20 例
- D: 60 例

答案：D

41. 可使高血压患者血压升高的药物是()

- A: 速感宁胶囊
- B: 抗感宁胶囊
- C: 银翘解毒片
- D: 复方酚咖伪麻胶囊

答案：D

42. 单核细胞正常值参考范围是

- A: 0.20~0.40
- B: 0.03~0.08
- C: 0.01~0.05
- D: 0~0.01

答案：B

43. (2015 年真题) 饮茶可减少其吸收的药物是 ()。

- A: 阿莫西林
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 硫酸亚铁
- D: 去氮加压素

答案：C

44. 三级信息源的优点是

- A: 内容广泛，使用方便？
- B: 作者转录数据准确？
- C: 内容准确，没有偏倚？
- D: 内容更新，快速准确？

答案：A

45. 告知"新上市药品的品牌名、商品名以及药动学与药效学信息"属于

- A: 新药信息
- B: 药品不良反应
- C: 药物相互作用
- D: 禁忌证

答案：A

46. 属于雄激素受体拮抗剂，使增生的前列腺体积缩小的药品

- A: 黄酮哌酯
- B: 氟他胺
- C: 非那雄胺
- D: 阿夫唑嗪

答案：B

47. 患者，女，51 岁，近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状，临床诊断为围绝经期综合征，在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况属于禁忌证的是

- A: 严重肝功能障碍
- B: 癫痫
- C: 子宫内膜增生
- D: 胆囊疾病

答案：A

48. 提示有明确的风险，有必要采取措施以降低风险的信号属于

- A: 尚不确定的信号
- B: 驳倒的信号
- C: 部分确认信号
- D: 确认的信号

答案：D

49. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

- A: 非 ST 段抬高型心肌梗死
- B: 无症状型心肌缺血型
- C: 冠状动脉粥样硬化型心脏病
- D: 稳定型心绞痛

答案：A

50. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他丁片 40mgpoqd。

- A: 阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎
- B: 阿司匹林肠溶片必须晚上，餐后服用
- C: 氨氯地平片可用于早上服用
- D: 若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用

答案：D

51. 透析患者宜在两餐中间服用的药物是

- A: 维生素 D
- B: 促红细胞生成素
- C: 磷结合剂
- D: 铁剂

答案：D

52. 饮食对粪外观的影响,食西红柿、西瓜

- A: 酱色
- B: 黑褐色
- C: 暗绿色
- D: 红色

答案：D

53. 应在每日的同一时间服用并且不能有一日间断，仅数小时的给药间隔变化也会降低避孕效果的药物是

- A: 长效复方口服避孕药
- B: 探亲避孕药
- C: 口服低剂量孕激素避孕药
- D: 甲地孕酮硅胶环

答案：C

54. 提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的合格人员，是衡量互联网信息的

- A: 合理性
- B: 权威性
- C: 归因性

D: 新颖性

答案: B

55. (2017 年真题) 下列药物使用方式, 正确的是 ()

- A: 氧氟沙星滴眼液打开使用后, 继续使用 3 个月
- B: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用
- C: 酵母片在餐后整片用水送服
- D: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服

答案: B

56. (2015 年真题) 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应, 可选用的止吐药是 ()。

- A: 维生素 B6
- B: 奥美拉唑
- C: 昂丹司琼
- D: 雷尼替丁

答案: C

57. 关于新型抗凝药物, 下列说法不正确的为

- A: 需监测 INR
- B: 与食物和药物相互作用小
- C: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节
- D: 达比加群酯直接作用于凝血酶 (IIa 因子)

答案: A

58. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 药物的使用
- B: 药物制剂因素
- C: 药理作用
- D: 药动学相互作用

答案：B

59. （2016 年真题）以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于（）。

- A: 最小成本分析
- B: 成本-效用分析
- C: 成本-效益分析
- D: 成本-效果分析

答案：D

60. 下列选项中，关于老年人药动学方面的改变的叙述，错误的是（）。

- A: 胃酸分泌减少，一些酸性药物解离减少，吸收增加
- B: 肝微粒体酶系的活性降低，肝脏代谢药物能力下降，药物血浆半衰期延长
- C: 肝细胞合成白蛋白的能力降低，某些易与血浆蛋白结合的药物游离型浓度增高
- D: 脂肪组织增加而总体液及非脂肪组织减少，某些药物分布容积减小

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

61. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X 线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

- A: 嵌入 DNA 干扰核酸合成
- B: 破坏 DNA 结构和功能
- C: 干扰核酸生物合成
- D: 干扰蛋白质合成

答案：B

62. 以保证正常起居（避免夜尿）的是

- A: 抗忧郁药
- B: 利尿药
- C: 阿苯达唑
- D: 氨基糖苷类

答案：B

63. 能监测用药过程错误的真实发生率的是

- A: 病历审查
- B: 直接观察
- C: 岗位工作问责
- D: 计算机检测方法

答案：B

64. 口服后可导致肠道内 pH 下降，并可通过渗透作用增加结肠内容量的药物是

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 比沙可啶
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

答案：D

65. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 速尿
- B: 吗啡
- C: 氨茶碱
- D: 氨溴索

答案：B

66. 患者男 56 岁因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊查体舌面光滑,呈牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素 B12 水平下降，下列药物中不会影响维生素 B12 吸收的是()

- A: 对氨基水杨酸
- B: 氨氯地平
- C: 奥美拉唑
- D: 二甲双胍

答案：B

67. 以下抗高血压药物中，属于利尿药的是（）

- A: 阿米洛利
- B: 维拉帕米
- C: 氨氯地平
- D: 缬沙坦

答案：A

68. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏证、禁忌证和药物相互作用等方面信息，归属

- A: 科学发展

- B: 管理规范到位
- C: 环境与流程的优化与持续改进
- D: 知识培训

答案：C

69. 依据权威的专科诊疗指南是

- A: 药物治疗的安全性
- B: 药物治疗的有效性
- C: 药物治疗的方便性
- D: 药物治疗的规范性

答案：D

70. 可引起血清尿素氮降低的是

- A: 肾衰竭
- B: 急性胰腺炎
- C: 胃溃疡
- D: 严重肝病

答案：D

71. (2019 年真题) 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是

- A: 含漱剂
- B: 直肠栓剂
- C: 软膏剂
- D: 滴眼剂

答案：B

72. 治疗缺铁性贫血的首选药物是

- A: 维生素 B12

- B: 维生素 C
- C: 硫酸亚铁
- D: 叶酸

答案：C

73. (2019 年真题) 患者，女，57 岁，BMI31.2，诊断为 2 型糖尿病，经生活方式干预未能有效控制血糖，肝肾功能未见异常，初始治疗首选的药物是

- A: 格列齐特
- B: 吡格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：D

74. 患者，男，72 岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1 个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100 μ g pm 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg pm 舌下含服。

- A: 沙丁胺醇的不良反应
- B: 氨氯地平的不良反应
- C: 硝酸甘油剂量不足
- D: 布地奈德剂量太大

答案：A

75. 治疗发热，成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

- A: 4.5g
- B: 2.5g

C: 4.0g

D: 3.0g

答案：C

76. 归属于药历“患者基本情况”内容的是

A: 临床诊断

B: 主要实验室检查数据

C: 医保和费用支付情况

D: 联合用药

答案：C

77. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

A: 哌唑嗪口服

B: 卡托普利口服

C: 硝苯地平口服

D: 硝普钠静滴

答案：D

78. 药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价

A: 很可能

B: 可能

C: 可能无关

D: 肯定

答案：A

79. 以下关于调剂资格的叙述正确的是

- A: 具有中专(药学专业)以上学历即可从事处方调剂
- B: 具有本科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂
- C: 具有专科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂
- D: 具有执业药师资格或取得药学专业技术职务任职资格者可从事处方调剂

答案：D

80. 较易导致肾损伤的药品是

- A: 氯化钾
- B: 酮康唑
- C: 新霉素
- D: 阿米卡星

答案：C

81. 患者手术后，给予肠外营养液 10%GS500ml，50%GS250ml，20%脂肪乳 250ml，8.5%复方氨基酸 750ml，水溶性维生素 10ml，脂溶性维生素 10ml，微量元素 10ml，10%氯化钠注射液 40ml，10%氯化钾注射液 30ml。营养液中葡萄糖提供的能量是()

- A: 700kcal
- B: 1150kcal
- C: 200kcal
- D: 450kcal

答案：A

82. (2015 年真题) 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药是 ()。

- A: 头孢呋辛
- B: 阿奇霉素
- C: 阿莫西林
- D: 左氧氟沙星

答案：B

83. 在人体血中白细胞群体中，中性粒细胞(DC)的正常比例范围是

- A: 0.03~0.08
- B: 0.20~0.40
- C: 0.01~0.05
- D: 0.50~0.70

答案：D

84. 有双侧肾动脉狭窄的高血压患者不宜选用

- A: 卡托普利
- B: 维拉帕米
- C: 哌唑嗪
- D: 多沙唑嗪

答案：A

85. 不宜与食醋合用的药物是

- A: 磺胺类药物
- B: 左旋多巴
- C: 硫酸亚铁
- D: 辛伐他汀

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/105314130121012033>