

2024 年检验类之临床医学检验技术（师）题库附答案（典型题）

单选题（共 200 题）

1、关于麻风分枝杆菌叙述正确的是

- A. 培养对营养需求低
- B. 细胞内寄生菌
- C. 普通培养基生长良好
- D. 营养培养基生长不良
- E. 细胞外寄生菌

【答案】 B

2、对流免疫电泳的沉淀线出现在抗原和抗体之间且靠近抗原孔可说明

- A. 抗原强阳性
- B. 抗原弱阳性
- C. 抗原阴性
- D. 抗体弱阳性
- E. 以上都不对

【答案】 B

3、以下哪项是中性粒细胞趋化功能检测方法

- A. Boyden 小室法
- B. 非特异性酯酶测定法
- C. 酸性磷酸酶测定法
- D. 经典溶血空斑形成试验

E. PHA 皮肤试验

【答案】 A

4、关于 MTT 比色法检测 IL-2 的活性，下列哪项是错误的

- A. 可反映 B 淋巴细胞的功能
- B. 活的增殖细胞具有吸收 MTT 的能力
- C. 需要 IL-2 依赖细胞株
- D. 反映 T 淋巴细胞的功能
- E. 颜色的深浅表示细胞代谢性的强弱

【答案】 A

5、关于遗传性出血性毛细血管扩张症说法错误的是

- A. 常染色体显性遗传
- B. 主要病理缺陷是部分毛细血管壁中层缺乏弹力纤维及（或）平滑肌
- C. 出血严重时血栓与止血检验的结果可见异常
- D. 出血严重者可有小细胞低色素性贫血
- E. 束臂试验可呈阳性

【答案】 C

6、急性粒细胞白血病

- A. 周围血中早幼细胞增多
- B. 周围血中有较多幼稚粒细胞伴嗜酸、嗜碱性粒细胞增多
- C. 周围血幼红、幼粒细胞易见，骨髓呈现“干抽”
- D. 周围血出现较多异形淋巴细胞

E. 周围血易见盔形细胞、小球形细胞及破碎红细胞

【答案】 A

7、免疫比浊法的优点不包括

A. 检测范围较窄，精密度高

B. 测定结果准确

C. 稳定性好

D. 敏感性高

E. 检测时间短

【答案】 A

8、脊髓灰质炎病毒主要经过下列哪一个途径传播（ ）

A. 呼吸道途径

B. 血液途径

C. 破损皮肤

D. 粪-口途径

E. 性传播

【答案】 D

9、真性红细胞增多症，下列哪项是错误的

A. 血红蛋白 180～240g/L

B. 网织红细胞>5%

C. 中性粒细胞碱性磷酸酶积分增高

D. 红细胞 $(7\sim 10) \times 10^{12}/L$

E. 血小板增高

【答案】 B

10、亲和素标记 HRP 的常用方法是（ ）。

A. 光化学法

B. 改良过碘酸钠法

C. Bolton-Hunter 法

D. LPO 法

E. Ch-T 法

【答案】 B

11、下列哪一项符合异源性促性腺激素、性激素的肿瘤所致的假性早熟的临床生化检测结果（ ）

A. 性激素↑，促性腺激素↑，GnRH 兴奋试验无反应

B. 性激素↑，促性腺激素↑，GnRH 兴奋试验阳性

C. 性激素↑，促性腺激素↓，GnRH 兴奋试验阴性

D. 性激素↑，促性腺激素↑，GnRH 兴奋试验阴性

E. 性激素↓，促性腺激素↑，GnRH 兴奋试验阳性

【答案】 A

12、观察螺旋体最好的方法是

A. 革兰染色法

B. 抗酸染色法

C. Giemsa 染色法

D. 暗视野显微镜法

E. 悬滴法

【答案】 D

13、肺炎球菌的毒力因子主要是（ ）

A. 脂多糖

B. 荚膜

C. 外膜蛋白

D. 脂寡糖

E. 溶血素

【答案】 B

14、下列疾病与其相应检查，搭配正确的是

A. G-6-PD 缺陷症—红细胞渗透脆性试验

B. 免疫性溶血性贫血—抗人球蛋白试验

C. 遗传性椭圆形红细胞增多症—酸化血清溶血试验

D. 高铁血红蛋白病—高铁血红蛋白还原试验

E. 血红蛋白 H 病—硝基四氮唑蓝试验

【答案】 B

15、某免疫原有 $10\mu\text{g}$ ，制备抗血清应采用的免疫途径是

A. 肌肉注射

B. 皮内注射

C. 腹腔注射

D. 淋巴结内注射

E. 静脉注射

【答案】 D

16、血管损伤后止血栓能正确定位于损伤部位有赖于血小板的哪项特性

A. 黏附

B. 聚集

C. 收缩

D. 吸附

E. 释放

【答案】 A

17、患者，女性，26岁。面部红斑，光过敏，关节肿痛，多种抗生素治疗不见好转，尿蛋白检查阳性，激素治疗有效。

A. 类风湿因子检查

B. ANCA 检查

C. 抗心磷脂抗体检查

D. ENA 抗体谱检查

E. 血小板抗体检查

【答案】 D

18、成熟粒细胞进入血液后存活时间为

A. 3~6 小时

B. 6~10 小时

C. 10~20 小时

D. 1~2 天

E. 3~4 天

【答案】 B

19、关于胰腺癌病人的实验室检查，错误的是

A. 血淀粉酶经常出现异常

B. 血淀粉酶不经常出现异常

C. 血脂肪酶降低

D. 晚期血淀粉酶多有升高

E. 早期和晚期血淀粉酶均有升高

【答案】 C

20、患者，女性，46 岁。面部皮肤红肿伴瘙痒 1 天，3 天前曾染发。体格检查：面部及耳郭皮肤充血、红肿，并有散在水疱，大如绿豆、小如小米。选择有诊断意义的免疫球蛋白

A. IgG

B. IgM

C. IgA

D. Ig

E. IgD

【答案】 D

21、超广谱 β -内酰胺酶的英文简称是

A. ESBLs

B. MRSA

C. ETEC

D. EHEC

E. VRE

【答案】 A

22、蠕形螨属于

A. 永久性寄生虫

B. 暂时性寄生虫

C. 兼性寄生虫

D. 偶然寄生虫

E. 以上均不对

【答案】 A

23、HiCN 测定最大吸收峰位于（ ）。

A. 504nm

B. 538nm

C. 540nm

D. 560nm

E. 575nm

【答案】 C

24、流行性感冒的病原体是

A. 流行性感冒杆菌

- B. 流感病毒
- C. 副流感病毒
- D. 呼吸道合胞病毒
- E. 鼻病毒

【答案】 B

25、多发性骨髓瘤最重要的免疫学特征是

- A. 血浆中含有大量 M 蛋白
- B. 尿中可出现本周蛋白
- C. 贫血
- D. 骨损伤
- E. 红细胞沉降率增快

【答案】 A

26、患者，男性，40 岁，因急性上腹部剧烈疼痛伴呕吐入院，查体：血压 110/60mmHg，脉搏 86 次/分，肠鸣音减弱，腹部有反跳痛。实验室检查：血清外观浑浊，TC8.9mmol/L，TG17.2mmol/L，血液 AMY550U/L，该患者最有可能的诊断是

- A. 胆结石
- B. 急性胰腺炎继发高三酰甘油血症
- C. 肠梗阻
- D. 胃溃疡
- E. 心肌梗死

【答案】 B

27、可能为伤寒发病早期或其他沙门菌感染的交叉反应

- A. O 1: 160、H 1: 80
- B. O 1: 40、H 1: 320
- C. O 1: 160、H 1: 320
- D. O 1: 160, 甲、乙、丙任何一项 1: 160
- E. O 1: 80、H 1: 160

【答案】 A

28、下列哪种细胞在 ALL 骨髓象中少见

- A. 退化细胞
- B. 篮细胞
- C. 幼红细胞
- D. 幼稚淋巴细胞
- E. 原始淋巴细胞

【答案】 C

29、患者，男性，34 岁，乏力、水肿 2 周来诊。追问病史，1 个月前曾有咽痛病史。查：尿液有大量红细胞、白细胞、蛋白和管型。血免疫复合物呈强阳性，血清总补体活性定量和 C3 含量明显下降。

- A. 免疫复合物型超敏反应
- B. 速发型超敏反应
- C. 迟发型超敏反应
- D. 遗传因素
- E. 理化因素

【答案】 A

30、关于中性粒细胞生理性变化叙述，正确的是

- A. 生理性中性粒细胞增多通常伴有白细胞质量改变
- B. 新生儿中性粒细胞所占比例很少
- C. 在安静、休息时中性粒细胞增高
- D. 剧烈运动、情绪激动使中性粒细胞增高
- E. 吸烟者中性粒细胞多低于非吸烟者

【答案】 D

31、能够定量测定待检标本的试验是

- A. 间接凝集试验
- B. 协同凝集试验
- C. 单向扩散试验
- D. 双向扩散试验
- E. 对流免疫电泳

【答案】 C

32、患者，男性，45岁。因骨折住院。X线显示：多部位溶骨性病变。检验结果：骨髓浆细胞占25%，辅助诊断多发性骨髓瘤的最佳指标为

- A. M蛋白
- B. IgG
- C. ASO
- D. RF
- E. CEA

【答案】 A

33、患者男，54 岁，慢性乙肝病史 25 年。查 ALP、GGT 显著升高，为明确是否有肝纤维化/肝硬化，可选择的检查组合是（ ）。

- A. 前白蛋白、胆汁酸、总胆红素、肝炎全套
- B. 总蛋白，白蛋白，A/G，ALT
- C. MAO，III型前胶原，IV型胶原，层粘连蛋白、透明质酸
- D. AFP、LDH、ALT、AST
- E. ALT、AST、TBIL、肝炎全套

【答案】 C

34、从原始粒细胞，早幼粒细胞到中幼粒细胞均有合成 DNA 的能力，这类粒细胞应属于

- A. 分裂池
- B. 成熟池
- C. 贮存池
- D. 循环池
- E. 边缘池

【答案】 A

35、免疫应答的效果可分为哪三类

- A. 免疫保护、自身免疫、过敏反应
- B. 免疫保护、过敏反应、免疫耐受
- C. 免疫保护、自身免疫、免疫耐受
- D. 免疫保护、肿瘤免疫、自身免疫

E. 免疫保护、肿瘤免疫、免疫耐受

【答案】 B

36、赤足下田耕种可能感染

A. 丝虫

B. 华支睾吸虫

C. 钩虫

D. 旋毛虫

E. 蛲虫

【答案】 C

37、糖尿病分型诊断的指标

A. 糖化血红蛋白

B. 血酮体或尿酮体

C. 血糖、胰岛素和 C 肽

D. 胰岛素细胞抗体、 γ 谷氨酸脱羧酶抗体等自身抗体

E. 尿微量清蛋白

【答案】 D

38、骨髓中存在细胞核质发育不平衡的是

A. 缺铁性贫血

B. 免疫性溶血性贫血

C. 失血性贫血

D. 再生障碍性贫血

E. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症

【答案】 A

39、脊髓灰质炎病毒感染按症状不同类型，当体内病毒大量再度入血，形成第二次毒血症的是（ ）。

A. 无症状感染型

B. 顿挫型

C. 无麻痹型

D. 麻痹型

E. 脊髓型

【答案】 B

40、免疫球蛋白异常增生疾病是指

A. 免疫功能亢进的疾病

B. 免疫分子增多的疾病

C. 变性的免疫球蛋白所致的疾病

D. 浆细胞异常增殖所致 Ig 异常增生的疾病

E. 免疫活性细胞增殖失衡引起的疾病

【答案】 D

41、日本血吸虫的寄生部位是

A. 肠黏膜静脉

B. 肝脏实质组织

C. 小肠

- D. 肺脏
- E. 肝胆管

【答案】 A

42、下列对血细胞发育过程中形态演变规律的描述哪项是错误的()

- A. 胞浆量由少到多(淋巴细胞例外)
- B. 核染色质由紧密到疏松
- C. 核仁显著可见到无
- D. 核染色质着色淡紫色变深紫色
- E. 核浆比例由大变小

【答案】 B

43、目前临床上检测抗核抗体主要采用（ ）。

- A. 酶联免疫法
- B. 直接免疫荧光法
- C. 间接免疫荧光法
- D. 放射免疫法
- E. 免疫印迹法

【答案】 C

44、HLA 基因复合体所表达的基因产物在免疫应答过程中发挥着重要调控作用，也反映着自身免疫性疾病的基因易感性。目前尚未发现与 HLA 分子有关的疾病是（ ）。

- A. 强直性脊柱炎
- B. 多发性硬化

C. 内风湿关节炎

D. 颈椎病

E. I 型糖尿病

【答案】 D

45、精囊

A. 酸性磷酸酶

B. 精浆果糖

C. 两者均是

D. 两者均不是

【答案】 B

46、白细胞总数与中性粒细胞百分率均增高，同时有明显核左移时，常表示

A. 感染已近恢复期

B. 轻度感染

C. 感染严重

D. 预后良好

E. 造血功能衰退

【答案】 C

47、疑为镰形红细胞性贫血，应采用

A. HE 染色

B. 加入偏亚硫酸钠后观察

C. 瑞氏染色

- D. 吉姆萨染色
- E. 煌焦油蓝染色

【答案】 B

48、反映骨髓幼红细胞增生活跃最有意义的指标为

- A. MCV 减低
- B. MCH 减低
- C. RDW 增高
- D. 网织红细胞增高
- E. 外周血中出现幼红细胞

【答案】 D

49、对动脉粥样硬化有保护作用的载脂蛋白是

- A. ApoAI
- B. ApoB48
- C. ApoB100
- D. ApoC
- E. ApoE

【答案】 A

50、对等渗性脱水描述不正确的是

- A. 主要是细胞外液的丧失
- B. 常见于呕吐和腹泻等情况
- C. 血浆 Na

- D. 细胞内液量随细胞外液量减少而减少
- E. 细胞内液量正常

【答案】 D

51、有肝素结合位点的是

- A. 抗凝血酶III
- B. 蛋白
- C. 蛋白 S
- D. 血栓调节蛋白
- E. 活化蛋白 C 抑制物

【答案】 A

52、国家临床检验中心推荐的血糖测定常用方法是

- A. 葡萄糖氧化酶法
- B. 己糖激酶法
- C. 脱氢酶法
- D. 氧敏电极法
- E. 邻甲苯胺法

【答案】 A

53、关于 BAB 法叙述不正确的是

- A. 以游离亲和素作为桥联剂
- B. 用酶蛋白标记生物素
- C. 用生物素标记抗体分子

- D. 用亲和素标记抗体
- E. 亲和素分别与生物素化抗体和酶标生物素结合

【答案】 D

54、免疫荧光技术原理

- A. 用荧光素标记抗体检测抗原
- B. 以红细胞作免疫配体的载体
- C. 寄生虫变应原刺激宿主
- D. 在尾蚴体表面形成折光性套膜
- E. 血吸虫整卵为抗原

【答案】 A

55、火箭免疫电泳的最大特点是

- A. 灵敏度有极大的提高
- B. 电流逐渐减小
- C. 抗原、抗体复合物形成状如火箭的沉淀峰
- D. 电泳时间大大缩短
- E. 电流方向有规律地改变

【答案】 C

56、感染钩端螺旋体的主要途径是

- A. 垂直传播
- B. 动物叮咬
- C. 接触疫水

- D. 呼吸道吸入
- E. 使用血液制品

【答案】 C

57、与氨基酸转运有关的酶（ ）。

- A. LDH
- B. γ -GT
- C. ACP
- D. 醛缩酶
- E. AST

【答案】 B

58、患者女，35 岁。就诊时主诉近一年来易急躁，怕热多汗，易心悸，多食但易饥饿，体重减轻，吞咽障碍，体检：患者眼球突出，双侧甲状腺肿大，心动过速，实验室检查，血清 FT

- A. 垂体腺瘤
- B. 单纯性甲状腺肿
- C. Graves 病
- D. 甲状腺癌
- E. 亚急性甲状腺炎

【答案】 C

59、阵发性睡眠性血红蛋白尿症的确诊试验是（ ）。

- A. 异丙醇试验
- B. 酸溶血试验

- C. 血红蛋白电泳
- D. 珠蛋白肽链分析
- E. 抗碱血红蛋白测定

【答案】 B

60、属于获得性溶血性贫血的是

- A. 镰状细胞贫血
- B. HbE
- C. 自身免疫性溶血性贫血
- D. 珠蛋白生成障碍性贫血
- E. HS

【答案】 C

61、皮肤斑贴试验用于迟发型超敏反应的检测，结果的判定时间为（ ）。

- A. 20～30min
- B. 2h
- C. 24h
- D. 48～72h
- E. 7d

【答案】 D

62、中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP)积分正常参考值为

- A. 7～51 分
- B. 140～174 分

- C. 71~104 分
- D. 0~34 分
- E. 105~139 分

【答案】 A

63、肠杆菌科细菌分离鉴定时，双糖铁（KIA）结果一般什么时候观察为宜？
（ ）

- A. 48 小时
- B. 8~12 小时
- C. 12~24 小时
- D. 72 小时
- E. 36 小时

【答案】 C

64、诊断慢淋最常用的化学染色是

- A. POX
- B. PAS
- C. NAP
- D. ACP
- E. AS-DNAE

【答案】 B

65、取病人大便标本做悬滴法检查，发现运动极活泼，呈穿梭样的细菌，最可能是

- A. 普通变形杆菌

- B. 霍乱弧菌
- C. 肠炎沙门菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 痢疾志贺菌

【答案】 B

66、对慢性粒细胞白血病下列哪项是错误的（ ）

- A. 脾大程度与白细胞升高程度成正比
- B. 外周血与骨髓各阶段粒细胞分布呈一致性
- C. 血清维生素 B
- D. 中性粒细胞碱性磷酸酶活力增高与白细胞增多成正比
- E. 染色体检查，费城染色体(Ph') t22q

【答案】 D

67、患儿男，6 岁。咽喉疼痛伴咳嗽一周。查体见咽部充血，扁桃体Ⅱ度肿大，上覆灰白色膜，棉拭擦之不去。拟诊扁桃体白喉，首选的微生物检查方法是（ ）。

- A. 咽拭子麦康凯平板培养
- B. 扁桃体拭子 SS 平板培养
- C. 咽拭子血平板培养
- D. 扁桃体假膜边缘拭子亚碲酸钾血平板培养
- E. 扁桃体拭子 TCBS 平板培养

【答案】 D

68、 α -NAE 染色呈强阳性的细胞是

- A. 原始红细胞
- B. 中性晚幼粒细胞
- C. 原始粒细胞
- D. 幼单核细胞
- E. 原始淋巴细胞

【答案】 D

69、不符合急性淋巴细胞白血病血象特征的描述是

- A. 红细胞及血红蛋白降低
- B. 血片中可发现少量幼红细胞
- C. 白细胞计数可正常
- D. 白细胞分类中原始淋巴细胞>90%
- E. 血小板计数低于正常

【答案】 D

70、判断胃出血的指标是

- A. BAO
- B. MAO
- C. PAO
- D. 隐血试验
- E. 尿素测定

【答案】 D

71、下列关于单克隆抗体的局限性叙述，错误的是

- A. 单克隆抗体固有的亲和性和局限的生物活性限制它的应用范围
- B. 单克隆抗体不能用于凝集反应
- C. 单克隆抗体能用于沉淀反应
- D. 反应强度不如多克隆抗体
- E. 制备技术复杂，费时费工

【答案】 C

72、沙眼衣原体直接涂片检查一般采用

- A. 革兰染色
- B. 吉姆萨染色
- C. 银染
- D. 抗酸染色
- E. 其他

【答案】 B

73、与特发性血小板减少性紫癜实验室特征不符合的是

- A. 血小板计数明显减低
- B. 骨髓巨核细胞增多
- C. 急性型患者以颗粒型巨核细胞增多为主
- D. 血小板寿命缩短
- E. 血小板相关抗体及补体增高

【答案】 C

74、患者男，43 岁。健康体检时化验血甲胎蛋白 $>500\mu\text{g/L}$ ，血 ALT 37U/L ，查体未见异常。初步诊断最可能是（ ）。

- A. 慢性迁延性肝炎
- B. 亚临床肝癌
- C. 肝硬化失代偿期
- D. 肝硬化代偿期
- E. 慢性活动性肝炎

【答案】 B

75、在正常情况下，出生后生成红细胞、粒细胞和血小板的唯一场所是

- A. 中胚叶
- B. 肝脏
- C. 骨髓
- D. 淋巴器官
- E. 脾脏

【答案】 C

76、用 ES 培养基选择的细菌是

- A. 优杆菌
- B. 梭杆菌
- C. 双歧杆菌
- D. 产黑素类杆菌
- E. 脆弱类杆菌

【答案】 A

77、为保证流式检测的准确性，不必要的是

- A. 单细胞悬液的制备
- B. 进样速度越慢越好
- C. 特定荧光染料的选择
- D. 同型对照
- E. 仪器工作状态的校准

【答案】 B

78、属于人源化抗体的是

- A. 改形抗体
- B. 小分子抗体
- C. 抗体融合蛋白
- D. 双特异性抗体
- E. 以上均不是

【答案】 A

79、腮腺炎时可见

- A. 血清淀粉酶活性升高伴尿淀粉酶活性降低
- B. 血清淀粉酶活性升高以 S 型为主，36 小时恢复正常
- C. 血清 S 型淀粉酶升高而 P 型淀粉酶正常，脂肪酶活性不升高
- D. 血和尿淀粉酶活性升高伴脂肪酶活性升高
- E. 血清 S 型淀粉酶和 P 型淀粉酶可同时升高，也可为 2 型中任何一型升高

【答案】 C

80、支持骨髓增生异常综合征(MDS)诊断的免疫学检验结果为

- A. 外周血 CD19
- B. CD41
- C. 外周血 CD4 / CD8 减低
- D. CD34
- E. CD38

【答案】 C

81、参与III型超敏反应的抗体主要是（ ）。

- A. IgA, IgG
- B. IgG, IgM
- C. IgM, IgA
- D. IgD, JgM
- E. IgE, IgA

【答案】 B

82、卫氏并殖吸虫的第二中间宿主是（ ）。

- A. 溪蟹
- B. 淡水鱼、虾
- C. 淡水螺类
- D. 海鱼
- E. 水生植物

【答案】 A

83、不属于抗原抗体反应的是

- A. 沉淀反应
- B. ELISA
- C. 免疫浊度测定
- D. 结核菌素试验
- E. 凝集反应

【答案】 D

84、用于检测原发性肝癌的肿瘤标志物是

- A. AFP
- B. PSA
- C. CEA
- D. CA15-3
- E. CA125

【答案】 A

85、第一架观察微生物的显微镜放大的倍数是

- A. 200~300 倍
- B. 266 倍
- C. 366 倍
- D. 500 倍
- E. 1000 倍

【答案】 A

86、不被胎盘转运的母体物质是

- A. 葡萄糖
- B. 胰岛素
- C. 甲状腺激素
- D. 低密度脂蛋白
- E. 游离脂肪酸

【答案】 C

87、酶联发光免疫分析仪不包括

- A. 辣根过氧化物酶标记的化学发光免疫分析仪
- B. 吖啶酯标记化学发光免疫分析仪
- C. 碱性磷酸酶标记的化学发光免疫分析仪
- D. 碱性磷酸酶标记的微粒子荧光免疫分析仪

【答案】 B

88、放射免疫技术间接标记法的优点是

- A. 避免氧化还原剂损伤待标记物的免疫活性
- B. 提高敏感性
- C. 提高特异性
- D. 提高亲和力
- E. 标记方法简便

【答案】 A

89、SS 琼脂主要用分离

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 白喉棒状杆菌
- C. 分枝杆菌
- D. 志贺菌、沙门菌
- E. 鼠疫杆菌

【答案】 D

90、免疫接种后易引起局部持久溃疡和形成肉芽肿的佐剂为

- A. 弗氏不完全佐剂
- B. 弗氏不完全佐剂+卡介苗
- C. 细胞因子佐剂
- D. 多聚核苷酸
- E. 肉毒素

【答案】 B

91、下列属于毒力变异株的是（ ）。

- A. 卡介苗
- B. 沙门菌 S-R 变异株
- C. 沙门菌 R-S 变异株
- D. 细菌 L 型
- E. 空斑突变株

【答案】 A

92、原发性血小板减少性紫癜，PAIgG、PAIgA、PAIgM 和 PA-C3 的水平均可升高，其中常见的是

- A. PAIgA
- B. PAIgG
- C. 循环免疫复合物 CIC
- D. PAIgM
- E. PAC

【答案】 B

93、关于红骨髓的描述，正确的是

- A. 儿童期红骨髓约占骨髓总量的 50%
- B. 青春期红骨髓约占骨髓总量的 50%
- C. 成年人红骨髓约占骨髓总量的 50%
- D. 儿童期红骨髓约占骨髓总量的 30%
- E. 青春期红骨髓约占骨髓总量的 30%

【答案】 C

94、HIV 致病的关键因素是

- A. HIV 基因可以和宿主基因整合
- B. 可合并各种类型的机会感染
- C. 可发生各种肿瘤而致死
- D. HIV 易发生变异，避免免疫系统攻击
- E. 侵犯 Th 细胞，造成严重的免疫缺陷

【答案】 D

95、脑脊液 Pandy 试验是

- A. 蛋白质定性试验
- B. 葡萄糖定性试验
- C. 氯化物定性试验
- D. 蛋白电泳
- E. IgG 指数定量测定

【答案】 A

96、适用于大规模防癌普查的固定液是

- A. 95%酒精溶液
- B. 75%酒精溶液
- C. 氯仿酒精溶液
- D. 乙醚酒精溶液
- E. 卡诺固定液

【答案】 A

97、高滴度的抗核 RNP 抗体作为重要诊断依据的是

- A. RA
- B. SLE
- C. 混合性结缔组织病
- D. 重症肌无力
- E. 干燥综合征

【答案】 C

98、机体内钙主要存在于（ ）。

- A. 骨和牙齿
- B. 血液
- C. 肌肉
- D. 毛发
- E. 神经

【答案】 A

99、卡波环现被认为可能是

- A. Hb 聚集
- B. 色素沉着
- C. 脂蛋白变性的结果
- D. 胞质发育异常
- E. 细胞核的残余物

【答案】 C

100、巨幼细胞性贫血时，外周血常见

- A. 靶形红细胞
- B. 泪滴形红细胞
- C. 巨幼红细胞
- D. 口型红细胞
- E. 缟钱状红细胞

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/106021213215011104>