

2024 年海南省东方市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题真题（名校卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，45 岁，既往有扩张型心肌病，近 1 年出现劳累性呼吸困难，1 天前因感冒出现发热、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张早期和中期奔马律。根据该患者临床表现，最可能的诊断为

- A: 急性左心衰竭
- B: 急性心肌炎
- C: 支气管肺炎
- D: 大叶性肺炎

答案：A

2. 及早用药以利于杀灭结核菌株

- A: 早期
- B: 联合
- C: 适量
- D: 规律

答案：A

3. 患者，男性，80 岁，患有帕金森病伴闭角型青光眼，近 2 个月出现尿频、尿急、夜尿增多，无法控制。诊断为急迫性尿失禁，给予米拉贝隆治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 卧位和坐位时高血压
- B: 口干、便秘、尿潴留
- C: 直立性低血压
- D: 鼻咽炎和尿路感染

答案：D

4. 易受光线影响而变质的药品

- A: 氰化钾
- B: 肝素
- C: 冰硼散
- D: 安乃近

答案：B

5. 患儿，男，3 岁半，身高 95cm，体重 16kg 一天前开始发热，20h 左右出现腹泻，约 3h 一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。检查结果：体温 38.8℃，脉搏 118 次/分，呼吸 28 次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ - $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充电解质
- B: 益生菌应避免与小檗碱、鞣酸蛋白同时服用
- C: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与微生态制剂同时服用
- D: 首选口服补液，必要时静脉补液

答案：C

6. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

- A: 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多者应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果
- B: 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰
- C: 右美沙芬可引起嗜睡，驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用
- D: 镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素
- 答案：D**

7. 对于尿液的描述正确的是

- A: 正常人每日排出尿液 1~2L，其中 50%为水分
- B: 尿量的多少主要取决于肾小球滤过率和肾小管的重吸收
- C: 正常人的尿量变化幅度不大
- D: 正常人的新鲜尿液呈弱碱性
- 答案：B**

8. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性罗音；WBC $>13\times10^9/L$ 。

- A: 哮喘
- B: 肺结核
- C: 社区获得性肺炎
- D: 支气管炎

答案：C

9. 患者，男性，55 岁，近期感觉乏力、疲倦、心悸、气短，经常头晕、头疼、困倦。经医生检查发现，患者皮肤干燥、指甲扁平。实验室检查示 Hb72g/L。诊断为缺铁性贫血，处方为乳酸亚铁口服。

- A: 服药时不能饮用茶和咖啡

B: 大便颜色变黑为消化道出血所致

C: 尽量使用铁锅烹饪

D: 注意足够的蛋白质摄入

答案：B

10. (2018 年真题) 患者, 女, 21 岁, 近半年来食欲亢进, 多汗体重明显减轻, 伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤, 心率 104 次/分, 化验结果: 血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$, FT3、FT4 明显升高, 肝肾功能基本正常, 白细胞计数正常, 诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是 ()

A: 碘化钾治疗, 定期复查

B: 甲状腺次全切除手术

C: 选用 ^{131}I 治疗

D: 注意休息补充营养, 使用甲巯咪唑治疗

答案：D

11. 贫血患者常出现

A: 中性粒细胞增多

B: 血红蛋白减少

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 血小板计数增高

答案：B

12. 患者, 男, 36 岁, 因发热、咳嗽就诊, 查血常规: 白细胞计数

$6.28 \times 10^9/\text{L}$, 中性粒细胞百分比 65.7%, 淋巴细胞百分比 15.1%。诊断为感冒。医生处方: 阿奇霉素片 0.5g qd po. 该处方属于 ()

A: 有配伍禁忌

B: 有禁忌证用药

C: 无适应证用药

D: 用法、用量不适宜

答案: C

13. (2018 年真题) 患者, 女, 46 岁, 高血压病史 3 年, 2 年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛, 诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重, 采用了联合用药方案: 患者用药如下:

A: 甲氨蝶呤片

B: 氨氯地平片

C: 羟氯喹片

D: 双氯芬酸钠缓释片

答案: C

14. (有关物质中毒的特效解毒剂), 有机磷中毒的特效解毒剂是

A: 烯丙吗啡

B: 维生素 K

C: 氯解磷定

D: 乙酰胺

答案: C

15. 关于处方开具和调剂的说法正确的是()

A: 调剂处方时应做到“四查十对

B: 剂处方时“四查”是指查对药名、剂型、规格和数量

C: 应使用淡红色处方开具第二类精神药品

D: 处方开具后 7 日内有效

答案: A

16. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 如原方案中已应用左氧氟沙星，重复应用时剂量加倍

B: 如原方案中已应用甲硝唑，且日剂量达到 1600mg/d，重复应用时剂量加倍

C: 如原方案中已应用克拉霉素，应避免再次使用

D: 应重复原方案治疗 2 周

答案：C

17. 瘦肉精（克伦特罗）中毒时，可采用的解药是

A: 普萘洛尔

B: 乙酰胺

C: 乙酰半胱氨酸

D: 氟马西尼

答案：A

18. 关于他汀类和贝特类的联合使用，下列说法正确的是

- A: 早晨服用
- B: 早晚分别服用
- C: 早晨服用贝特类，晚上服用他汀类
- D: 晚间服用

答案：C

19. 影响药物治疗有效性的因素不包括（）

- A: 患者的病生理状态
- B: 药品价格
- C: 药物相互作用
- D: 给药途径

答案：B

20. 人体贮存能量的形式为

- A: 胆固醇
- B: 三酰甘油
- C: 糖化血红蛋白
- D: 高密度脂蛋白胆固醇

答案：B

21. 妊娠期妇女用药应该格外谨慎，在不同孕期药物对胚胎和胎儿的影响不同，一般情况下，用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

- A: 3 个月之后
- B: 28 天之内
- C: 18 天之内
- D: 21 天之内

答案：C

22. 卡托普利主要通过下列哪项而起抗慢性心功能不全的作用

- A: 抑制血管紧张素转化酶
- B: 扩张血管
- C: 利尿降压
- D: 拮抗钙

答案：A

23. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性罗音；WBC $>13\times10^9/L$ 。

- A: 利福霉素
- B: 链霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 红霉素

答案：C

24. 关于三酰甘油的临床意义说法不正确的是

- A: 长期饥饿或食用高脂肪食品可导致三酰甘油升高
- B: 大量饮酒可使三酰甘油出现假性升高
- C: 血清三酰甘油增高可提示动脉硬化及高脂血症
- D: 应用雌激素、避孕药可出现三酰甘油减少

答案：D

25. 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握，必要时需向患者进行解释 OS. 是指

- A: 适量
- B: 右眼
- C: 立即

D: 左眼

答案：D

26. (肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整) 肾功能中度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

A: $1/10 \sim 1/5$

B: $1/7 \sim 1/5$

C: $1/5 \sim 1/2$

D: $3/5 \sim 3/4$

答案：C

27. 患者，男，60 岁，身高 170cm，体重 85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率 100 次 / 分、血压 160 / 100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

A: 140 / 80mmHg

B: 130 / 80mmHg

C: 140 / 90mmHg

D: 150 / 100mmHg

答案：B

28. 患者，男，28 岁。咳嗽、咳痰，血常规提示白细胞及中性粒细胞正常，予阿奇霉素抗感染为

A: 无适应证用药

B: 有禁忌证用药

C: 联合用药不适宜

D: 过度治疗用药

答案：A

29. 患儿，男，10 个月，1 天前出现腹泻，大便 7 次 / 日，黄色水样便，量多，未见黏液脓血便，伴发热，体温 38~39℃，时有呕吐 / 3 次，日。大便常规：WBC1-3 / HP。

A: 24 小时

B: 3~4 小时

C: 0.5~2 小时

D: 2~3 小时

答案：D

30. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的抗高血压药是

A: 卡托普利

B: 厄贝沙坦

C: 比索洛尔

D: 氨氯地平

答案：B

31. 能促使体格强壮、肌肉发达、增强爆发力，并缩短体力恢复时间的兴奋剂

A: 蛋白同化激素

B: 精神刺激剂

C: β -受体阻断剂

D: 利尿剂

答案：B

32. (2016 年真题) 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd，患者用药期间应定期监测的生化指标是 ()。

A: ALT

B: BUN

C: RBC

D: Hb

答案：A

33. 慢性痛风和痛风性肾病为抑制尿酸生成可选用

A: 别嘌醇

B: 苯溴马隆

C: 秋水仙碱

D: 泼尼松龙

答案：A

34. 以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

A: 庆大霉素

B: 青霉素

C: 甲氨蝶呤

D: 多粘菌素

答案：B

35. 患者，女，21 岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症。应用丙硫氧嘧啶 150mg tid 治疗 4 个月后，出现体重增加、乏力、怕冷、突眼加重，治疗方案应调整为

A: 加大丙硫氧嘧啶用量

B: 换用另一种抗甲状腺药物

C: 放射性 ^{131}I 治疗

D: 丙硫氧嘧啶减量并加用甲状腺素片

答案：D

36. 可待因属于兴奋剂中的

- A: 麻醉药品
- B: β 受体阻断剂
- C: 利尿剂
- D: 精神刺激剂

答案：A

37. 开具新药或增加药物前需考虑患者的总体情况和药物相互作用，是倡导开处方环节的

- A: 修订医嘱及时沟通
- B: 医嘱完整不漏项
- C: 实现个体化治疗
- D: 医嘱清楚准确

答案：C

38. “治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者可分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度”是针对

- A: 半衰期 8~24 小时的药品
- B: 半衰期小于 30 分钟的药品
- C: 半衰期大于 30 小时的药品
- D: 半衰期大于 24 小时的药品

答案：B

39. 下列药品中易发生水解反应的是

- A: 肾上腺素
- B: 头孢氨苄
- C: 维生素

D: 盐酸氯丙嗪

答案：B

40. 服用伐地那非后，如果舌下含服硝酸异山梨酯，建议服药间隔时间应为

A: 48 小时

B: 1 周

C: 24 小时

D: 4 小时

答案：C

41. （2018 年真题）患者，男，57 岁，化验结果：TC4.6mmol/L（参考值<5.2mmol/L），TG11.0mmol/L（参考值 0.56——1.70mmol/L）尿酸 508umol/L（参考值<420umol/L），应首选的调脂药物为（）

A: 非诺贝特

B: 依折麦布

C: 烟酸

D: 考来烯胺

答案：A

42. 属于肾上腺素能 α 受体阻断剂，可改善尿道梗阻症状的药品

A: 黄酮哌酯

B: 氟他胺

C: 非那雄胺

D: 阿夫唑嗪

答案：D

43. (2020 年真题) 患者,男,66 岁,2 型糖尿病,长期口服二甲双胍,格列美脲,近日查空腹血糖 12.3mmol/L,糖化血红蛋白 9.0%,主诊医师加用“甘精胰岛素每日 1 次+门冬胰岛素每日 3 次”,关于该患者药物治疗方案的说法,正确的是 ()

- A: 门冬胰岛素应在三餐前 30 分钟皮下注射
- B: 患者为 2 型糖尿病,加用胰岛素一日 4 次方案不适宜
- C: 甘精胰岛素应避免与二甲双胍联合使用
- D: 因采用一日多次胰岛素治疗,格列美脲应停用

答案: D

44. 阿糖腺苷属于

- A: 抗真菌药
- B: 抗病毒药
- C: 抗过敏药
- D: 抗肿瘤药

答案: B

45. (2017 年真题) 细菌性尿路感染最常见的致病菌是 ()

- A: 铜绿假单胞菌
- B: 大肠埃希菌
- C: 克雷伯杆菌
- D: 肠球菌

答案: B

46. 患者用药咨询的内容是

- A: 抗菌药物的合理使用
- B: 减肥、补钙、补充营养素
- C: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

D: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

答案：C

47. 可引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

A: 雌激素、孕激素、雄激素

B: 苯巴比妥

C: 沙利度胺

D: 叶酸拮抗剂

答案：C

48. 适用于年轻、震颤突出的患者

A: 苯海索

B: 左旋多巴

C: 司来吉兰

D: 恩托卡朋

答案：A

49. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 瑞格列奈片应于餐前服用

B: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

C: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

D: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

答案：C

50. (2017 年真题) 患者,男,80 岁,因发热、咳嗽、咳痰 2 天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素 C 等治疗。患者用药 3 天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是 ()

- A: 氨溴索
- B: 左氧氟沙星
- C: 甘草合剂
- D: 对乙酰氨基酚

答案: B

51. 患者,男,45 岁,因男性乙型肝炎给予干扰素治疗,治疗 1 个月后,患者出现脱发,停用干扰素后,脱发症状好转,再次给予干扰素治疗,患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是 ()。

- A: 可能
- B: 可能无关
- C: 很可能
- D: 肯定

答案: D

52. 下列药物中,属于抗风湿植物药制剂的是

- A: 青藤碱
- B: 银杏叶
- C: 紫杉醇
- D: 青蒿素

答案: A

53. 一般来讲,细菌药敏试验的报告不包括

- A: 涂片、培养鉴定

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）

C: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）

D: 临床治疗方案

答案: D

54. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 下肢深静脉血栓形成

B: 下肢动脉栓塞

C: 肺动脉栓塞

D: 病理性骨折

答案: A

55. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

A: 竞争性拮抗作用

B: 减少不良反应

C: 协同作用

D: 敏感化作用

答案: D

56. 下列白细胞计数中，成人静脉血的正常参考值为

A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$

B: $(4.3 \sim 10.0) \times 10^9/L$

C: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

D: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

答案: D

57. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。

A: 皮脂腺囊肿

- B: 晚期顽固性卵巢癌
- C: 非精原细胞性生殖细胞癌
- D: 晚期顽固性膀胱癌

答案：A

58. 用药后可出现痛风、面色潮红的抗结核药是

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：C

59. 处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

- A: 未使用药品规范名称
- B: 用法、用量或联合用药不适宜
- C: 无适应证用药
- D: 有配伍禁忌

答案：A

60. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他丁片 40mgpoqd。

- A: 双嘧达莫片
- B: 华法林片
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 氯吡格雷片

答案：D

61. 治疗真菌性阴道炎可选用

- A: 复方角菜酸酯栓
- B: 克霉唑栓
- C: 复方苯甲酸酊
- D: 阿达帕林凝胶

答案：B

62. 痛风缓解期，在关节炎症控制 1~2 周后开始使用的药物

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 阿司匹林
- D: 呋塞米

答案：B

63. 幽门梗阻（消化性溃疡并发症）

- A: 规律性上腹痛
- B: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物
- C: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血
- D: 突发上腹剧痛，继而至全腹

答案：B

64. 患者，女，58 岁，罹患肺癌，术后化疗 3 次，半年后复发，决定使用安罗替尼 12mgqd 靶向治疗，既往有乙型肝炎病史，患者用药期间应密切监视的特殊不良反应是

- A: Q—T 间期延长
- B: 出血

C: 腹泻

D: 乙型肝炎复发

答案: B

65. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 8.0×10

A: 心力衰竭

B: 肌痛

C: 乳酸酸中毒

D: 低血糖

答案: C

66. 将 0.5g 氨茶碱注射液加到 5%葡萄糖注射液 350ml 中，临床要求给药速度是 60mg/h，输注速度是

A: 15ml/h

B: 42ml/h

C: 60ml/h

D: 36ml/h

答案: B

67. 服用 α 受体阻断剂后，如果服用西地那非，建议服药间隔时间应为

A: 48 小时

B: 1 周

C: 24 小时

D: 4 小时

答案: D

68. 隔日一次用药的外文规范缩写的是

- A: q. d
- B: q. n
- C: q. h
- D: q. o. d

答案：D

69. 毒物引起严重腹泻者

- A: 不能用强利尿剂
- B: 禁止洗胃
- C: 不能催吐
- D: 不能导泻

答案：D

70. 对 5 岁以下儿童高热时紧急退热，应该选用的药品是

- A: 20%阿司匹林溶液滴鼻
- B: 贝诺酯混悬液
- C: 20%安乃近溶液滴鼻
- D: 布洛芬混悬液

答案：C

71. 已知"1%(g/ml)盐酸麻黄碱溶液的冰点降低值为 0.16"，1g 盐酸麻黄碱氯化钠的等渗当量为 0.28，欲配制 2%(g/ml)盐酸麻黄碱滴鼻剂 500ml，需要氯化钠的量是

- A: 1.88g
- B: 1.83g
- C: 1.7g
- D: 1.78g

答案：C

72. 患者，女，30 岁，妊娠 7 个月，既往有磺胺类药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物增多并有烧灼感。药师应推荐的治疗药物是

- A: 氯霉素滴眼液
- B: 磺胺醋酸钠滴眼液
- C: 硫酸锌滴眼液
- D: 利巴韦林滴眼液

答案：C

73. 属于雄激素受体拮抗剂，使增生的前列腺体积缩小的药品

- A: 黄酮哌酯
- B: 氟他胺
- C: 非那雄胺
- D: 阿夫唑嗪

答案：B

74. (2018 年真题) 患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA1c) 9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mgtidpo，罗格列酮片 2mgbidpo，甲钴胺片 0.5mgtidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 罗格列酮片 2mgbidpo
- B: 格列美脲片 2mgtidpo
- C: 甲钴胺片 0.5mgtidpo
- D: 二甲双胍片 0.5gtidpo

答案：B

75. 现有一新生儿确诊感染乙型肝炎，以下可提示其生母妊娠期间血清学检查结果的是

- A: HBsAg, HBeAg 均为阳性
- B: HBsAb, HBeAg 均为阳性
- C: HBeAg 为阳性
- D: HBsAg 为阳性

答案：A

76. 类风湿关节炎的治疗目标除了控制症状，更为关键的是应用改善病情的药物，以延缓病情发展，避免致残。下列属于改善病情的抗风湿药是

- A: 抗疟药
- B: 阿达木单抗
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 泼尼松

答案：A

77. 《中国药典》规定可在室温干燥并于避光处保存的药品是

- A: 金双歧（双歧杆菌-乳杆菌三联活菌）
- B: 培菲康（双歧杆菌三联活菌）
- C: 美常安（枯草杆菌二联活菌）
- D: 聚克（复方乳酸菌）

答案：C

78. 关于乙型肝炎病毒表面抗体的描述错误的是

- A: HBsAb 是一种保护性抗体
- B: 乙型肝炎恢复期可出现 HBsAb 阳性

C: 大多数 HBsAg 的消失和 HBsAb 的出现，意味着 HBV 感染的恢复期和人体产生了免疫力

D: HBsAb 是 HBsAg 的对应抗体，但非中和抗体

答案：D

79. 下列情况不宜选用的抗高血压药，直立性低血压不宜选用

A: ACEI

B: 利尿药

C: 哌唑嗪

D: 非二氢吡啶类钙拮抗剂

答案：C

80. 能够给予当即解答的就当即解答

A: 及时回答不拖延

B: 解释的技巧

C: 保护患者的隐私

D: 特别关注特殊人群

答案：A

81. 患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

A: 埃索美拉唑镁肠溶片

B: 枸橼酸铋钾胶囊

C: 克拉霉素片

D: 甲硝唑片

答案：C

82. 提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

- A: 部分确认信号
- B: 尚不确定的信号
- C: 驳倒的信号
- D: 确认的信号

答案：B

83. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC 12.4×10

- A: 1 片半 qd
- B: 首剂 1 片，此后每 24 小时半片
- C: 1 片 qd
- D: 半片 qd

答案：B

84. 脂溶性维生素 A 宜餐后服用的原理是

- A: 利用油脂增加其溶解
- B: 餐后胃酸分泌增多有利于吸收
- C: 减少被胃酸破坏
- D: 延长在胃肠道滞留时间

答案：A

85. (2017 年真题) 下列药物使用方式, 正确的是 ()

- A: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服
- B: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用
- C: 氧氟沙星滴眼液打开使用后, 继续使用 3 个月

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 酵母片在餐后整片用水送服

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/107041154051010024>