2024年广西壮族自治区西林县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库及答案一套

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.应在每日的同一时间服用并且不能有一日间断，仅数小时的给药间隔变化也会降低避孕效果的药物是

A：长效复方口服避孕药

B：甲地孕酮硅胶环

C：探亲避孕药

D：口服低剂量孕激素避孕药

答案：D

2.患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用4小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病的可能。该病例用药与不良反应的因果关系评价结果是

A：可能无关

B：很可能

C：可能

D：肯定

答案：B

3.有一肺炎球菌感染患者，对青霉素过敏，宜选用的有效抗菌药物是

A：左氧氟沙星

B：阿米卡星

C：多西环素

D: 阿莫西林

答案：A

4.可用红霉素的敏感性预测自身敏感性的药物是

A: 头孢洛林

B: 克拉霉素

C: 替考拉宁

D: 阿莫西林

答案：B

5.（2017年真题）患者女45岁,既往有心律失常（Q-T间期延长）、低钾血症近日因发热、咳嗽、咳痰就诊,诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是（）

A: 头孢呋辛酯

B: 莫西沙星

C: 阿莫西林

D: 氨溴索

答案：B

6.属于中效的胰岛素制剂是

A: 低精蛋白锌胰岛素

B: 精蛋白锌胰岛素

C: 甘精胰岛素

D: 赖脯胰岛素

答案：A

7.多用于病情急重者的制剂

A: 滴丸剂

B: 膜剂

C: 泡腾片剂

D: 透皮贴剂

答案：A

8.药库管理人员根据药品用量和库存情况提出购药计划，向指定的药品经营单位采购，必须持有

A: 印鉴卡

B: 防盗设施

C: 五专管理

D: 基数卡

答案：A

9.患者，女，59岁，一月前患胃溃疡，近日查体发现血脂异常化验结果：TC7.2mmol/L，TG1.7mmol/L，LDL-C4.3mmol/L，ALT56U/L，AST80U/L。该患者首选的调脂药是()

A: 普罗布考片

B: 阿昔莫司胶囊

C: 非诺贝特片

D: 阿托伐他汀钙片

答案：D

10.华法林引起出血性危险增加的指标是

A: INR＜1.5

B: INR＞5

C: INR＜3

D: INR＞3

答案：D

11.痛风缓解期在关节炎症控制1～2周开始使用

A: 秋水仙碱

B: 别嘌醇

C: 阿司匹林

D: 丙磺舒

答案：B

12.血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的8%～9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

A: 嗜碱性粒细胞

B: 中性粒细胞

C: 单核细胞

D: 淋巴细胞

答案：A

13.（2018年真题）患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A: 开启的胰岛素需要冷藏保存

B: 注射胰岛素制剂时,应变换注射部位,两次注射点要间隔2cm

C: 在注射胰岛素制剂时,针头可重复使用

D: 未使用的胰岛素可以冷冻保存

答案：B

14.患者,女,45岁,6个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁,在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗,症状控制较好,近3个月服用西咪替丁,患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱,该患者各地求医,服用各种药物,具体药物品种不详。围绕该病例,医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A: 长期规律用药

B: 遵从联合治疗原则

C: 定期监测肝功能

D: 有条件的应测定药物血液浓度

答案：B

15.治疗癌症疼痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，可选择的药物是

A: 东莨菪碱

B: 比沙可啶

C: 硫酸镁

D: 乳果糖

答案：D

16.对于轻度（IPSS＜8分）至中度（IPSS为8～19分）前列腺增生症患者，建议初始治疗药物是

A: 非那雄胺

B: 奥昔布宁

C: 坦索罗辛

D: 米多君

答案：C

17.联合用药可使异烟肼失去抗菌作用的中成药

A: 蛇胆川贝液（苦杏仁苷）

B: 香连片（黄连）

C: 丹参片（丹参酮）

D: 昆布片（碘）

答案：D

18.患者，女，55岁，因“反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸、胃灼热、间断积食”来诊，食管测压提示食管下段括约肌压力小于6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑20mgbid强化抑酸治疗。

A: 适宜餐前30分钟服用

B: 不宜咀嚼

C: 用药后可能出现口干、便秘等不良反应

D: 长期服用可能会出现维生素K缺乏

答案：D

19.属于治疗沙眼的处方药的是

A: 磺胺醋酰钠滴眼剂

B: 红霉素眼膏

C: 硫酸锌滴眼剂

D: 硫酸铜棒

答案：D

20.引起急性细菌性扁桃体炎最常见的致病菌是

A: 大肠埃希菌

B: 肺炎链球菌

C: A组β溶血性链球菌（化脓性链球菌）

D: 金黄色葡萄球菌

答案：C

21.以下有关 γ-GT 检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断心肌梗死

B: 诊断痛风

C: 诊断急慢性白血病

D: 诊断恶性贫血

答案：A

22.中危患者

A: 立即进行抢救治疗

B: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗

C: 立即使用抗高血压药物

D: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗

答案：B

23.处方中"餐后给药"的外文缩写是

A: pc

B: qn

C: po

D: ac

答案：A

24.上市后药品再评价阶段属于

A: Ⅰ期临床试验

B: Ⅳ期临床试验

C: Ⅲ期临床试验

D: Ⅱ期临床试验

答案：B

25.（2017年真题）服用后可致嗜睡,驾驶员应慎用的药物是（）

A：吲达帕胺

B：胰酶

C：氯苯那敏

D：阿司匹林

答案：C

26.属于癌症第二阶梯止痛药物的是

A：美沙酮

B：谷维素

C：二氢可待因

D：对乙酰氨基酚

答案：C

27.患者,女,62岁,2型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难,不宜选用的药物是()

A：格列齐特

B：吡格列酮

C：阿卡波糖

D：二甲双胍

答案：B

28.早晨因咳嗽和打喷嚏引起的头痛，提示可能是

A：动脉瘤

B：脑肿瘤

C：脑膜炎

D: 脑血管意外

答案：B

29.属于浓度依赖性抗生素的是

A: 多黏菌素

B: 美沙拉秦肠溶片

C: 林可霉素

D: 青霉素

答案：A

30.一些药品吸收二氧化碳发生碳酸化

A: 空气

B: 湿度

C: 日光

D: 温度

答案：A

31.患毒,27岁,妊娠20周,出现发热体温最高达38.5℃,体格检查:肾区叩痛,经相关实验室检查诊断为急性肾盂肾炎,宜选用的药物是()

A: 阿奇霉素

B: 阿米卡星

C: 甲硝唑

D: 头孢噻肟钠

答案：D

32.属于选择性5-羟色胺再摄取抑制剂的是

A: 舍曲林

B: 艾司唑仑

C：阿米替林

D：丁螺环酮

答案：A

33.阿托品联用氯解磷定解救有机磷重度中毒的机制是

A：作用于不同的靶点

B：延缓或降低抗药性

C：竞争性拮抗作用

D：促进机体的利用

答案：A

34.阿托品

A：可使驾驶员出现定向力障碍

B：可使驾驶员出现眩晕和幻觉

C：可使驾驶员视物模糊或辨色困难

D：可导致驾驶员多尿或多汗

答案：C

35.使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

A：腹腔注射

B：动脉注射

C：膀胱灌注

D：腔内注射

答案：C

36.在配制静脉输液时，不宜用葡萄糖注射液溶解的药品是

A：两性霉素B

B：盐酸万古霉素

C: 维生素 K

D: 青霉素

答案：D

37.评价三级信息的标准是

A: 索引的完备程度，收载杂志的数量

B: 作者是否为该领域的专家

C: 研究目的是否明确

D: 研究方法是否科学合理

答案：B

38.不得将咨询档案等患者的资料用于商业目的

A: 保护患者的隐私

B: 及时回答不拖延

C: 解释的技巧

D: 特别关注特殊人群

答案：A

39.属于雄激素受体拮抗剂，使增生的前列腺体积缩小的药品

A: 非那雄胺

B: 氟他胺

C: 黄酮哌酯

D: 阿夫唑嗪

答案：B

40.（2017 年真题）处方外文缩写 OU 代表（）

A: 左耳

B: 左眼

C：双眼

D：右耳

答案：C

41.简化治疗方案，有利于

A：提高用药顺应性

B：识别及管理多重用药

C：转变疾病预防和保健观念

D：健康生活方式的教育

答案：A

42.二甲双胍片的适宜服药时间是

A：餐后

B：餐中

C：清晨

D：餐前

答案：B

43.合并三度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

A：维拉帕米

B：卡托普利

C：哌唑嗪

D：多沙唑嗪

答案：A

44.消化不良性腹泻宜选用的药物是

A：双八面体蒙脱石散

B：胰酶

C: 山莨菪碱

D: 双歧三联活菌制剂

答案：B

45.禁与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括（）

A: 三环类药物

B: 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

C: 5-HT1A受体部分激动剂

D: 苯二氮类药物

答案：D

46.二巯丙醇用于解救

A: 氰化物中毒

B: 水银中毒

C: 有机磷中毒

D: 吗啡中毒

答案：B

47.有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是()

A: 比沙可啶

B: 双歧杆菌

C: 硫酸镁

D: 干酵母

答案：A

48.65岁及以上老年人用于骨质疏松症防治时，维生素D剂量可为

A: 2000～4000IU（50～100μg）/d

B: 600IU（15μg）/d

C: 400IU（10μg）/d

D: 8001200IU（20～30μg）/d

答案：D

49.异丙嗪属于

A: 抗组胺药

B: 利尿剂

C: 血管扩张药

D: 镇痛药

答案：A

50.（2018年真题）患者,男,59岁,高血压病史5年,因头痛伴有恶心、呕吐就诊,MRI检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛,早期宜选用的药物（）

A: 尼莫地平

B: 氨氯地平

C: 缬沙坦

D: 硝苯地平

答案：A

51.患者，女，45岁，1年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛，长期服用非甾体抗炎药。医师处方：奥美拉唑肠溶片20mgqd，甲硝唑片0.4gtid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊220mgtid。患者溃疡治愈后，因膝关节疼痛需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡复发风险，首选的预防药物是

A: 奥美拉唑

B: 枸橼酸铋钾

C：替普瑞酮

D：多潘立酮

答案：A

52.“根据用药顺序确定最可疑的致病药物，然后有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物。根据停药后症状的变化情况以确诊”，即可诊断药源性疾病

A：流行病学的调查

B：致病药物的确定

C：排除药物以外的因素

D：询问用药过敏史和家族史

答案：B

53.溶栓作用无选择性，降解纤维蛋白凝块，也降解纤维蛋白原和其他血浆蛋白的药物是

A：华法林

B：噻氯匹定

C：肝素

D：链激酶

答案：D

54.属于胆固醇吸收抑制剂的药物是

A：非诺贝特

B：甲基多巴

C：辛伐他汀

D：依折麦布

答案：D

55.贫血患者常出现()

A：血红蛋白减少

B：血小板计数增多

C：中性粒细胞增多

D：嗜酸性粒细胞增多

答案：A

56.消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A：乳腺癌、机械性肠梗阻患者禁用多潘立酮

B：微生态制剂不可用于消化不良的治疗

C：过量的干酵母和乳酶生可以引起腹泻

D：胰酶片必须用肠溶衣片，口服时不可嚼碎，应整片吞下

答案：B

57.可作为轻度痤疮治疗单独一线用药的是

A：过氧化苯甲酰凝胶

B：维A酸凝胶

C：夫西地酸乳膏

D：水杨酸软膏

答案：B

58.（2016年真题）患者，男，46岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是（）。

A：冠心病

B：心力衰竭

C：双侧肾动脉狭窄

D：痛风

答案：B

59.以下选项中，属于长效类巴比妥类镇静催眠药的是()。

A: 戊巴比妥

B: 苯巴比妥

C: 异丁巴比妥

D: 异戊巴比妥

答案：B

60.每四小时用药一次的外文规范缩写是

A: qod

B: tid

C: qn

D: q4h

答案：D

61.口服吐根糖浆催吐用于解救

A: 巴比妥中毒

B: 丙咪嗪中毒

C: 三唑仑中毒

D: 磷化锌中毒

答案：B

62.结核病化学治疗成功的关键措施是

A: 避免与克服细菌耐药

B: 采用大剂量

C: 采用间歇疗法

D: 采用短程疗法

答案：A

63.急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

A：苯海拉明

B：右美沙芬

C：伪麻黄碱

D：愈创木酚甘油醚

答案：C

64.发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，归属于

A：静脉药物配置

B：治疗药物监测

C：处方审核

D：处方点评

答案：D

65.药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A：依他尼酸合用华法林

B：抗酸药合用四环素类药

C：用药时同服甲氧氯普胺

D：磺胺类药与青霉素合用

答案：A

66.低危患者

A：观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗

B: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗

C: 立即进行抢救治疗

D: 立即使用抗高血压药物

答案：A

67.影响肝药酶活性，药物疗效降低

A: 氨茶碱

B: 胰岛素

C: 呋塞米

D: 地西泮

答案：D

68.过敏性疾病、皮肤病与寄生虫病可呈现

A: 淋巴细胞增多

B: 中性粒细胞增多

C: 单核细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

69.鼻腔黏膜上有丰富的血管、黏液腺的纤毛，鼻中隔前下部也有纤密的毛细胞血管网，当受到刺激、过敏、感染时，鼻黏膜血管迅速扩张和肿胀，出现鼻塞。其常见病因有：感冒、慢性单纯性鼻炎、慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎等。

A: 伪麻黄碱

B: 金刚烷胺

C: 天麻素

D: 双氯芬酸

答案：A

70.服用氨基糖苷类药时应该禁用的是

A：食盐

B：脂肪

C：酒

D：食醋

答案：D

71.溃疡或胃酸过多的人不宜饮用

A：饮茶

B：高盐饮食

C：吸烟

D：咖啡

答案：D

72.有关药历含义的叙述如下，其中最正确的是

A：药师为患者建立的用药档案

B：患者病危抢救时的用药记录

C：供患者报销药费的依据

D：与病历相同，由药师填写

答案：A

73.后记

A：主要实验室数据

B：临床诊断、费别

C：对药物治疗的建设性意见与结果评价

D：医师签名、药品金额

答案：D

74.以维生素C注射液作溶剂溶解后注射的是

A：亚硝酸钠

B：谷胱甘肽

C：盐酸烯丙吗啡

D：双解磷

答案：B

75.血红蛋白检查结果低于正常值即提示贫血。下列检测值可提示“极重度贫血”的是

A：<30g/L

B：30～60g/L

C：60～90g/L

D：>90g/L

答案：A

76.应用氟马西尼可解救的是

A：有机磷中毒

B：氰化物中毒

C：三唑仑中毒

D：铅、汞中毒

答案：C

77.非核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂（）

A：NNRTIs

B：NRTIs

C：PIs

D：FIs

答案：A

78.可引起儿童良性颅压增高、囟门隆起的药物是

A：苯妥英钠

B：抗组胺药

C：维生素 A

D：氯霉素

答案：C

79.作用于 DNA 化学结构的药物是

A：依托泊苷

B：顺铂

C：放线菌

D：培美曲塞

答案：B

80.通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是

A：赖诺普利

B：硝苯地平

C：呋塞米

D：缬沙坦

答案：B

81.脂肪或酪蛋白消化不良（儿童）可呈现

A：鲜血便

B：乳凝块便

C：白陶土便

D：柏油黑便

答案：B

82.贫血患者常出现

A: 血红蛋白减少

B: 中性粒细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 血小板增多

答案：A

83.（2016年真题）患者，女，24岁，患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻，实验室检查：Hb55g/L，血清铁12μg/L，首选的治疗方案是（）。

A: 注射维生素B12

B: 静脉滴注铁剂

C: 口服铁剂及维生素C

D: 雄性激素治疗

答案：B

84.患儿，男，3岁半，身高95cm，体重16kg—天前开始发热，20h左右出现腹泻，约3h—次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。检查结果：体温38.8°C，脉搏118次/分，呼吸28次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数18.5X109/L（参考值4.0X09/L10.0X09/L），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 应避免高脂肪、高糖饮食

B: 每次腹泻后均要少量多次喝水，直至腹泻停止

C: 若患者腹泻加重，可口服补液盐进行补液

D: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星

答案：D

85.根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性减轻疾病症状(一般抑郁症状表现为晨重晚轻)的是

A: 清晨服抗抑郁药

B: 清晨服利尿药

C: 清晨服糖皮质激素

D: 清晨服氨基糖苷类

答案：A

86.中成药血脂康中航油的化学成分是

A: 依折麦布

B: 辛伐他丁

C: 阿托伐他汀

D: 洛伐他丁

答案：D

87.抗菌药物适宜

A: 清晨服用

B: 餐前服用

C: 餐后服用

D: 餐中服用

答案：B

88.苯妥英、地塞米松、地西泮在妊娠26～29周时游离药物浓度达高峰，是由于

A: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低

B: 胃肠活动程度减弱，使吸收减慢

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/107115040052010024