临床医学概论模拟试题库与答案

1、女性，36 岁，因风湿性关节炎引起关节疼痛，在服用阿司匹林时，嘱其饭后服用的目的是

A、减少对消化道的刺激

B、提高药物的疗效

C、降低药物的毒性

D、减少对肾脏的损害

E、避免尿少时析出结晶

答案：A

2、关于 SLE 下列哪项为错误的

A、盘状红斑狼疮可发展为 SLE

B、大多有皮肤损害

C、紫外线可使皮肤症状恶化

D、妊娠期病情好转

E、肾脏损害最常见

答案：D

3、感到液波震颤时，游离腹水量至少需达：

A、1000mL

B、2000mL

C、1500mL

D、2500mL

E、3000-4000mL

答案：E

4、颈内动脉系统 TIA 最常见的症状是

A、眩晕

B、交叉性瘫痪

C、对侧单肢无力

D、单眼失明

E、共济失调

答案：C

5、某患者因耻骨及坐骨支骨折造成尿道滴血，此骨折属于

A、稳定骨折；

B、青枝骨折；

C、开放骨折；

D、闭合骨折；

E、嵌插骨折；

答案：C

6、对消化性溃疡诊断有帮助的病史是：

A、疼痛反复发作

B、疼痛病程长

C、疼痛有节律性

D、痛伴有食欲不振

E、疼痛有放射到肩部

答案：C

7、下列常见体表良性肿瘤中，易发生恶变的是

A、皮肤乳头状疣

B、交界痣

C、皮内痣

D、神经鞘瘤

E、毛细血管瘤

答案：B

8、女性，55 岁，半年内出现 3 次突然不能言语，每次持续 30 分钟左右，第 3 次伴右侧肢体麻木，既往有房颤病史，神经系统检查正常，最可能诊断是

A、癫痫小发作

B、偏头痛

C、颈椎病

D、短暂性脑缺血发作

E、顶叶肿瘤

答案：D

9、随访中首选避孕措施

A、节育环

B、口服避孕药

C、避孕套

D、安全期避孕

E、长效避孕针

答案：C

10、匙状甲多见于：

A、支气管扩张

B、支气管肺癌

C、缺铁性贫血

D、风湿热

E、甲癣

答案：C

11、青少年常见的鼻出血部位是

A、利特尔区

B、吴氏鼻-鼻咽静脉丛

C、鼻中隔后部

D、下鼻甲

E、中鼻甲

答案：A

12、体格检查时，鉴别是否为黄疸，下列判断哪项是正确的？

A、皮肤有黄染肯定是黄疸

B、巩膜有黄染肯定为黄疸

C、巩膜黄染仅出现在角膜缘周围

D、皮肤黄染仅在手掌、足底

E、巩膜均匀黄染

答案：E

13、胸部触诊时语音震颤增强最常见于

A、大叶性肺炎

B、胸壁皮下气肿

C、上腔静脉阻塞综合征

D、支气管肺炎

E、慢性支气管炎

答案：A

14、患者男性，60 岁，因胸痛就诊，既往有心绞痛十年。鉴别急性心肌梗死与心绞痛，症状的主要区别是

A、疼痛持续时间不同

B、疼痛表现不同

C、疼痛部位不同

D、疼痛性质不同

E、引起诱因不同

答案：A

15、骨痂改造塑型达到临床愈合，主要依赖于

A、丰富的骨痂；

B、局部良好的血供；

C、采用中药外洗、理疗、推拿等；

D、坚强的外固定；

E、早期功能锻炼；

答案：D

16、便血伴里急后重可见于

A、胃癌

B、败血症

C、小肠疾病

D、肝癌

E、直肠癌

答案：E

17、诊断丹毒最有意义的临床表现是

A、发热

B、色鲜红界限清楚

C、局部化脓

D、脓毒症

E、腹泻

答案：B

18、腹股沟直疝的疝环为

A、股环

B、直疝三角

C、手术切口

D、脐环

E、腹股沟管内环

答案：B

19、关于肌张力的描述，下列哪项是正确的 ：

A、是指肢体作某种主动运动时肌肉最大的收缩力

B、除肌肉的收缩力外，还可以动作的幅度与速度来衡量

C、肌张力减低时可表现为关节过伸

D、肌张力增加时可表现为关节过伸

E、肌张力减弱见于锥体束损害

答案：C

20、目前提倡的心脏按压频率是

A、80 次/分

B、90-100 次/分

C、140 次/分

D、60-100 次/分

E、100-120 次/分

答案：E

21、肝硬化病人蜘蛛痣、肝掌及男性乳房发育等体征产生的原因是

A、门脉高压症

B、肝功能减退

C、低蛋白症

D、继发性醛固酮增多

E、垂体性腺功能紊乱

答案：B

22、男，50 岁，因车祸导致有胫、腓骨中 1/3 横形并有蝴蝶形碎片骨折，经复位基本达到功能复位要求，石膏外固定 3 月后，X线复查骨折尚未愈合，其原因可能是

A、外固定不确实；

B、年龄偏大；

C、周围软组织损伤严重；

D、骨折段血液供应差；

E、骨折复位不理想；

答案：D

23、诊断甲状腺功能亢进的特征性改变是

A、甲状腺质地柔软

B、甲状腺可随吞咽上下移动

C、甲状腺弥漫、对称 肿大

D、甲状腺肿大，可触及震颤或能听到杂音

E、甲状腺出现结节性改变

答案：D

24、男，18 岁，右足和右小腿被开水烫伤，有水疱伴剧痛。创面基底部肿胀发红，该病人烧伤面积和深度的诊断为

A、5%浅Ⅱ度

B、5%深Ⅱ度

C、10%浅Ⅱ度

D、10%深Ⅱ度

E、15%浅Ⅱ度

答案：C

25、病理性骨折的诊断主要依据是

A、有明确的外伤史；

B、局部有明显肿胀与瘀斑；

C、疼痛与压痛；

D、具有骨折的专有体征之一；

E、X线片检查；

答案：E

26、男，71 岁。乘长途车 2 小时后发现右侧肢体无力。查体:BP180/100mmHg，右侧肢体肌力 1 级， 右侧 Babins ki 征(+)，右侧肢体痛觉、深感觉消失。头颅 CT 示左侧基底节见高密度影。该患者最可能的诊断是

A、基底节梗死

B、脑叶梗死

C、脑栓塞

D、小脑出血

E、脑出血

答案：E

27、防治肺结核，主要应抓好：

A、定期普遍预防性服用 INH

B、进行结核菌素试验普查

C、接种卡介苗及活动性肺结核的化疗

D、劝阻随地吐痰，提倡戒烟

E、凡胸片有改变，均应住院治疗，避免扩散

答案：C

28、对于抑郁症的患者，其最基本的症状为

A、精力明显减退、疲乏

B、无望、无助、无价值

C、自责、自罪、自杀

D、焦虑

E、情绪低落

答案：E

29、急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是以下哪种

A、金黄色葡萄球菌

B、肺炎球菌

C、淋球菌

D、 A 族链球菌

E、流感杆菌

答案：A

30、下列哪项可出现呼气性呼吸困难

A、急性喉炎

B、气管异物

C、急性会厌炎

D、支气管哮喘

E、喉水肿

答案：D

31、下述有关对体表肿瘤的描述中，不正确的是

A、体表肿瘤是指来源于皮肤、皮肤附件、皮下组织与浅表软组织的肿瘤

B、下肢皮肤鳞状细胞癌严重时伴骨髓浸润，常需截肢

C、皮肤基底细胞癌，发展缓慢，呈浸润性生长，常伴有血道或淋巴道转移

D、神经鞘瘤中央型者，手术不慎易切断神经

E、脂肪瘤位于深部者可恶变，应及时切除

答案：C

32、临产观察先露下降程度的标志是

A、耻骨弓

B、骶尾关节

C、坐骨结节水平

D、坐骨棘水平

E、骶骨岬

答案：D

33、治疗肺炎球菌肺炎应首选

A、青霉素+链霉素

B、青霉素

C、先锋霉素

D、灭滴灵

E、庆大霉素

答案：B

34、女,45 岁。间断干咳 3 年,无低热，咯血等，反复抗生素治疗无效。查体无明显阳性体征，胸部 x 线片未见明显异常。最可能的诊断是

A、支原体肺炎

B、支气管结核

C、支气管扩张

D、咳嗽变异性哮喘

E、慢性支气管炎

答案：D

35、患者男，35 岁。大面积烧伤 6 小时入院，首要治疗措施是

A、处理创面

B、镇静止痛

C、扩充血容量

D、控制感染

E、补充营养，增强免疫

答案：C

36、头面部阵发性电击样或撕裂样疼痛多见于：

A、脑供血不足

B、偏头痛

C、三叉神经痛

D、肌紧张性头痛

E、高血压病

答案：C

37、休克抑制期微循环变化主要是

A、动静脉短路开放

B、毛细血管前括约肌舒张

C、毛细血管前括约肌收缩

D、毛细血管后静脉舒张

E、出现弥散性血管内凝血

答案：B

38、易向左锁骨上淋巴结转移的是

A、乳腺癌

B、肺癌

C、胃癌

D、食管癌

E、结肠癌

答案：C

39、男，10 岁。发热 10 天，体温 38～41℃，刺激性咳嗽明显，胸痛。查体：双肺散在干啰音。胸片：左肺下野淡薄片状阴影。首选的药物治疗为

A、青霉素

B、头孢菌素

C、链霉素

D、红霉素

E、无环鸟苷

答案：D

40、肝硬化较早出现的症状是：

A、乏力、纳差

B、腹痛、大便次数增多

C、黄疸

D、出血倾向

E、腹水形成

答案：A

41、以下不适用于 SLE 病人的药物

A、消炎痛

B、雷公藤多苷

C、硫唑嘌呤

D、氯喹

E、雌激素类避孕药

答案：E

42、婴儿腹泻重度脱水的主要诊断依据是

A、皮肤弹性差

B、哭无泪，尿量少

C、眼眶及前囟凹陷

D、外周循环衰竭

E、精神萎靡

答案：D

43、应用氨茶碱治疗支气管哮喘，既能使其发挥最好疗效.又不致产生毒性反应的最有效的方法是( )

A、缓慢肌肉注射

B、缓慢静脉滴注

C、与沙丁胺醇合用

D、与异丙阿托品合用

E、血液药物浓度监测

答案：E

44、青少年时期出现脊柱后凸，多见于 ：

A、佝偻病

、胸椎结核

C、类风湿性脊柱炎

D、骨质退行性变

E、椎间盘脱出

答案：B

45、恶病质是指

A、病危者

B、极度消瘦者

C、被动体位的患者

D、高热昏迷者

E、典型无力型者

答案：B

46、关于膝内、外翻的叙述，下列哪项是不正确的：

A、正常人双脚并拢直立时，两膝及双踝均能靠拢

B□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“O”□□□□□

翻

C□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“X”□□□□□□□□□□□□

称膝外翻

D、膝内、外翻多见于先天性畸形

E、膝内、外翻可见于佝偻病和大骨节病

答案：D

47、产妇进入第二产程后每次听胎心间隔时间约在

A、1～5 分钟

B、5～10 分钟

C、10～20 分钟

D、20～30 分钟

E、30～40 分钟

答案：B

48、发热最常见的原因是

A、 颅脑损伤

B、变态反应

C、 无菌性坏死物质的吸收

D、内分泌与代谢障碍

E、感染

答案：E

、问诊时不恰当的提问是

A、什么情况疼痛加重

B、发病后用过那些药物

C、多在什么情况下发病

D、您的尿液是红色，是吗

E、您哪儿不舒服

答案：D

50、复苏时用药途径首选

A、心内注射

B、静脉注射

C、皮内注射

D、肌肉注射、

E、皮下注射

答案：B

51、确定乳房肿块性质最可靠的方法是

A、溢液涂片

B、钼靶照相

C、乳腺导管造影

D、病理学检查

E、胸部平片

答案：D

52、60 岁甲亢病人，甲状腺III°肿大，高代谢症状严重，肝、肾功能正常。首选的治疗措施为

A、立即手术

B、立即 131I 治疗

C、复方碘溶液治疗 2 周后手术

D、抗甲状腺药物控制症状后手术

E、抗甲状腺药物长期治疗

答案：D

53、原位癌的主要特征是

A、发生于粘膜、表皮和腺体

B、癌细胞占据上皮全层，但基底膜仍完整

C、可以治愈

D、上皮内出现异型性的细胞

E、胃粘膜内癌是一种原位癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/108016073035006035