

外科护理一（总论、颅脑、甲乳、胸部、泌尿）复习题 与答案

1. 患者男，60 岁。由于严重恶心呕吐导致急性 消化液大量丢失。医生开具以下医嘱，应首

先为该患者输入的是

- A. 5%NaHCO₃ 溶液
- B. 平衡盐溶液(正确答案)
- C. 3%氯化钠溶液
- D. 5%葡萄糖溶液
- E. 10%葡萄糖溶液

2. 患者，女性，61 岁。风湿性瓣膜病，因心源性水肿医嘱给予噻嗪类利尿药治疗，护士执行医嘱后应重点预防（）

- A. 低钾血症(正确答案)
- B. 高钠血症
- C. 低钠血症
- D. 高钾血症
- E. 低镁血症

3. 长期服用利尿剂(呋塞米)的心衰患者，护士应当最关注的不良反应是（）

- A. 低血压
- B. 低血钾(正确答案)
- C. 低血钠
- D. 脱水
- E. 发热

4. (16 真题) 某患者因腹泻、呕吐入院，心电图：ST 段水平压低，T 波倒置，U 波增高，最可能的病因是

- A. 高钾血症
- B. 低钾血症(正确答案)
- C. 高钙血症
- D. 洋地黄效应
- E. 洋地黄中毒

5. 患者，男性，61 岁。急性肾衰竭少尿期。患者呼吸困难，头痛，软瘫，腹胀，心电图示：T 波高尖，QRS 间期延长。考虑可能的情况是（）

- A. 低蛋白血症
- B. 高钾血症(正确答案)
- C. 低钙血症
- D. 代谢性碱中毒
- E. 代谢性酸中毒

6. 在静脉补钾时，200ml 生理盐水中最多可加入 10%氯化钾的量是（）

- A. 12ml
- B. 10ml
- C. 8ml
- D. 6ml(正确答案)
- E. 3ml

7. 高钾血症引起心律失常时，静脉注射应首选的药物是（）

- A. 10%硫酸镁溶液
- B. 5%碳酸氢钠溶液
- C. 5%氯化钙溶液+等量 5%葡萄糖溶液(正确答案)
- D. 利尿剂
- E. 5%葡萄糖溶液+胰岛素

8. 患者女，腹泻 2 天，来院时精神弱，口唇樱红，呼吸深快，呼气有酮味，考虑（）

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 呼吸性碱中毒

C. 代谢性酸中毒(正确答案)

D. 代谢性碱中毒

E. 混合性碱中毒

9. 患者女，23 岁，患有哮喘，发作时呼吸浅快，查血 PaCO₂ 下降，pH 值升高，该患者最可能发生了（）

A. 代谢性碱中毒

B. 呼吸性碱中毒(正确答案)

C. 呼吸性酸中毒

D. 代谢性酸中毒

E. 呼酸合并代碱

10. 患者男，45 岁。慢性肾衰竭尿毒症期。因酸中毒给予 5%碳酸氢钠 250ml 静滴后出现手足抽搐，最可能的原因是发生了（）

A. 低血钾

B. 低血钙(正确答案)

C. 高钠血症

D. 碱中毒

E. 脑出血

11. 某患者因慢性心功能不全长期服用噻嗪类利尿剂，最近出现腹胀、乏力的表现，查体：肠鸣音减弱。该患者最可能发生了（）

A. 低钾血症(正确答案)

B. 低氯血症

C. 脱水症

D. 低钙血症

E. 低钠血症

12. 患儿男，2 岁。食入不洁食物后，出现腹痛，伴恶心、呕吐，腹泻 10 余次/日，出现脱水症状，初步诊断为“细菌性食物中毒”。下列有关液体疗法补液原则，错误的是（）

A. 先快后慢

- B. 先浓后谈
- C. 见尿补钾
- D. 先少后多(正确答案)
- E. 先盐后糖

13. 患儿女，8个月，腹泻2天，无尿6小时。大便呈蛋花汤样，每日10余次，精神萎靡，呼吸深快，皮肤弹性差，口腔黏膜干燥，前囟和眼眶明显凹陷，口唇呈樱桃红色。实验室检查：血钾 3.0mmol/L ，血钠 138mmol/L ， HCO^- 14mmol/L 。该患儿可能发生了（）

- A. 呼吸性碱中毒
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 混合性酸碱紊乱
- D. 代谢性碱中毒
- E. 代谢性酸中毒(正确答案)

14. 患者女，23岁，患有哮喘，发作时呼吸浅快，查血 PaCO_2 下降，pH 值升高，该患者最可能发生了（）

- A. 代谢性碱中毒
- B. 呼吸性碱中毒(正确答案)
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 代谢性酸中毒
- E. 呼酸合并代碱

15. 患者女，烧伤后休克期。护士调整补液速度最有效的观察指标为（）

- A. 意识
- B. 脉搏
- C. 血压
- D. 末梢循环
- E. 尿量(正确答案)

16. 患者男，30岁。因外伤大出血入院。查体：体温 36°C ，脉搏 80 次/分，呼吸 27 次/分，血压 $83/50\text{mmHg}$ 。患者正确的卧位是（）

- A. 抬高头胸部 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$, 抬高下肢 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$
- B. 抬高头胸部 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$, 抬高下肢 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- C. 抬高头胸部 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$, 抬高下肢 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- D. 抬高头胸部 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$, 抬高下肢 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$
- E. 抬高头胸部 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$, 抬高下肢 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ (正确答案)

17. 感染性休克的肺炎患者血容量已补足的证据不包括 ()

- A. 口唇红润
- B. 尿量 $>30\text{ml/h}$
- C. 收缩压 $>90\text{mmHg}$
- D. 肢端温暖
- E. 尿比重 <1.018 (正确答案)

18. 患者女, 29 岁。因“寒战、高热、胸痛 1 天”入院, 诊断为肺炎球菌肺炎, 次日体温骤降, 伴四肢厥冷, 意识模糊, 脉搏细速, 123 次/分, 血压 $80/42\text{mmHg}$. 对该患者的护理措施, 错误的是 ()

- A. 迅速建立静脉通道
- B. 热水袋保暖 (正确答案)
- C. 遵医嘱滴入低分子右旋糖酐
- D. 去枕平卧
- E. 高流量吸氧, 保持呼吸道通畅

19. 患者行局部麻醉下肛周脓肿手术, 进入手术室时, 患者常出现的心理反应是 ()

- A. 兴奋
- B. 恐惧 (正确答案)
- C. 烦躁
- D. 忧郁
- E. 愤怒

20. 患者诊断为痢时, 最可能出现下列哪项血常规检查结果 ()

- A. 嗜酸粒细胞增加

- B. 淋巴细胞计数增加
- C. 网织红细胞计数增加
- D. 中幼粒细胞计数增加
- E. 中性粒细胞比例增加(正确答案)

21. 急性蜂窝织炎患者应用抗生素治疗，选择抗生素最理想的依据是（）

- A. 感染发生部位
- B. 感染的严重程度
- C. 药物敏感试验结果(正确答案)
- D. 患者的抵抗力
- E. 病菌的类型

22. 患者女，30岁。下肢急性蜂窝织炎伴全身感染症状，需采血做抗生素敏感试验。最佳的采血时间应是在患者（）

- A. 寒战时(正确答案)
- B. 高热时
- C. 发热间歇期
- D. 静脉滴注抗生素时
- E. 抗生素使用后

23. 急性淋巴管炎患者首选的抗生素是（）

- A. 庆大霉素
- B. 青霉素(正确答案)
- C. 头孢菌素
- D. 卡那霉素
- E. 氨苄西林

24. 患者女，68岁。因面部肿块疼痛来诊。诊断面部疖肿。与患者的疾病相关度最低的健康史内容是（）

- A. 局部受伤史
- B. 糖尿病史
- C. 营养状况

D. 卫生习惯

E. 家族史(正确答案)

25. 挤压面部“危险三角区”未成熟的疖，最严重的后果是（）

A. 鼻部感染

B. 化脓性海绵状静脉窦炎(正确答案)

C. 面部肿胀

D. 形成痈

E. 留疤痕

26. 患者，男性，27岁，3d前上嘴唇出现肿胀，后局部出现多个脓头，诊断为唇痈。下列治疗方法不恰当的是（）

A. 让病人充分休息

B. 饮食以流食为主

C. 全身使用抗生素

D. 局部药物外敷

E. 早期切开减压(正确答案)

27. 患者男，68岁。因颈部蜂窝织炎入院，医嘱给予气管切开。操作前，护士向其解释该措施的目的是预防（）

A. 窒息(正确答案)

B. 肺不张

C. 全身感染

D. 吞咽困难

E. 化脓性海绵状静脉窦炎

28. 与丹毒的临床表现不相符合的是（）

A. 多有寒战、高热

B. 局部烧灼样疼痛

C. 与正常皮肤界限不明显(正确答案)

D. 局部肤色鲜红

E. 一般不化脓

29. 脓性指头炎典型的临床表现是（）

- A. 手指发麻
- B. 搏动性疼痛(正确答案)
- C. 寒战、发热
- D. 晚期疼痛加剧
- E. 晚期指头明显发红、肿胀

30. 关于脓性指头炎切开引流的叙述，正确的是（）

- A. 在波动最明显处切开
- B. 在患指侧面横形切开
- C. 在患指侧面纵形切开(正确答案)
- D. 在患指背侧切开
- E. 在患指掌侧切开

31. 评估反复发作“痈”患者的发病信息最重要的是（）

- A. 糖尿病病史(正确答案)
- B. 急性损伤病史
- C. 急性中毒病史
- D. 慢性肾衰病史
- E. 慢性呼衰病史

32. 患者男，50 岁，患急性蜂窝织炎收治入院，对患者的健康教育中，错误的是（）

- A. 防止损伤
- B. 加强营养
- C. 及时就医
- D. 注意皮肤卫生
- E. 局部热敷(正确答案)

33. 患者男，35 岁。劳动时左前臂被玻璃划伤 4 天，伤口近侧皮肤出现“红线”并有压痛。考虑其并发了（）

- A. 皮炎

B. 淋巴结炎

C. 动脉炎

D. 静脉炎

E. 淋巴管炎(正确答案)

34. 患者男，24 岁。因破伤风入院治疗。下列护理措施正确的是（）

A. 若进食有困难，可将流质食物缓缓灌入

B. 房间需暗化环境、避光(正确答案)

C. 对患者实行保护性隔离

D. 需进食低脂、低维生素饮食

36. 患者女，28 岁。被狗咬伤半小时，现患者紧张不安、声音颤抖、呼吸急促、手脚冰凉，此时患者最主要的心理问题是（）

A. 自卑

B. 恐惧(正确答案)

C. 绝望

D. 抑郁

E. 焦虑

37. 患儿男，10 岁，因钉子扎伤致破伤风，护士对家属进行健康教育，正确的是（）

A. 可以带音乐播放器，给他听音乐，分散注意力

B. 可以多来几个亲属陪陪他，以免他感到孤单害怕

C. 每天给他做一下全身按摩，让他感到舒适

D. 我们会给他安排单人隔离房间，保持环境安静(正确答案)

E. 每天带患儿去晒晒太阳，这会让他心情舒畅一些

38. 患者男，25 岁。左足癣处红肿伴脓性分泌物 5 天，经相关检查诊断为“急性管状淋巴管炎”。下列护理措施正确的是（）

A. 足癣处换药处理，暂不需使用抗生素

B. 加强病情观察，防止感染扩散引起丹毒

C. 放平患肢，卧床休息，防止感染扩散

- D. 注意个人卫生，足癣处切开引流
- E. 积极处理原发病灶，足癣处换药处理(正确答案)

39. 患者男，25 岁。左足癣处红肿伴脓性分泌物 5 天，经相关检查诊断为“急性管状淋巴管炎”。急性管状淋巴管炎的特征性表现是（）

- A. 患肢肿胀、压痛、活动受限
- B. 可发生接触性传染
- C. 病灶近心端出现一条或多条“红线”(正确答案)
- D. 好发于面部、背部和臀部
- E. 全身不适，畏寒、发热

40. 破伤风病人出现强直性肌痉挛，一般最先累及的肌群是（）

- A. 咀嚼肌(正确答案)
- B. 面肌
- C. 颈肌
- D. 背腹肌
- E. 四肢肌

41. 患者女，70 岁。3 天前因指甲剪得过深发生损伤，指甲一侧皮肤组织红肿、疼痛，未形成脓肿。处理措施不包括（）

- A. 切开引流(正确答案)
- B. 红外线照射
- C. 局部热敷
- D. 鱼石脂软膏外敷
- E. 抬高患肢

42. 患者男，50 岁。因下腹部皮肤局部红肿，疼痛收治入院，查体见皮肤进行性坏死，触之有捻发音，考虑为（）

- A. 疔
- B. 丹毒
- C. 急性淋巴结炎
- D. 痈

E. 急性蜂窝织炎(正确答案)

43. 患者女，50 岁。足背部感染后下肢皮肤出现一条“红线”并有压痛，对患者的指导内容错误的是（）

A. 局部加压包扎(正确答案)

B. 避免外伤

C. 保持皮肤清洁

D. 加强营养

E. 抬高

44. 患者女，42 岁。糖尿病史 3 年。近日先后出现左鼻翼、背部等多处红、肿、痛的小结节。护理措施错误的是（）

A. 挤压小结节(正确答案)

B. 给予高蛋白饮食

C. 让患者卧床休息

D. 监测血糖值

E. 保持皮肤清洁高患肢

45. 患儿男，13 岁。因破伤风发作入院。患儿神志清楚，全身肌肉阵发性痉挛。护士在为其进行病室环境准备时，不符合病情要求的是（）

A. 工作人员活动时做到“四轻”

B. 病室温度调至 18℃~22℃

C. 病室相对湿度维持 50%~60%

D. 门椅脚钉上橡胶垫

E. 病室光线充足(正确答案)

46. 患者男，46 岁。建筑工人，入院时诊断为破伤风。以下与本病最有关的既往史是（）

A. 糖尿病病史

B. 工作时被钉子扎伤过(正确答案)

C. 高血压家族史

D. 吸烟 20 年

E. 对花粉过敏

47. 患者，男性，59 岁，2h 前不慎被连刀割伤手指，伤口较深，为预防破伤风的发生下列哪种处理时最有效的（）

A. 给病人注射破伤风类毒素

B. 给病人注射破伤风抗毒素

C. 彻底清创

D. 彻底清创并给病人注射破伤风抗毒素(正确答案)

E. 给病人注射青霉素

48. 患者男，20 岁。足底刺伤后发生破伤风，频繁抽搐，控制痉挛的主要护理措施是（）

A. 住单人隔离病室

B. 限制亲属探视

C. 避免声、光刺激

D. 按时用镇静剂，集中护理(正确答案)

E. 静脉滴注破伤风抗毒素

49. 护士为破伤风患者处理伤口后，换下的敷料应（）

A. 统一(集中)焚烧(正确答案)

B. 高压灭菌

D. 日光曝晒

E. 浸泡消毒

50. 患者男，20 岁。铁打扎伤 1 周后，出现张口受限、苦笑面容、角弓反张，抽搐频繁，护理措施不正确的是（）

A. 注射破伤风抗毒素

B. 保持病室安静避光

C. 病情严重时少食多餐(正确答案)

D. 密切观察病情

E. 做好消毒隔离

51. 患儿男，10 岁，因钉子扎伤致破伤风，护士对家属进行健康教育，正确的是（）

- A. 可以带音乐播放器，给他听音乐，分散注意力
- B. 可以多来几个亲属陪陪他，以免他感到孤单害怕
- C. 每天给他做一下全身按摩，让他感到舒适
- D. 我们会给他安排单人隔离房间，保持环境安静(正确答案)
- E. 每天带患儿去晒晒太阳，这会让他心情舒畅一些

52. 患者女，56 岁。在路上行走时不慎绊倒，手掌、手腕部、膝盖部挫伤。局部处理方法错误的是（）

- A. 局部制动
- B. 抬高患肢
- C. 血肿加压包扎
- D. 早期局部热敷(正确答案)
- E. 血肿若进行性增大，需切开止血

53. 患者女，25 岁。右小腿有 10cm5cm 的肉芽组织水肿创面。换药时应选用的湿敷药液是（）

- A. 等渗盐水
- B. 0.02%呋喃西林溶液
- C. 0.1%依沙吖啶溶液
- D. 含氯硼酸溶液
- E. 5%氯化钠溶液(正确答案)

54. 下列哪种浅平肉芽创面需用手术剪将其剪平，以利创缘新生上皮生长（）

- A. 健康肉芽组织
- B. 肉芽生长过度(正确答案)
- C. 肉芽水肿
- D. 慢性溃疡面肉芽
- E. 脓腔伤口肉芽

55. 患者女，35 岁。双手深Ⅱ度烧伤康复期。护士指导其双手平时正确的放置位置是（）

- A. 握拳位
- B. 半握拳位(正确答案)
- C. 伸直位
- D. 半伸直位
- E. 双手互握

56. 患者女，27 岁。因体表面积 40% 烧伤入院。护士向患者解释创面局部涂抹磺胺嘧啶银的目的，错误的是（）

- A. 促进创面干燥
- B 促进创面结痂
- C. 促进创面愈合
- D. 控制感染
- E. 防止出血(正确答案)

57. 患者女，38 岁。大面积烧伤后 5 小时入院，心率 120 次/分，血压 70/50mmHg，尿少。发生上述情况最可能的原因是（）

- A. 大量红细胞丧失造成肺换气功能障碍
- B. 大量水分蒸发造成脱水
- C. 疼痛导致的生理反应
- D. 大量体液从血管内渗出引起低血容量休克(正确答案)
- E. 创面细菌感染造成感染性休克

58. 大面积烧伤后 2 天(48h)内，最主要的全身改变是（）

- A. 急性呼吸衰竭
- B. 脓毒血症
- C. 低血容量性休克(正确答案)
- D. 急性肾功能衰竭
- E. 应激性溃疡

59. 患儿男，8岁。开水烫伤，双下肢有水疱，剧痛，胸腹部为红斑。估计该患儿Ⅱ度烫伤面积是（）

- A. 20%
- B. 41%
- C. 42%(正确答案)
- D. 46%
- E. 59%

60. 用新九分法评估成人烧伤面积，错误的是（）

- A. 头、面、颈部各为3%
- B. 双上臂为6%(正确答案)
- C. 躯干为27%
- D. 双臀为5%
- E. 双前臂为6%

61. 患儿女，3岁。不慎被蜡烛烧伤左手。烫伤部位局部红肿，有一个约2cm×2cm大水疱，其周边有3-5个小水疱。该患儿的烧伤深度为（）

- A. I°烧伤
- B. II°烧伤(正确答案)
- C. III°烧伤
- D. 重度烧伤
- E. 特重度烧伤

62. 患者男，28岁，被热油烫伤，头、面、颈部，双手，双上肢和胸腹部均有大面积水泡，伤处水肿明显。估计该患者烧伤面积和烧伤深度应该是（）

- A. 浅Ⅱ度烧伤，面积45%
- B. 浅Ⅱ度烧伤，面积40%(正确答案)
- C. 深Ⅱ度烧伤，面积45%
- D. III度烧伤，面积40%
- E. 浅Ⅱ度烧伤，面积50%

63. 患者男，22 岁。因火灾致面部烧伤入院。体检发现，病人声音嘶哑，口鼻处有黑色分泌物，鼻毛烧焦。该患者目前最主要危险是（）

- A. 呼吸衰竭
- B. 肺部感染
- C. 肺水肿
- D. 窒息(正确答案)
- E. 呼吸性酸中毒

64. 患者女，烧伤后休克期。护士调整补液速度最有效的观察指标为（）

- A. 意识
- B. 脉搏
- C. 血压
- D. 末梢循环
- E. 尿量(正确答案)

患者女，16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。采用中国新九分法估计该患者的烧伤面积约为(C)

- A. 18%
- B. 21%
- C. 24%(正确答案)
- D. 27%
- E. 54%

66、患者女，16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。患者的烧伤严重程度是（）

- A. 轻度
- B. 中度(正确答案)
- C. 中重度
- D. 重度
- E. 特重度

67. 患者女，16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。根据患者烧伤部位的特点，护士应重点观察（）

- A. 呼吸功能(正确答案)
- B. 上肢血液循环
- C. 意识
- D. 疼痛程度
- E. 血压

68. 患者女，16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。不正确的补液方案是（）

- A. 尽早开始
- B. 见尿补钾
- C. 先晶后胶
- D. 先糖后盐(正确答案)
- E. 先快后慢

69. 患者入院第 5 天出现发热，体温 39.2℃，创面有黄绿色分泌物伴有恶臭味，引起感染的细菌考虑为（）

- A. 溶血性链球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 铜绿假单胞菌(正确答案)
- E. 梭形芽胞

70. 患者经 1 个月的治疗拟于近日出院，由于烧伤部位瘢痕较严重，患者自觉不愿见人，不想离开医院。对其采取护理措施不妥的是（）

- A. 理解患者病倾听其诉说
- B. 动员尽快出院(正确答案)
- C. 介绍后期整形美容治疗方法
- D. 鼓励自理，增强独立性
- E. 不回避问题，尽量稳定情绪

71. 患者女，6 岁。全身大面积开水烫伤送来急诊。四肢、后背大面积烫伤，创面红肿、大水疱，未受伤范围包括头、面部、颈部，以及前胸、腹部约 8 个手掌大的皮肤、估计其烧伤面积为（）

- A. 63%
- B. 67%
- C. 73%
- D. 77%(正确答案)
- E. 83%

72. 患者男，18 岁。右足、右小腿、右大腿外侧被开水烫伤，有水疱伴剧痛，创面基底部肿胀发红。该患者烧伤面积和深度判断为（）

- A. 15% 浅 II 度(正确答案)
- B. 24% 浅 II 度
- C. 19% 浅 II 度
- D. 19% 深 II 度
- E. 24% 深 II 度

73. 患者男，36 岁。火灾致全身 56%皮肤深 II 度~III 度烧伤。应采取的隔离措施为（）

- A. 接触性隔离
- B. 血液-体液隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 胃肠道隔离
- E. 保护性隔离(正确答案)

74. 患者男，38 岁、双手和双膝关节以下被开水烫伤 4h, 创面明显水肿，剧烈疼痛，局部有大小不等的水疱。该患者烫伤深度达到了（）

- A. 真皮乳头层(正确答案)
- B. 皮下组织
- C. 真皮全层
- D. 皮肤全层

E. 表皮浅层

75. 患者男, 38 岁、双手和双膝关节以下被开水烫伤 4h, 创面明显水肿, 剧烈疼痛, 局部有大小不等的水疱。其烧伤深度和面积是 ()

A. 深 II 度 15%

B. 浅 II 度 25%(正确答案)

C. I 度 10%

D. III 度 25%

E. 浅 II 度 15%

76. 对头面部烧伤的患特进行护理评估时, 应特别警惕是否伴有 ()

A. 口腔烧伤

B. 呼吸道烧伤(正确答案)

C. 眼部烧伤

D. 耳部烧伤

E. 面颊烧伤

77. 浅 II 度烧伤创面的临床表现是 ()

A. 感觉迟钝, 创面苍白, 有水疱

B. 剧痛, 创面潮红, 无水疱

C. 剧痛, 创面潮红, 有水疱(正确答案)

D. 感觉迟钝, 创面苍白, 无水疱

E. 感觉消失, 创面蜡白, 无弹力

78. 患儿女, 15 岁, 双下肢不慎被开水烫伤半小时来院。由于疼痛、害怕, 患儿情绪激动, 哭闹不止。以下措施不正确的是 ()

A. 适量给予镇静剂

B. 耐心劝说其口服淡盐水

C. 等待患儿平静时再救助(正确答案)

D. 适量给予止痛剂

E. 安慰鼓励患儿

79. 神经毒的毒蛇咬伤的临床表现不包括 ()

A. 出血倾向(正确答案)

B. 胸闷气促

C. 肢体软瘫

D. 视力模糊

E. 言语不清

80. 患儿男，8岁，因被邻居家的宠物犬咬伤小腿就诊。接诊护士询问其在家中处理方法并检查伤口，告知其不正确的处理方法是（）

A. 立即包扎伤口(正确答案)

B. 用力挤压伤口周围软组织

C. 患肢下垂

D. 冲洗后用 75%乙醇消毒伤口

E. 立即就地用大量清水冲洗

81. 脑损伤患者快速静脉滴注 20%甘露醇的主要作用是（）

A. 扩张血管

B. 预防感染

C. 镇静镇痛

D. 营养神经

E. 改善脑水肿(正确答案)

82. 患者男，29岁，因车祸急诊入院，患者意识丧失，无自主动作，压迫眼眶有躲避反应，此时患者的意识障碍属于（）

A. 深昏迷

B. 浅昏迷(正确答案)

C. 嗜睡

D. 昏睡

E. 谵妄

83. 患者男，20岁，头部被木棒击伤后昏迷 12 分钟，清醒后诉头痛并呕吐 1 次。入院后，若患者出现急性颅内压增高，伴随其出现的生命体征应是（）

A. 血压升高，脉搏加快，呼吸急促

B. 血压升高，脉搏缓慢，呼吸深慢(正确答案)

C. 血压升高，脉搏加快，呼吸深慢

D. 血压下降，脉搏缓慢，呼吸深慢

E. 血压下降，脉搏细速，呼吸急促

84. 患者男，40 岁。因脑外伤住院。住院后患者出现脑疝征兆，立即输入 20% 甘露醇治疗，其目的是（）

A. 降低血压

B. 升高血压

C. 降低颅内压(正确答案)

D. 升高颅内压

E. 增加血容量

85. 患者男，25 岁。因脑撞裂伤入院。医嘱给予应用肾上腺皮质激素治疗。其目的是（）

A. 减轻脑出血

B. 减轻脑水肿(正确答案)

C. 预防应激性溃疡

D. 预防继发感染

E. 预防肌痉挛

86. 患者男，28 岁。颅脑外伤术后脑水肿，给予 20%甘露醇 250ml 静脉输液。最佳的输液速度是（）

A . 20 滴/分

B. 40 滴/分

C. 60 滴/分

D. 80 滴/分

E. 100 滴/分(正确答案)

87. 患者女，68 岁，头部外伤后头痛，呕吐三小时后入院。血压 100/70mmHg，头颅 CT 提示硬膜外血肿，护士告知患者要保持大便通畅，勿用力排便，其主要目的是（）

- A. 防止血压升高
- B. 预防痔疮
- C. 缓解头痛
- D. 防止出血
- E. 预防脑疝(正确答案)

88. 患者男, 50 岁。应钝器击伤头部 1 小时入院. 患者昏迷, 呕吐, 双侧瞳孔不等大。血压 180/102 mmHg。行硬膜下血肿清除术+碎骨片清除术, 留置引流管送回病房。术后引流管护理正确的措施是 ()

- A. 每天消毒引流管
- B. 保持引流管通畅(正确答案)
- C. 脱出要及时送入
- D. 定时冲洗引流管
- E. 每天更换引流管

89. 患者男, 50 岁。应钝器击伤头部 1 小时入院. 患者昏迷, 呕吐, 双侧瞳孔不等大。血压 180/102 mmHg。行硬膜下血肿清除术+碎骨片清除术, 留置引流管送回病房。医嘱:250ml 甘露醇快速滴入, 滴完的时间是 ()

- A. 5 分钟内
- B. 30 分钟内(正确答案)
- C. 60 分钟内
- D. 90 分钟内
- E. 90 分钟以上

90. 患者, 女性, 52 岁。被飞速行驶的摩托车撞倒后伤及头部半小时入院。患者目前意识不清、喷射性呕吐, 查体: 双侧瞳孔等大等圆, 血压 185/110mmHg。急诊开颅行颅内血肿清除术及碎骨片清除术, 留置引流管后回病房。术后引流管护理正确的措施 ()

- A. 定时消毒、挤压引流管
- B. 翻身时无需夹闭引流管
- C. 引流管开口高于侧脑室平面 10~15cm(正确答案)

- D. 定时冲洗引流管
- E. 引流管脱出应重新插入

91. 患者男，60 岁。诊断颅内左大脑半球肿瘤入院。入院当晚患者突发剧烈咳嗽致颅内压增高，发生小脑幕切迹疝。突发脑疝时，患者瞳孔最早发生的改变是（）

- A. 对侧瞳孔缩小
- B. 患侧瞳孔缩小(正确答案)
- C. 对侧瞳孔散大
- D. 双侧瞳孔散大
- E. 患侧瞳孔散大

92. 患者男，60 岁。诊断颅内左大脑半球肿瘤入院。入院当晚患者突发剧烈咳嗽致颅内压增高，发生小脑幕切迹疝。生命体征的变化为（）

- A. 呼吸不规则，脉搏快慢不一(正确答案)
- B. 呼吸浅而慢，脉搏变快
- C. 呼吸浅而快，脉搏变慢
- D. 呼吸深而快，脉搏变快
- E. 呼吸深而慢，脉搏变快

93. 患者男，60 岁。诊断颅内左大脑半球肿瘤入院。入院当晚患者突发剧烈咳嗽致颅内压增高，发生小脑幕切迹疝。降低颅内压的首选药物是（）

- A. 地塞米松
- B. 速尿
- C. 50%葡萄糖
- D. 阿司匹林
- E. 20%甘露醇(正确答案)

94. 关于 Glasgow 昏迷量表的叙述，正确的是（）

- A. 自发性睁眼反应评分为 5 分
- B. 包括睁眼反应、语言反应、针刺反应 3 个子项目
- C. 按意识障碍的差异分为轻、中、重三度，其中中度为 9~12 分(正确答案)

D. 评分低于 3 分者为昏迷

E. 总分范围为 4~15 分，15 分表示意识清醒

95. 患者女，70 岁。颅脑损伤后出现颅内高压，现剧烈头痛、呕吐、烦躁不安、便秘，护士对该患者家属进行健康教育，正确的是（）

A. 给予普通饮食，无须限制钠盐摄入

B. 多饮水，保持电解质平衡

C. 高压灌肠，缓解便秘

D. 协助患者取端坐位，有利于颅内静脉回流

E. 稳定患者情绪，避免情绪剧烈波动(正确答案)

96. 患者男，75 岁。高血压病史 15 年。2 小时前与家人争吵后突然出现头痛、呕吐，跌倒在地，后急诊入院。查体：血压 190/110mmHg，嗜睡。头颅 CT：右侧基底节区高密度影。护士为患者抬高头部 15°~30° 的主要目的是（）

A. 增加回心血量

B. 减轻脑水肿(正确答案)

C. 有利于呼吸

D. 防止呕吐物误吸

E. 降低血压

97. 患者女，70 岁。今晨出现昏迷，急诊入院。既往有高血压病史，入院后一直处于昏迷状态，呼之不应，血压为 190/95mmHg。护士评估时，发现患者瞳孔侧散大，提示患者可能出现了（）

A. 脑出血

B. 药物中毒

C. 肿瘤

D. 颅内压增高

E. 脑疝(正确答案)

98. 患者女，70 岁。今晨出现昏迷，急诊入院。既往有高血压病史，入院后一直处于昏迷状态，呼之不应，血压为 190/95mmHg。应给予患者的体位是（）

A. 平卧位

B. 头高足低位(正确答案)

C. 侧卧位

D. 头低足高位

E. 半坐卧位

99. 患者女，70 岁。今晨出现昏迷，急诊入院。既往有高血压病史，入院后一直处于昏迷状态，呼之不应，血压为 190/95mmHg。夜班护士接班后评估患者情况，发现患者对痛觉有反应，瞳孔对光反射存在，生命体征无明显变化。此时患者意识状态属于（）

A. 意识模糊

B. 深昏迷

C. 浅昏迷(正确答案)

D. 昏睡

E. 嗜睡

100. 关于对头皮撕脱伤患者急救的叙述，不正确的是（）

A. 撕脱部位加压包扎止血

B. 将撕脱的头皮浸泡在 75%乙醇中消毒(正确答案)

C. 保护创面，避免污染

D. 严密观察休克征象

E. 迅速送往医院进行抢救

101. 某女，工作期间长发被卷入转动的机器，造成头皮完全撕脱，下列对脱落头皮处理方法正确的是（）

A. 用清水清洗后，隔水放置于有冰容器中送医院

B. 用冰包裹后，隔水放置于容器中送医院

C. 用无菌敷料包裹后，隔水放置于有冰容器中，送医院(正确答案)

D. 用生理盐水清洗后送医院

E. 不需要保留

102. 患者男，40 岁。交通事故致伤，头顶部有直径约 10cm 血肿，意识清楚，恶心、呕吐。急救处置不包括（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108060036040006106>