

福建省同安区 2024 年《执业药师之西药学专业二》资格考试通关秘籍题库有完整答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列药物组合有协同作用的是

- A: 青霉素+螺旋霉素
- B: 青霉素+四环素
- C: 青霉素+庆大霉素
- D: 青霉素+氯霉素

答案：C

2. 阿司匹林抗血栓形成的机制是

- A: 使环氧酶失活，减少 TXA₂ 生成，产生抗血栓形成作用
- B: 降低凝血酶活性
- C: 直接对抗血小板聚集
- D: 激活抗凝血酶

答案：A

3. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞药的是()

- A: 硝苯地平
- B: 氨氯地平
- C: 维拉帕米
- D: 尼莫地平

答案：C

4. 关于使用依折麦布的说法，错误的是

- A: 成人剂量一次 10mg。一日 1 次
- B: 可单独服用或与他汀类联合应用
- C: 需空腹服用
- D: 剂量超过 10mg / d 对降低 LDL 水平无增效作用

答案：C

5. 散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

- A: 碘苷滴眼液
- B: 左氧氟沙星滴眼液
- C: 复方托吡卡胺滴眼液
- D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：C

6. 可减少妊娠子宫兴奋，用于治疗先兆性流产和习惯性流产的药物是

- A: 孕激素
- B: 短效口服避孕药
- C: 雌激素
- D: 长效避孕药

答案：A

7. 属于浓度依赖性抗菌药物的是

- A: 庆大霉素
- B: 氨曲南
- C: 头孢西丁
- D: 拉氧头孢

答案：A

8. 全身用药毒性大，仅局部用的抗病毒药是()

- A: 碘苷
- B: 阿昔洛韦
- C: 金刚烷胺
- D: 阿糖腺苷

答案：A

9. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 胸部 CT
- B: 血常规
- C: 腹部 B 超
- D: 茶碱血药浓度

答案：D

10. 新生儿出血宜选用

- A: 维生素 B12
- B: 肝素
- C: 维生素 K1
- D: 香豆素类

答案：C

11. 下述质子泵抑制剂中对氯吡格雷疗效影响最小的是

- A: 泮托拉唑
- B: 右兰索拉唑
- C: 奥美拉唑
- D: 埃索美拉唑

答案：B

12. 用于防止排异反应、糖皮质激素不能长期缓解的多种自身免疫性疾病的是()

- A: 环孢素
- B: 环磷酰胺
- C: 硫唑嘌呤
- D: 甲泼尼龙

答案: B

13. 可拮抗维生素 B6 或增加维生素 B6 经肾脏排泄，引起贫血或周围神经炎的是

- A: 糖皮质激素
- B: 雌激素
- C: 异烟肼
- D: 丙磺舒

答案: C

14. 不干扰血小板因子IV和血小板，致血小板减少症风险低，血浆半衰期 21 小时，极少引起出血的抗凝血药是()。

- A: 磺达肝葵钠
- B: 阿哌沙班
- C: 依诺肝素
- D: 水蛭素

答案: A

15. 强心苷的心脏毒性反应中最常见的心律失常是

- A: 室性期前收缩
- B: 房性期前收缩
- C: 房颤

D: 二联律

答案: A

16. (2020 年真题) 曲妥珠单抗的适应证是

A: 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

B: 晚期恶性黑色素瘤

C: 人表皮生长因子受体-2 (HER-2) 过度表达的乳腺癌

D: 转移性结直肠癌

答案: C

17. (2019 年真题) 患者女，58 岁，血糖升高 10 年，口服二甲双胍治疗，高血压病史 5 年，未规律治疗，近期查体：血压 158/95mmHg，尿常规示蛋白尿 (+++)，适宜该患者使用的降压药物是 ()

A: 普萘洛尔

B: 硝苯地平

C: 甲基多巴

D: 依那普利

答案: D

18. 仅对浅表真菌感染有效的药物 ()

A: 氟康唑

B: 两性霉素 B

C: 伊曲康唑

D: 灰黄霉素

答案: D

19. 具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

A: 异维 A 酸

- B: 维 A 酸
- C: 阿达帕林
- D: 过氧苯甲酰

答案：D

20. 同时具有短效和长效（双时相）作用的胰岛素是

- A: 预混胰岛素注射液
- B: 普通胰岛素注射液
- C: 精蛋白锌胰岛素注射液
- D: 赖脯胰岛素注射液

答案：A

21. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用（）

- A: 3%过氧化氢溶液
- B: 2%酚甘油滴耳液
- C: 2%过氧化氮溶液
- D: 3%酚甘油滴耳液

答案：B

22. （2018 年真题）可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻，具有固定和清除多种病原体和毒素药物是（）

- A: 地芬诺酯
- B: 番泻叶
- C: 蒙脱石散
- D: 洛哌丁胺

答案：C

23. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

- A: None
- B: 大剂量碘制剂
- C: 甲状腺素
- D: 小剂量碘制剂

答案：C

24. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

- A: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松
- B: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松
- C: 奥美拉唑+口服地塞米松
- D: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

答案：D

25. 过量引起严重心脏毒性的是

- A: 哌唑嗪
- B: 卡托普利
- C: 氨氯地平
- D: 地高辛

答案：D

26. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

- A: 滴眼后不应压迫泪囊
- B: 可诱发闭角型青光眼
- C: 可给予拟胆碱类药物解毒
- D: 哺乳期慎用

答案：A

27. 抑制排卵避孕药的较常见的不良反应是()

- A: 子宫不规则出血
- B: 肾功能损害
- C: 多毛、痤疮
- D: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌

答案：A

28. 选择性抑制 COX-2 的药物是

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 布洛芬

答案：A

29. 对多种氨基糖苷类钝化酶稳定的药物是

- A: 链霉素
- B: 奈替米星
- C: 妥布霉素
- D: 庆大霉素

答案：B

30. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 利伐沙班
- B: 替格瑞洛
- C: 双嘧达莫
- D: 氯吡格雷

答案：A

31. 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是

- A: 吸入性糖皮质激素+短效 M 胆碱受体阻断剂
- B: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂
- C: 长效 $\beta 2$ 受体激动剂+长效 M 胆碱受体阻断剂
- D: 吸入性糖皮质激素+长效 $\beta 2$ 受体激动剂

答案：D

32. 属于胰岛素增敏剂的是

- A: 罗格列酮
- B: 西格列汀
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：A

33. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是

- A: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫
- B: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及杀虫的作用
- C: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵
- D: 克罗米通具有局部麻醉作用

答案：C

34. 只能用于绝经后乳腺癌患者的内分泌治疗药是

- A: 氟他胺
- B: 阿那曲唑
- C: 他莫昔芬
- D: 曲妥珠单抗

答案：B

35. 以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

- A: 脱皮黄瓜
- B: 菠菜叶
- C: 红叶苋菜
- D: 洋葱

答案：A

36. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

- A: 利巴韦林
- B: 四环素可的松
- C: 氯霉素
- D: 更昔洛韦

答案：B

37. 有关阿莫西林特点的说法正确的是

- A: 对耐药金葡萄菌有效
- B: 口服吸收差，生物利用度小
- C: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效
- D: 耐酸、耐酶

答案：C

38. 患者，男，60岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。胺碘酮典型不良反应（）。

- A: ②④⑤
- B: ①③⑤
- C: ③④⑤

D: ①②④⑤

答案：D

39. 头孢唑林

A: 肾毒性较大

B: 用于非典型病原体感染

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

D: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

答案：A

40. 乳腺癌患者绝经前、后均可使用的内分泌治疗药是

A: 阿那曲唑

B: 曲妥珠单抗

C: 氟他胺

D: 他莫昔芬

答案：D

41. 铜绿假单胞菌性结膜炎常用()

A: 金霉素眼膏

B: 多黏菌素 B 滴眼液

C: 1%泼尼松滴眼液

D: 夫西地酸滴眼剂

答案：B

42. 下述不属于胃黏膜保护剂的是()

A: 硫糖铝

B: 前列腺素

C: 枸橼酸铋钾

D: 谷氨酰胺

答案: D

43. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是()

A: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及寄生虫的作用

B: 克罗米通具有局部麻醉作用

C: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵

D: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

答案: C

44. 避孕药的作用机制不包括

A: 使子宫腺体制造糖原减少

B: 改变子宫颈黏液

C: 使子宫黏膜内腺体生长

D: 抑制排卵

答案: C

45. 氨茶碱的主要平喘机制为

A: 松弛气道平滑肌

B: 抑制腺苷酸环化酶

C: 激活鸟苷酸环化酶

D: 直接舒张支气管

答案: A

46. 下列关于碘苷说法错误的是

A: 可延缓角膜上皮创伤愈合

B: 可用于疱疹性脑膜炎

C: 皮肤疾病可长期用药

D: 可用于单纯疱疹性角膜炎

答案: C

47. 对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

A: 第一代头孢菌素

B: 第三代头孢菌素

C: 第二代头孢菌素

D: 第四代头孢菌素

答案: B

48. 氟替卡松吸入气雾剂用于重度哮喘时的用法和用量为

A: 一次 50~100 μg ，一日 2 次

B: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次

C: 一次 250~500 μg ，一日 2 次

D: 一次 100~250 μg ，一日 2 次

答案: B

49. 抑制碳酸酐酶的药物是

A: 呋塞米

B: 氯苯蝶啶

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

答案: C

50. 严重肝病患者应减量慎用、肾功能减退患者应避免使用的是

A: 氟胞嘧啶

B: 青霉素

C: 异烟肼

D: 红霉素

答案: A

51. 属于促分泌药，通过刺激肠液分泌，促进排便的药物是()

A: 利那洛肽

B: 番泻叶

C: 欧车前

D: 多库酯钠

答案: A

52. 服用他汀类药物需要监测肌毒性，该临床指标是

A: 乳酸脱氢酶

B: 肌酸激酶

C: 碱性磷酸酶

D: 尿淀粉酶

答案: B

53. 小剂量用于妊娠期妇女预防胎儿神经管畸形的是

A: 维生素 B12

B: 叶酸

C: 维生素 B6

D: 烟酸

答案: B

54. 阿奇霉素()

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

C: 用于非典型致病原感染

D: 肾毒性较大

答案: C

55. 非麻醉性镇痛药中属于中枢性镇痛药的是

A: 布洛芬

B: 秋水仙碱

C: 吗啡

D: 曲马多

答案: D

56. 抑制胰岛素释放和组织对葡萄糖的利用，升高血糖的是()

A: 氢氯噻嗪

B: 呋塞米

C: 螺内酯

D: 氨苯蝶啶

答案: A

57. 乳果糖禁用于

A: 妊娠期

B: 急腹症

C: 哺乳期

D: 肝性脑病

答案: B

58. (2015 年真题) 治疗细菌性结膜炎宜选用 ()。

A: 左氧氟沙星滴眼液

B: 毛果芸香碱滴眼液

C: 碘苷滴眼液

D: 复方托吡卡胺滴眼液

答案: A

59. 角鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂是

A: 制霉菌素

B: 特比萘芬

C: 环吡酮胺

D: 阿莫罗芬

答案: B

60. 属于雌激素类，用于补充雌激素不足的药品是()

A: 地屈孕酮

B: 戊酸雌二醇

C: 他莫昔芬

D: 依普黄酮

答案: B

61. 属于前列腺素 FP 受体激动剂的是

A: 1%碘甘油

B: 四环素

C: 曲伏前列素

D: 9%硼酸冰片滴耳液

答案: C

62. 患者，男性，48 岁，醉酒呕吐后出现发热、咳脓痰 1 周，头孢唑林治疗 4 天后体温稍下降，但痰量仍较多，有臭味，考虑厌氧菌感染，应加用以下哪种药物

A: 阿米卡星

- B: 甲硝唑
- C: 阿奇霉素
- D: 氟康唑

答案：B

63. 烷化剂中易诱发出血膀胱炎的药物是

- A: 塞替派
- B: 环磷酰胺
- C: 氮芥
- D: 卡莫司汀

答案：B

64. 属于第三代头孢菌素的药物是()。

- A: 头孢拉定
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢氨苄
- D: 头孢吡肟

答案：B

65. 强心苷中毒所致的心室纤颤宜选用()

- A: 地尔硫
- B: 利多卡因
- C: 胺碘酮
- D: 普罗帕酮

答案：B

66. 下列关于奥沙利铂的描述，错误的是

- A: 遇冷可加重奥沙利铂的神经毒性

- B: 与氯化钠和碱性溶液（特别是氟尿嘧啶）之间存在配伍禁忌
- C: 应给予预防性或治疗性的止吐用药
- D: 其神经系统毒性与剂量大小无关

答案：D

67. 伐更昔洛韦口服后在肠道和肝脏中水解为

- A: 西多福韦
- B: 阿昔洛韦
- C: 喷昔洛韦
- D: 更昔洛韦

答案：D

68. 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是()

- A: 拉坦前列素
- B: 地匹福林
- C: 毛果芸香碱
- D: 噻吗洛尔

答案：B

69. 下列抗心律失常药中，属于 Ia 类钠通道阻滞药的是()

- A: 利多卡因
- B: 奎尼丁
- C: 普罗帕酮
- D: 苯妥英钠

答案：B

70. 晚期前列腺癌（乳腺癌、卵巢癌患者禁用）可选用的药物是

- A: 缩宫素

- B: 他莫昔芬
- C: 垂体后叶素
- D: 戊酸雌二醇

答案：D

71. (2019 年真题) 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是 ()

- A: 低蛋白血症
- B: 糖尿病
- C: 重症肌无力
- D: 癫痫

答案：C

72. 长期慢性便秘者不宜长期大量使用的药物是

- A: 多库酯钠
- B: 欧车前
- C: 番泻叶
- D: 利那洛肽

答案：C

73. 联用治疗肺结核的是 ()

- A: 链霉素和异烟肼
- B: 链霉素和磺胺嘧啶
- C: 青霉素和磺胺嘧啶
- D: 青霉素和链霉素

答案：A

74. 支气管哮喘急性发作气雾吸入

- A: 去甲肾上腺素

B: 去氧肾上腺素

C: 多巴胺

D: 异丙肾上腺素

答案: D

75. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

A: 兰索拉唑

B: 艾司奥美拉唑

C: 右兰索拉唑

D: 奥美拉唑

答案: C

76. 用于抢救肝素所致严重出血的药物是

A: 硫酸鱼精蛋白

B: 对羧基苄胺

C: 亚叶酸钙

D: 维生素 K

答案: A

77. 应用华法林抗凝的过程中出现严重出血时，可应用的急救药物是()

A: 维生素 K

B: 维生素 B

C: 维生素 K

D: 维生素 K

答案: D

78. 可引起心率加快，瞳孔散大、视物模糊及中枢镇静作用的药物是

- A: 后马托品
- B: 山莨菪碱
- C: 东莨菪碱
- D: 阿托品

答案：C

79. 下列哪种氨基酸与螺内酯合用时可导致血钾升高

- A: 精氨酸
- B: 门冬氨酸
- C: 谷氨酸
- D: 赖氨酸

答案：A

80. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物是()

- A: 胺碘酮
- B: 地高辛
- C: 利多卡因
- D: 苯妥英钠

答案：D

81. 环磷酰胺属于哪一类抗肿瘤药物

- A: 抗肿瘤抗生素
- B: 抗代谢抗肿瘤药
- C: 抗肿瘤金属配合物
- D: 烷化剂

答案：D

82. 西地那非引起的不良反应有

- A: 低血糖
- B: 出血
- C: 嗜睡乏力
- D: 视觉异常

答案：D

83. 与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是()。

- A: 硝酸甘油
- B: 丙酸睾酮
- C: 非那雄胺
- D: 甲睾酮

答案：A

84. 抑制二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 红霉素
- B: 磺胺甲
- C: 甲氧苄啶
- D: 青霉素

答案：B

85. (2015 年真题) 属于润滑性泻药的是()。

- A: 酚酞
- B: 甘油(开塞露)
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 乳果糖

答案：B

86. 主要作用促使细胞中微管装配，抑制微管解聚的抗肿瘤药物是

- A: 放线菌素
- B: 顺铂
- C: 氟尿嘧啶
- D: 紫杉醇

答案：D

87. 血管紧张素 I 转化酶抑制剂是

- A: 米力农
- B: 多巴酚丁胺
- C: 地高辛
- D: 依那普利

答案：D

88. 糖皮质激素的禁忌证不包括()

- A: 角膜炎、虹膜炎
- B: 妊娠初期和产褥期
- C: 创伤或手术恢复期
- D: 严重的高血压、糖尿病

答案：A

89. 长期服用雌激素可导致

- A: 体重下降
- B: 高血压
- C: 脱发
- D: 阴道出血

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

90. 降低夜间眼压的首选药物是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/115021221000012040>