

2024 湖南省北湖区《执业药师之西药学专业二》资格考试完整题库附参考答案（轻巧夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列不属于中效能利尿药的是

- A: 呋噻帕胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氟噻嗪

答案：C

2. 毛果芸香碱的作用特点不包括

- A: 开放前房角降低眼压
- B: 减少房水生成
- C: 收缩睫状肌，使小梁网眼张开
- D: 缩小瞳孔，拉紧虹膜

答案：B

3. 铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

- A: 血红蛋白
- B: 血清铁蛋白
- C: 网织红细胞计数
- D: 巨核细胞计数

答案：D

4. 能降低血压但伴有反射性心率加快，易导致心肌缺血的药物是

- A: 卡托普利
- B: 普萘洛尔
- C: 氯沙坦
- D: 硝苯地平

答案：D

5. (2021 年真题) 关于美罗培南使用注意事项的说法，错误的是 ()

- A: 肝功能不全者需调整剂量
- B: 可用于治疗妊娠期呼吸系统感染
- C: 有其他 β -内酰胺类药物过敏性休克史的患者禁用
- D: 与中枢神经系统 γ -氨基丁酸受体的亲和力较亚胺培南弱，故癫痫等中枢神经系统不良反应的发生率显著低于亚胺培南

答案：A

6. 铁剂的适应证为 ()

- A: 恶性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 巨幼红细胞性贫血
- D: 缺铁性贫血

答案：D

7. (2019 年真题) 吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是 ()

- A: 扎那米韦
- B: 奥司他韦
- C: 金刚乙胺
- D: 金刚烷胺

答案：B

8. (2017 年真题) 可以引起跟腱断裂, 血糖异常的药物是 ()

- A: 甲矾霉素
- B: 多西环素
- C: 庆大霉素
- D: 加替沙星

答案：D

9. 治疗可能引起结晶尿的药物是 ()

- A: 呋喃妥因
- B: 氯霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 左氧氟沙星

答案：C

10. 用于黑热病病因治疗的药物是

- A: 伯氨喹
- B: 葡萄糖酸锑钠
- C: 氯硝柳胺
- D: 三苯双脒

答案：B

11. 抑制血管平滑肌和心肌细胞 Ca

- A: 肼屈嗪
- B: 利血平
- C: 氢氯噻嗪
- D: 硝苯地平

答案：D

12. 下述药物中不可用于治疗疥疮的是()

- A: 过氧苯甲酰
- B: 苯甲酸苄酯
- C: 林旦霜
- D: 硫黄软膏

答案：A

13. 用于散瞳的眼用药物是

- A: 噻吗洛尔
- B: 溴莫尼定
- C: 毛果芸香碱
- D: 复方托吡卡胺

答案：D

14. 强心苷对以下哪种心功能不全疗效最好

- A: 高度二尖瓣狭窄引起的心功能不全
- B: 伴有心房扑动、颤动的心功能不全
- C: 严重贫血引起的心功能不全
- D: 甲状腺功能亢进引起的心功能不全

答案：B

15. 抑制 H^+ , K^+-ATP 酶活性的药物是

- A: 氢氧化铝
- B: 奥美拉唑
- C: 雷尼替丁
- D: 哌仑西平

答案：B

16. 下述药物中，不属于促动力药的是

- A: 多潘立酮
- B: 甲氧氯普胺
- C: 氢氧化铝
- D: 莫沙必利

答案：C

17. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年，心律失常病史 2 年，长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是 ()

- A: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎
- B: 可致甲状腺功能减退，较为常见，发病隐匿
- C: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常
- D: 可掩盖低血糖症状 (如心悸、手抖)，但低血糖的其他症状 (如出汗) 仍然存在

答案：D

18. 对胰岛素产生耐受者选用

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 格列本脲
- C: 胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：B

19. 服用西地那非可导致()

- A: 高血压
- B: 肾功能异常
- C: 视物模糊、复视
- D: 心律失常

答案: C

20. 用于治疗耐氯喹和耐多种药物虫株所致的恶性疟，也可用于治疗间日疟的药物是

- A: 奎宁
- B: 乙胺嘧啶
- C: 蒿甲醚
- D: 双氢青蒿素

答案: A

21. 使用后可出现口腔苦味

- A: 利巴韦林
- B: 四环素可的松
- C: 更昔洛韦
- D: 氯霉素

答案: D

22. 以下为广谱抗病毒药的是

- A: 阿糖腺苷
- B: 利巴韦林
- C: 更昔洛韦
- D: 碘苷

答案: B

23. 治疗维生素 D 中毒导致的变应性骨炎可选用

- A: 阿法骨化醇
- B: 奥利司他
- C: 鲑降钙素
- D: 阿仑膦酸钠

答案：C

24. 可引起眼睛疼痛不适的是

- A: 氨溴索
- B: 沙丁胺醇
- C: 噻托溴铵
- D: 喷托维林

答案：C

25. 可与甲巯咪唑发生药物相互作用的是

- A: 噻嗪类利尿剂
- B: 华法林
- C: 头孢类抗生素
- D: 阿司匹林

答案：B

26. （2021 年真题）通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（）

- A: 华法林
- B: 茶碱
- C: 地高辛
- D: 丙戊酸钠

答案：A

27. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是

- A: 巯嘌呤
- B: 长春瑞滨
- C: 吉西他滨
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

28. 下述关于铋剂的描述，错误的是

- A: 剂量过大时，可导致铋剂脑病现象
- B: 不得同食高蛋白饮食，如牛奶
- C: 两种铋剂不宜联用
- D: 牛奶可促进铋剂的吸收，服药期间应同服牛奶

答案：D

29. 呋塞米与抗组胺药合用时

- A: 利尿作用减弱
- B: 引起电解质紊乱的概率增加
- C: 低氯性碱中毒机会增加
- D: 耳毒性增加

答案：D

30. （2019 年真题）长期用药易发生低镁血症的药物是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 替普瑞酮
- C: 胶体果胶铋
- D: 复方碳酸钙

答案：A

31. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润行导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多西他赛的描述，错误的是()

- A: 在相当剂量下，抗肿瘤作用比紫杉醇高 1 倍
- B: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同
- C: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成
- D: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

答案：B

32. 下列药物使用期间需要缓慢停药的是

- A: 氨氯地平
- B: 地尔硫?
- C: 比索洛尔
- D: 依那普利

答案：C

33. 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162/80mmHg，心率 72 次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 硝酸甘油+美托洛尔
- B: 氨氯地平+氢氯噻嗪
- C: 利血平+氨苯蝶啶
- D: 特拉唑嗪+氢氯噻嗪

答案：B

34. (2015 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是 ()。

- A: 低血糖
- B: 光过敏
- C: 水肿
- D: 干咳

答案：D

35. 下列情况不应首选红霉素的是 ()

- A: 军团菌肺炎
- B: 白喉带菌者
- C: 肠道痢疾杆菌感染
- D: 支原体肺炎

答案：C

36. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化 ()

- A: 维 A 酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 异维 A 酸
- D: 阿达帕林

答案：C

37. 肝素抗凝血治疗引起的自发性出血，宜用的抢救药物是

- A: 氨甲苯酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 K

D: 氨甲环酸

答案: B

38. 属于保钾利尿药的是

A: 螺内酯

B: 甘露醇

C: 氢氯噻嗪

D: 呋塞米

答案: A

39. 广谱抗菌药，对细胞内外的结核分枝杆菌、麻风杆菌均有抑制作用的是

A: 异烟肼

B: 乙胺丁醇

C: 利福平

D: 吡嗪酰胺

答案: C

40. 适宜睡前服用，用于抑制"酸突破现象"的抑酸剂是()。

A: 前列地尔

B: 乳酸菌素

C: 雷尼替丁

D: 泮托拉唑

答案: C

41. 促进微管的装配，抑制其解聚

A: 羟喜树碱

B: 他莫昔芬

C: 紫杉醇

D: 长春碱

答案: C

42. 硫脲类药物的不良反应不包括()

A: 粒细胞减少

B: 过敏反应

C: 诱发甲亢

D: 发热

答案: C

43. 主要以原型经肾脏排泄，终末消除相的时间较长，滴注后 2~28 日内在血浆中仍保持较低浓度，终末消除半衰期为 146 小时的是

A: 帕米膦酸二钠

B: 唑来膦酸

C: 阿仑膦酸钠

D: 依替膦酸二钠

答案: B

44. 抑制过敏介质释放，主要用于预防哮喘发作的药物是

A: 倍氯米松

B: 异丙肾上腺素

C: 特布他林

D: 色甘酸钠

答案: D

45. 维生素 A 缺乏时可患

A: 成人佝偻病

B: 夜盲症

C: 脚气病

D: 糙皮病

答案: B

46. 对四环素不敏感的病原体是()

A: 肺炎衣原体

B: 螺旋体

C: 铜绿假单胞菌

D: 肺炎支原体

答案: C

47. 手术后出血和血友病辅助治疗宜选用

A: 鱼精蛋白

B: 硫酸亚铁

C: 氨甲环酸

D: 维生素 K

答案: C

48. 适用于轻、中度心力衰竭及左、右心室充盈量高的患者的是

A: 卡维地洛

B: 氢氯噻嗪

C: 米力农

D: 氯沙坦

答案: B

49. 用于预防绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

A: 雷洛昔分

- B: 黄体酮
- C: 米非司酮
- D: 地塞米松

答案：A

50. 急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

- A: 8 小时内
- B: 24 小时内
- C: 12 小时内
- D: 3 小时内

答案：D

51. (2017 年真题) 长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是 ()

- A: 血栓性静脉炎
- B: 高钙血症
- C: 颅内压升高
- D: 高胆红素血症

答案：B

52. 甲氧苄啶联用环孢素使

- A: 肾毒性增加
- B: 抗凝作用增强
- C: 半衰期缩短
- D: 白细胞减少风险增加

答案：A

53. 原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是

- A: 泼尼松片 30mgq
- B: 泼尼松片 20mgqD
- C: 泼尼松片 50mgqD
- D: 地塞米松片 10mgqD

答案：C

54. 与其他抗真菌药无交叉耐药性的棘白霉素类抗真菌药是

- A: 卡泊芬净
- B: 两性霉素
- C: 氟胞嘧啶
- D: 阿糖胞苷

答案：A

55. （2016 年真题）属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 艾塞那肽
- D: 那格列奈

答案：B

56. 可能导致牙齿黄染的抗菌药物是

- A: 加替沙星
- B: 甲砷霉素
- C: 多西环素
- D: 庆大霉素

答案：C

57. 以上药物镇咳作用最弱的是

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 喷托维林
- D: 吗啡

答案：C

58. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 短效 B₂ 受体激动剂
- D: 吸入性糖皮质激素

答案：C

59. 已用指南推荐剂量或达到 ACEI / ARB 最大耐受剂量后，收缩压 >95mmHg，NYHA 心功能 II ~ III 级、仍有症状的 HFrEF 患者，可用

- A: 伊伐布雷定
- B: 卡托普利
- C: 沙库巴曲缬沙坦
- D: 美托洛尔

答案：C

60. 氟替卡松吸入气雾剂用于重度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 100~250 μ g，一日 2 次
- B: 一次 50~100 μ g，一日 2 次
- C: 一次 500~1000 μ g，一日 2 次

D: 一次 250~500 μ g, 一日 2 次

答案: C

61. 被还原后的代谢物可抑制细菌的 DNA 代谢过程, 促使细菌死亡, 并可抑制阿米巴原虫的氧化还原反应, 使原虫的氮链发生断裂的是

A: 替硝唑

B: 甲氧苄啶 (TMP)

C: 莫西沙星

D: 磺胺甲噁唑 (SMZ)

答案: A

62. 扎那米韦的作用靶点是

A: 脱氧核糖核酸聚合酶

B: HIV-1 反转录酶

C: 神经氨酸酶

D: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

答案: C

63. 属于雌激素类的是

A: 睾酮

B: 己烯雌酚

C: 他莫昔芬

D: 甲地孕酮

答案: B

64. 钾离子竞争性酸抑制剂的作用机制是

A: 通过竞争胃壁细胞膜腔面的钾离子来发挥作用

B: 抑制乙酰胆碱 M 受体

C: 通过二硫键与质子泵的巯基呈不可逆性的结合

D: 竞争性拮抗组胺与胃壁细胞上的 H²受体结合

答案：A

65. 用于呼吸道合胞病毒引起的肺炎与支气管炎治疗的抗病毒药物是

A: 碘苷

B: 利巴韦林

C: 阿昔洛韦

D: 金刚烷胺

答案：B

66. 与碳酸氢钠等碱性药物并用，能引起尿液及粪便变色的是

A: 开塞露

B: 酚酞

C: 乳果糖

D: 聚乙二醇 4000

答案：B

67. (2020 年真题) 通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

A: 度洛西汀

B: 舍曲林

C: 阿米替林

D: 吗氯贝胺

答案：D

68. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

- A: 利多卡因
- B: 普萘洛尔
- C: 奎尼丁
- D: 苯妥英钠

答案：B

69. 用 1%麻黄素液滴鼻的主要目的是

- A: 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌
- B: 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流
- C: 收缩血管，降低其通透性
- D: 收缩血管，减轻炎症反应

答案：B

70. 大剂量可导致 Q-Tc 间期延长的是

- A: 西沙必利
- B: 莫沙必利
- C: 多潘立酮
- D: 甲氧氯普胺

答案：A

71. （2016 年真题）会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性（感觉障碍、痉挛）的行为是

- A: 日光浴
- B: 饮用热饮
- C: 接触塑料制品
- D: 冷水浴

答案：D

72. 是 β -内酰胺酶抑制剂，常与青霉素组成复方制剂的是()

- A: 美罗培南
- B: 他唑巴坦
- C: 氨曲南
- D: 克拉维酸

答案: D

73. 大剂量应用甲氨蝶呤后，可用()进行解救

- A: 苯溴马隆
- B: 丙磺舒
- C: 亚叶酸钙
- D: 别嘌醇

答案: C

74. 关于阿司匹林在心血管疾病治疗中的作用描述，错误的是

- A: 可抑制血小板聚集
- B: 调节血脂
- C: 抑制血管损伤后内膜增生
- D: 抑制细胞因子的合成

答案: B

75. 以下关于睾酮替代治疗的描述，错误的是

- A: 长期应用高剂量雄激素注意监测电解质、心功能与肝功能
- B: 丙酸睾酮应采用静脉注射
- C: 最好选择能模拟睾酮生理分泌节律的药物
- D: 在补充雄激素前，应常规进行前列腺直肠指检

答案: B

76. (2017 年真题) 抑制细菌核酸合成 ()

- A: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶
- B: 利福喷丁
- C: 头孢米诺
- D: 头孢吡肟

答案: B

77. 可用于防治夜盲症的维生素是 ()

- A: 维生素 A
- B: 维生素 B
- C: 叶酸
- D: 维生素 K

答案: A

78. 下列哪项是避免奥沙利铂的剂量依赖性神经系统毒性，避免出现咽喉痉挛等严重后果的措施

- A: 用生理盐水做溶剂
- B: 禁食冷饮冷水、接触凉物
- C: 禁食热饮热水
- D: 禁止接触塑料制品

答案: B

79. 发热需采用非甾体抗炎药时，应首选

- A: 布洛芬
- B: 阿司匹林
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 双氯芬酸

答案: C

80. 可阻断钠通道，用于治疗室性心律失常的药品是

- A: 氨氯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 氯沙坦
- D: 利多卡因

答案：D

81. 广泛用于各种吸虫药的治疗，还能用于绦虫病的药物是

- A: 三苯双脒
- B: 乙胺嘧啶
- C: 甲硝唑
- D: 吡喹酮

答案：D

82. 精神病患者及神经中毒症状者慎用

- A: 更昔洛韦
- B: 利巴韦林
- C: 四环素可的松
- D: 氯霉素

答案：A

83. 治疗酮症酸中毒及糖尿病昏迷的药物是

- A: 氢氧化镁
- B: 罗格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 胰岛素

答案：D

84. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的目的是

- A: B 淋巴细胞表面的 CD20
- B: 人表皮生长因子受体-2
- C: 表皮生长因子受体
- D: 血管内皮生长因子

答案：B

85. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 吉西他滨
- C: 巯嘌呤
- D: 长春瑞滨

答案：C

86. （2016 年真题）可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是

- A: 伏立康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 特比萘芬
- D: 氟胞嘧啶

答案：C

87. 通过抑制 Ca

- A: 胍乙啶
- B: 硝苯地平

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 硝酸甘油

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/115210241114012033>