

福建省梅列区《执业药师之西药学专业二》 考试必刷 200 题真题及答案【网校专用】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 放射性碘

- A: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- B: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成
- C: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状
- D: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

答案：D

2. 关于 PDE5 抑制剂的代谢动力学，错误的是

- A: 他达拉非的吸收不受油脂性食物的影响
- B: 伐地那非对 PDE5 的选择性是西地那非和他达拉非的 10 倍
- C: 伐地那非对 PDE1 和 PDE6 的选择性是西地那非的 4 倍
- D: 他达拉非代谢物少部分从粪便，绝大部分经肾排泄

答案：D

3. 深部真菌感染首选药，静脉滴注用于真菌性肺炎、心内膜炎的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 奥司他韦
- C: 制霉菌素
- D: 膦甲酸钠

答案：A

4. 呋塞米静脉注射用于儿童，一日最大量是

- A: 4mg / kg
- B: 6mg / kg
- C: 2mg / kg
- D: 8mg / kg

答案：B

5. 属于抗炎类保肝药的是

- A: 熊去氧胆酸
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 甘草酸二铵
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：C

6. 关于地西泮的作用特点，叙述错误的是

- A: 剂量加大可引起麻醉
- B: 有良好的抗癫痫作用
- C: 可增强其他中枢抑制药的作用
- D: 小于镇静剂量时即有抗焦虑作用

答案：A

7. (2019 年真题) 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是 ()

- A: 庆大霉素
- B: 呋喃妥因
- C: 甲硝唑
- D: 苄星青霉素

答案：C

8. 可用于鼻部血管收缩的肾上腺素 α 受体激动药是

- A: 羟甲唑啉
- B: 桃金娘油
- C: 西地碘
- D: 复方薄荷油

答案：A

9. 严格控制用药剂量和用药时间可以避免产生

- A: 继发反应
- B: 变态反应
- C: 副作用
- D: 毒性反应

答案：D

10. 长期大剂量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，应注意适当补充

- A: 维生素 A 和维生素 D
- B: 维生素 B 和维生素 K
- C: 维生素 E 和叶酸
- D: 维生素 C 和烟酸

答案：B

11. 为鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂，用于手癣、足癣、体癣及皮肤念珠菌病的药物是

- A: 制霉菌素
- B: 特比萘芬
- C: 联苯卡唑
- D: 阿莫罗芬

答案：B

12. 能治疗强心苷中毒引起的异位心律的是

- A: 哌替啶
- B: 利血平
- C: 苯妥英钠
- D: 阿托品

答案：C

13. 关于普萘洛尔抗心律失常作用的描述，错误的是()

- A: 对室性和室上性心律失常都有效
- B: 用于治疗与交感神经兴奋有关的心律失常
- C: 对一般室性心律失常无效
- D: 主要通过阻断 β 受体对心脏产生作用

答案：C

14. 以下关于制霉菌素的描述中，错误的是

- A: 作用机制与两性霉素 B 相似
- B: 口服吸收很少
- C: 局部外用治疗浅表真菌感染
- D: 对念珠菌属抗菌活性较高，但易产生耐药性

答案：D

15. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 血栓性静脉炎
- B: 视神经损害

C: 听力损害

D: 红人综合征

答案: B

16. (2019 年真题) 关于蒙脱石散的作用特点及临床使用的说法，错误的是 ()

A: 腹泻患者宜在两餐之间服用

B: 对伴有感染的腹泻患者，应联合应用有效的抗菌药物治疗

C: 直接服用或调成糊状、丸状服用

D: 不被胃肠道吸收，对中枢神经及心血管系统无不良影响

答案: C

17. 血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 应避免与其联合应用的是 ()

A: 噻嗪类利尿药

B: 留钾利尿药

C: 人促红素

D: β 受体阻断药

答案: B

18. 下列药物中，与蛋白同化激素无相互作用的药物是

A: 环孢素

B: 华法林

C: 青霉素

D: 他克莫司

答案: C

19. 弱效 (使 LDL-ch 水平降低 $<30\%$) 的他汀类调血脂药

A: 小剂量阿托伐他汀

- B: 依折麦布
- C: 小剂量氟伐他汀
- D: 大剂量阿托伐他汀

答案：C

20. 其缓释片剂应与食物同服的是

- A: 氨曲南
- B: 红霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 克拉霉素

答案：D

21. 痛风缓解期(关节炎症控制后 1~2 周)，为控制血尿酸水平，应选用的药品是()。

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 泼尼松龙
- D: 布洛芬

答案：A

22. 属于胰岛素增敏剂的是

- A: 艾塞那肽
- B: 瑞格列奈
- C: 罗格列酮
- D: 阿卡波糖

答案：C

23. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

- A: 四氢叶酸
- B: 维生素 B
- C: 硫酸亚铁
- D: 叶酸

答案：C

24. 属于抗雌激素类的是

- A: 他莫昔芬
- B: 甲地孕酮
- C: 己烯雌酚
- D: 睾酮

答案：A

25. 华法林的抗凝血机制是

- A: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子
- B: 抑制血小板聚集
- C: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用
- D: 促进纤维蛋白溶解

答案：A

26. 利福平

- A: 禁用于 8 岁以下儿童
- B: 禁用于胆道阻塞患者
- C: 禁用于早产儿、新生儿
- D: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

答案：B

27. 肝素的抗凝作用特点

- A: 仅在体内有效
- B: 体内、体外均有效
- C: 必须有维生素 K 辅助
- D: 仅在体外有效

答案：B

28. 激动 α

- A: 可乐定
- B: 胍屈嗪
- C: 哌唑嗪
- D: 硝普钠

答案：A

29. 可促进子宫颈成熟的药物有松弛子宫颈管，促进宫颈成熟，使宫口开大，缩短分娩时间，提高引产成功率等作用的药物是

- A: 地诺前列酮
- B: 缩宫素
- C: 普拉睾酮
- D: 麦角新碱

答案：C

30. 用于先兆性流产和习惯性流产

- A: 地塞米松
- B: 黄体酮
- C: 米非司酮
- D: 雷洛昔分

答案：B

31. 高血压伴精神抑郁者不宜选用

- A: 利血平
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 尼莫地平

答案：A

32. 克拉霉素与环孢素合用()

- A: 后者血药浓度下降，药效降低
- B: 不良反应叠加
- C: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- D: 药理作用拮抗

答案：C

33. 下述利尿药中，可增加卡那霉素耳毒性的是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案：D

34. 使用痤疮治疗药物不会出现

- A: 眼周局部刺激
- B: 皮肤色素沉着
- C: 肝脏氨基转移酶 AST 降低
- D: 红斑

答案：C

35. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

- A: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎
- B: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在
- C: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿
- D: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

答案：B

36. 可用于治疗绦虫感染的药物是

- A: 联噻
- B: 林旦
- C: 甲硝唑
- D: 氯硝柳胺

答案：D

37. 用于治疗疥疮的药物有()

- A: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏
- B: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏
- C: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏
- D: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

答案：B

38. 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是（）。

- A: CYP2E1
- B: CYP2D6
- C: CYP2C19
- D: CYP286

答案：C

39. 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是

- A: 双氯芬酸
- B: 雷尼替丁
- C: 硝苯地平
- D: 格列齐特

答案：A

40. 关于硝基呋喃类，下列叙述哪项是错误的

- A: 口服吸收好
- B: 耐药率低
- C: 抗菌谱广
- D: 血浆药物浓度低

答案：A

41. （2016 年真题）服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血，需同时联合使用的药品是

- A: 维生素 B1
- B: 依诺肝素
- C: 维生素 B2

D: 维生素 B12

答案：D

42. 未确诊的腹痛、炎症性器质性肠病、肠梗阻、肠穿孔患者禁用()

A: 硫酸镁

B: 甘油

C: 乳果糖

D: 聚乙二醇 4000

答案：D

43. 属于前药，在肝脏水解为阿昔洛韦，生物利用度比阿昔洛韦高 3~4 . 5 倍的抗病毒药物是

A: 干扰素

B: 伐昔洛韦

C: 奥司他韦

D: 阿糖腺苷

答案：B

44. 单纯疱疹性角膜炎应选用

A: 阿昔洛韦

B: 夫西地酸

C: 头孢他啶

D: 利福平

答案：A

45. 镇静作用明显的 H

A: 组胺

B: 阿司咪唑

C: 西咪替丁

D: 苯海拉明

答案: D

46. 存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 吉西他滨

B: 奥沙利铂

C: 泼尼松

D: 顺铂

答案: B

47. 苯妥英钠的血药浓度超过多少可出现眼球震颤症状

A: $20 \mu\text{g} / \text{ml}$

B: $10 \mu\text{g} / \text{ml}$

C: $25 \mu\text{g} / \text{ml}$

D: $15 \mu\text{g} / \text{ml}$

答案: A

48. 袢利尿药中，静脉给药维持时间最长的是()

A: 依他尼酸

B: 托拉塞米

C: 呋塞米

D: 布美他尼

答案: B

49. 对于硼酸的描述，错误的是()

A: 清洗外耳道，适量擦拭外耳道，一日 3 次

B: 滴耳；成人一次 1~2 滴，一日 3 次

C: 用于急、慢性中耳炎

D: 作为滴耳剂的常用规格是 10ml: 4g

答案: D

50. 与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

A: 钙剂

B: 维生素 D

C: 铁剂

D: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂

答案: D

51. 下述不能用于治疗痤疮的药物是

A: 过氧苯甲酰

B: 克霉唑

C: 阿达帕林

D: 壬二酸

答案: B

52. (2019 年真题) 竞争性抑制胃肠道的 α -葡萄糖苷酶活性减慢肠道内多糖、寡糖或双糖的降解从而延缓单糖的吸收，可降低餐后血糖的药物是 ()

A: 格列吡嗪

B: 吡格列酮

C: 二甲双胍

D: 伏格列波糖

答案: D

53. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

A: BUN

B: Cr

C: Hcy

D: CK

答案：D

54. 利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭（肌酐清除率 $<30\text{mL/min}$ ）时，可作为首选治疗的利尿剂为（）。

A: 袢利尿剂

B: 噻嗪类利尿剂

C: 碳酸酐酶抑制剂

D: 留钾利尿剂

答案：A

55. 布美他尼属于下列哪类利尿药

A: 中效利尿药

B: 保钾利尿药

C: 碳酸酐酶抑制药

D: 强效利尿药

答案：D

56. （2018 年真题）口服避孕药的禁忌证不包括（）

A: 激素依赖性肿瘤

B: 重度肝功能不全

C: 甲状腺功能减退

D: 不明原因阴道出血

答案：C

57. 下列抗心律失常的药物中，有较明显肝代谢首关效应的是

A: 奎尼丁

B: 普鲁卡因胺

C: 胺碘酮

D: 普罗帕酮

答案：D

58. 烟酸缺乏时发生

A: 脚气病

B: 夜盲症

C: 成人佝偻病

D: 糙皮病

答案：D

59. 选择性舒张脑血管的药物是

A: 维拉帕米

B: 氟桂利嗪

C: 硝苯地平

D: 地尔硫革

答案：B

60. 可增强糖尿病患者口服磺酰脲类药降糖作用，引起严重低血糖的药物是

A: 雷尼替丁

B: 甘草酸二铵

C: 甲氧氯普胺

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案: A

61. 锥体外系疾病、亨廷顿病者禁用的药物是

A: 吡拉西坦

B: 文拉法辛

C: 吗氯贝胺

D: 氟西汀

答案: A

62. 可导致凝血酶原时间延长的是

A: 替硝唑+华法林

B: 甲硝唑+乙醇

C: 奥硝唑+乙醇

D: 替硝唑+苯巴比妥

答案: A

63. 用于合胞病毒引起的肺炎和支气管肺炎的抗病毒药是

A: 利巴韦林

B: 更昔洛韦

C: 拉米夫定

D: 碘苷

答案: A

64. (2016 年真题) 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是

A: 右美沙芬

B: 苯丙哌林

C: 氯化铵

D: 可待因

答案: B

65. 长期服用雌激素可导致

A: 体重下降

B: 高血压

C: 阴道出血

D: 脱发

答案: C

66. 口服后很少被吸收的口服降糖药是

A: 达格列净

B: 二甲双胍

C: 阿卡波糖

D: 罗格列酮

答案: C

67. 大剂量使用维生素 K

A: 肝素

B: 维生素

C: 氨甲苯酸

D: 双香豆素

答案: A

68. 对 α 受体和 β 受体均有强大的激动作用的是

A: 可乐定

B: 肾上腺素

C: 多巴胺

D: 去甲肾上腺素

答案: B

69. 属于 I c 类抗心律失常药的是

A: 奎尼丁

B: 利多卡因

C: 普罗帕酮

D: 胺碘酮

答案: C

70. 可能诱发心绞痛的降压药是

A: 哌唑嗪

B: 肼屈嗪

C: 普萘洛尔

D: 可乐定

答案: B

71. 长期大量使用可导致肝功能异常

A: 四环素可的松

B: 利巴韦林

C: 更昔洛韦

D: 氯霉素

答案: B

72. 甲氧苄啶联用甲氨蝶呤使

A: 抗凝作用增强

B: 半衰期缩短

C: 白细胞减少风险增加

D: 肾毒性增加

答案：C

73. 洛伐他汀的作用是

A: 主要影响胆固醇合成

B: 主要影响胆固醇吸收

C: 影响脂蛋白合成、转运及分解的药物

D: 主要影响甘油三酯合成

答案：A

74. 可用于大面积烧伤、创伤、高分解代谢、蛋白丢失负氮平衡者()

A: 精氨酸

B: 复方氨基酸注射液(3AA)

C: 赖氨酸

D: 复方氨基酸注射液(18AA)

答案：D

75. 红霉素的作用机制是()

A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

B: 与核糖体 70S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

C: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程

D: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

答案：A

76. 属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

A: 甲地孕酮

B: 米非司酮

C: 黄体酮

D: 左炔诺孕酮

答案: B

77. 常用抗真菌药中，()抑制真菌细胞壁主要成分葡聚糖的合成

A: 唑类抗真菌药

B: 丙烯胺类抗真菌药

C: 棘白菌素类抗真菌药

D: 多烯类抗真菌药

答案: C

78. 属于组胺 H₂ 受体阻断剂是

A: 奥美拉唑

B: 法莫替丁

C: 氯苯那敏

D: 多潘立酮

答案: B

79. 属于长效 β

A: 布地奈德

B: 沙丁胺醇

C: 多索茶碱

D: 沙美特罗

答案: D

80. 下列属于非选择性 β 受体阻断药的是()

A: 美托洛尔

B: 阿替洛尔

C: 普萘洛尔

D: 比索洛尔

答案: C

81. (2019 年真题) 患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

A: 体重增加

B: 突破性出血

C: 乳房触痛或增大

D: 白带增多

答案: B

82. 成人使用乙胺嘧啶用于疟疾的预防，服用的时间是

A: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 周

B: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 周

C: 应于进入疫区前 1~2 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 天

D: 应于进入疫区前 6~8 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 天

答案: B

83. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是

A: 用药期间需定期测定血红蛋白

B: 对于不同的手术，选择疗程不同

C: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药

D: 用药过量可导致出血并发症

答案: C

84. 适用于 IIa、IIb 型及家族性杂合子的高脂蛋白血症，但有特殊臭味和刺激性的是

- A: 烟酸
- B: 考普罗布
- C: 洛伐他汀
- D: 考来烯胺

答案：D

85. 通过抑制 α -葡萄糖苷酶，减少多糖水解为葡萄糖()

- A: 格列本脲
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 艾塞那肽

答案：C

86. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60 / 40mmHg，血红蛋白 120g / L，白细胞 12×10^9 / L，血小板 30×10^9 / L，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒(正常值 13 秒)，骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

- A: 低分子肝素
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 C
- D: 维生素 K1

答案：B

87. 渗透性泻药()

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 地芬诺酯

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/115331033344012034>