

2023-24 年广东省连州市《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题内部题库含答案（突破训练）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列说法正确的是

- A: 沙美特罗适用于缓解支气管痉挛的急性症状
- B: 氨茶碱可与青霉素合用
- C: 异丙托溴铵口服可提高疗效
- D: 长效 β_2 受体激动剂不适合初始用于快速恶化的急性哮喘发作

答案：D

2. 强心苷类中毒的症状不包括

- A: 嗜睡
- B: 心肌强力收缩
- C: 红-绿、蓝-黄辨认异常
- D: 心律失常

答案：B

3. 下列属于钾离子竞争性酸抑制剂的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 米索前列醇
- C: 沃诺拉赞
- D: 法莫替丁

答案：C

4. 下述药物中属于缓解鼻黏膜充血引起的鼻塞、鼻出血的是()

- A: 硼酸
- B: 酚甘油
- C: 过氧化氢
- D: 盐酸麻黄碱

答案: D

5. 属于抗炎类保肝药的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 甘草酸二铵
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 熊去氧胆酸

答案: B

6. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是

- A: 阻滞多种钾通道，延长动作电位的时程和有效不应期
- B: 加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度
- C: 提高窦房结和浦肯野纤维的自律性
- D: 缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期

答案: A

7. 属于雌激素的是

- A: 地塞米松
- B: 尼尔雌醇
- C: 泼尼松龙
- D: 甲羟孕酮

答案: B

8. 干扰转录过程和阻止 RNA 合成的药物是()

- A: 多柔比星
- B: 顺铂
- C: 氟尿嘧啶
- D: 高三尖杉酯碱

答案: A

9. 可用于防治泌尿系统结石的是

- A: 氯化钾
- B: 氯化钠
- C: 枸橼酸钾
- D: 氯化钙

答案: C

10. 激动 α

- A: 胍屈嗪
- B: 哌唑嗪
- C: 硝普钠
- D: 可乐定

答案: D

11. (2018 年真题) 中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

D: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

答案: B

12. 非选择性 NSAID 可引起胃黏膜损伤的原因是

A: 抑制 COX-2

B: 阻滞 ARB

C: 抑制 COX-1

D: 抑制 AC

答案: C

13. 维生素 B

A: 拮抗肝素过量导致的出血

B: 恶性贫血和巨幼红细胞性贫血

C: 纤溶亢进所致的出血

D: 拮抗华法林过量导致的出血

答案: B

14. 有关痤疮治疗用药注意事项,描述不正确的是()

A: 对林可霉素磷酸酯凝胶过敏者禁用

B: 过氧苯甲酰凝胶合用维 A 酸乳膏可加强疗效

C: 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用在同一时间、同一部位有物理性配伍禁忌

D: 维 A 酸的用药部位要避免强烈的日光照射,宜在晚间睡前应用

答案: B

15. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内,宜使用的口服紧急避孕药是()

A: 十一酸睾酮(40mg)

B: 炔雌醇去氧孕烯 (30g/150g)

C: 复方醋酸环丙孕酮 (35 μ g/2mg)

D: 左炔诺孕酮 (1

答案: D

16. 抗肿瘤药一般缺乏特异性，在杀伤肿瘤细胞同时，对正常组织细胞不可避免的会产生损害或毒副作用，75%以上化疗患者会出现不同程度的恶心、呕吐。

A: 每天化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg

B: 每天化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂

C: 每天化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松 12mg

D: 每天化疗前，口服地塞米松 12mg

答案: A

17. 12 岁以下儿童、有活动性消化性溃疡及中度或严重肝损伤禁用的非甾体抗炎药是

A: 布洛芬

B: 尼美舒利

C: 双氯芬酸

D: 塞来昔布

答案: B

18. 卡托普利的主要降压机制是

A: 抑制缓激肽的水解

B: 抑制醛固酮的释放

C: 促进前列腺素 I₂ 的合成

D: 抑制血管紧张素转化酶

答案: D

19. 属于抗胆碱药的是()

- A: 奥美拉唑
- B: 雷尼替丁
- C: 哌仑西平
- D: 氢氧化铝

答案: C

20. 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者,宜使用的药物是

- A: 多烯磷脂酸胆碱
- B: 甘草酸二铵
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 葡醛内酯

答案: A

21. 易引起吉海反应的药物是()

- A: 四环素
- B: 诺氟沙星
- C: 青霉素
- D: 庆大霉素

答案: C

22. 最常见不良反应为干咳,严重不良反应为血管神经性水肿的是

- A: 地高辛
- B: 氨氯地平
- C: 卡托普利
- D: 哌唑嗪

答案: C

23. (2021 年真题) 关于抗心力衰竭药物沙库巴曲缬沙坦的说法，错误的是 ()

A: 通过抑制脑啡肽酶，同时阻断血管紧张素 II 的 1 型受体 (AT1) 起效

B: 适用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV 级，LVEF $\leq$ 40%) 成年患者

C: 与血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 合用具有协同作用

D: 血钾水平 >5

答案: C

24. 阻止胞苷酸转化为脱氧胞苷酸

A: 甲氨蝶呤

B: 阿糖胞苷

C: 羟基脲

D: 氟尿嘧啶

答案: C

25. 蛋白结合率较高 ($>70\%$) 的头孢菌素类是

A: 头孢呋辛

B: 头孢吡肟

C: 头孢噻肟

D: 头孢曲松

答案: D

26. 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿药是

A: 呋塞米

B: 氢氯噻嗪

C: 螺内酯

D: 乙酰唑胺

答案：C

27. (2020 年真题) 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

A: 利巴韦林

B: 更昔洛韦

C: 拉米夫定

D: 阿德福韦酯

答案：A

28. 甲氧苄啶联用华法林使

A: 白细胞减少风险增加

B: 半衰期缩短

C: 肾毒性增加

D: 抗凝作用增强

答案：D

29. 可引起胃肠道出血的是()

A: 氢氯噻嗪

B: 氨苯蝶啶

C: 螺内酯

D: 呋塞米

答案：D

30. 新生儿出血宜选用

A: 维生素 B12

B: 香豆素类

C: 肝素

D: 维生素 K1

答案：D

31. 属于还原酶抑制剂的是()

A: 度他雄胺

B: 西地那非

C: 他达拉非

D: 坦洛新

答案：A

32. (2015 年真题) 属于刺激性泻药的是 ()。

A: 酚酞

B: 乳果糖

C: 甘油 (开塞露)

D: 聚乙二醇 4000

答案：A

33. 应用雌激素时需要停药的指征是

A: 肝功异常

B: 乳房胀痛

C: 突破性出血

D: 性欲改变

答案：C

34. (2017 年真题) 应用维生素 B12 治疗巨幼红细胞性贫血 48 小时内，应监测的电解质是 ()

A: 钠

B: 钾

C: 锂

D: 钙

答案：B

35. 呋塞米发挥利尿作用的部位在

A: 近曲小管

B: 髓袢升支厚壁段和远曲小管初段

C: 髓袢升支粗段

D: 肾小球

答案：C

36. (2016 年真题) 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是

A: 氯化铵

B: 苯丙哌林

C: 右美沙芬

D: 可待因

答案：B

37. 抑制过敏介质释放，主要用于预防哮喘发作的药物是

A: 特布他林

B: 倍氯米松

C: 异丙肾上腺素

D: 色甘酸钠

答案：D

38. 铂类化合物治疗期间，需要每周检查的项目是

- A: 血钙
- B: 肾功能
- C: 全血计数
- D: 肝功能

答案：C

39. 可引起脊髓水平镇痛、镇静和轻度呼吸抑制的受体是

- A: δ 受体
- B: $\mu 1$ 受体
- C: $\mu 2$ 受体
- D: K 受体

答案：D

40. 与长春新碱合用可增强神经系统及血液系统毒性

- A: 铂类
- B: 替尼泊苷
- C: 异烟肼
- D: 非格司亭

答案：C

41. (2019 年真题) 患者，女，孕 8 周，诊断为“甲状腺功能减退症”，给予左甲状腺素钠片治疗。对该患者的用药指导，错误的是 ()

- A: 服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降，应及时就诊
- B: 应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服
- C: 孕期甲减可能对胎儿造成不良影响，服药期间应监测甲功
- D: 左甲状腺素钠极少通过胎盘，治疗剂量下对胎儿无不良影响

答案：B

42. 长期使用应定期检查甲状腺功能的药物是

- A: 利多卡因
- B: 普罗帕酮
- C: 胺碘酮
- D: 索他洛尔

答案：C

43. （2019 年真题）沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

- A: 螺内酯
- B: 呋塞米
- C: 贝那普利
- D: 比索洛尔

答案：C

44. 林可霉素类的主要作用靶点是

- A: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- B: 核糖体的 30S 亚基
- C: 细胞内膜 PBP
- D: 核糖体的 50S 亚基

答案：D

45. （2021 年真题）通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（）

- A: 华法林
- B: 丙戊酸钠
- C: 茶碱

D: 地高辛

答案：A

46. 氯霉素的下述不良反应中，哪项是与剂量和疗程无关的严重反应

A: 不可逆的再生障碍性贫血

B: 二重感染

C: 灰婴综合征

D: 可逆的各类血细胞减少

答案：A

47. (2018 年真题) 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是 ()

A: 头孢呋辛

B: 头孢唑林

C: 头孢他啶

D: 头孢米诺

答案：C

48. 氯吡格雷与奥美拉唑因竞争共同的肝药酶而避免联合应用，该肝药酶是

A: CYP2C19

B: CYP1A2

C: CYP2E1

D: CYP2D6

答案：A

49. 抑制细菌叶酸合成的抗菌药物是

A: 头孢米诺

B: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶

C: 利福喷丁

D: 头孢吡肟

答案: B

50. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

A: 莫沙必利

B: 碳酸钙

C: 枸橼酸铋钾

D: 奥关拉唑

答案: A

51. 以下药物中，易被胃酸破坏的是

A: 罗红霉素

B: 克拉霉素

C: 红霉素

D: 阿奇霉素

答案: C

52. 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可作用与慢性心力衰竭治疗的利尿剂是

A: 氢氯噻嗪

B: 呋塞米

C: 乙酰唑胺

D: 螺内酯

答案: D

53. (2018 年真题) 可用于治疗非何杰金 (非霍奇金) 淋巴瘤的单克隆抗体是 ()

- A: 贝伐珠单抗
- B: 曲妥珠单抗
- C: 西妥昔单抗
- D: 利妥昔单抗

答案：D

54. 可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

- A: 利血平
- B: 阿昔莫司
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 依折麦布

答案：B

55. 利福平可促进雌激素的代谢或减少其肠肝循环，降低口服避孕药的作用，导致月经不规则，月经间期出血和计划外妊娠。所以，患者服用利福平时，应改用其他避孕方法。

- A: 药理作用拮抗
- B: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- C: 不良反应叠加
- D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案：D

56. 防止急性深静脉血栓形成的药物是

- A: 达肝素钠
- B: 香豆素类
- C: 维生素 B12
- D: 维生素 K1

答案：A

57. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案正确的是

- A: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道以防止进一步感染
- B: 鼓膜穿孔前用无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用 2%酚甘油滴耳序贯治疗
- C: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- D: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

答案：C

58. 妨碍铁剂在肠道吸收的物质是()

- A: 食物中的高磷、鞣酸等
- B: 枸橼酸钠
- C: 维生素 C
- D: 食物中的半胱氨酸

答案：A

59. 人体主要的热能来源之一，被用来补充热量是

- A: 维生素
- B: 氨基酸
- C: 葡萄糖
- D: 果糖

答案：C

60. (2020 年真题) 通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 吗氯贝胺
- B: 舍曲林
- C: 度洛西汀
- D: 阿米替林

答案: A

61. 可发生双硫仑样反应的是

- A: 奥硝唑+乙醇
- B: 替硝唑+华法林
- C: 甲硝唑+乙醇
- D: 替硝唑+苯巴比妥

答案: C

62. 对红霉素的描述，下列不正确的是()

- A: 具有肝脏毒性
- B: 属繁殖期杀菌剂
- C: 抗菌谱与青霉素相似但略广
- D: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

答案: B

63. 下述属于第三代 α

- A: 十一酸睾酮
- B: 酚苄明
- C: 坦洛新
- D: 哌唑嗪

答案：C

64. 袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是()

- A: 布美他尼
- B: 托拉塞米
- C: 依他尼酸
- D: 呋塞米

答案：A

65. 服用异烟肼进行抗结核治疗的患者，为预防周围神经炎，应补充的维生素是（）

- A: 维生素 B2
- B: 维生素 B6
- C: 维生素 A
- D: 维生素

答案：B

66. 关于容积性泻药的叙述，错误的是

- A: 服用容积性泻剂的同时应摄入足够水分
- B: 可能会影响华法林的吸收
- C: 主要用于轻度便秘患者的治疗
- D: 促进钙和铁的吸收

答案：D

67. 催眠药应()

- A: 睡前内服
- B: 饭前内服

C: 定时内服

D: 空腹内服

答案: A

68. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$

A: 低分子肝素

B: 维生素 C

C: 鱼精蛋白

D: 维生素 K

答案: C

69. 异烟肼联用氢氧化铝使

A: 肝毒性增加

B: 月经不规则

C: 吸收减少

D: 疗效减弱

答案: C

70. 酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是()

A: 心肌损伤

B: 骨髓抑制

C: 痤疮样皮疹

D: 血压升高

答案: C

71. 仅对浅表真菌感染有效的药物()

A: 两性霉素 B

B: 伊曲康唑

C: 灰黄霉素

D: 氟康唑

答案: C

72. 主要经肝代谢，主要代谢产物有促智作用的药物是

A: 舍曲林

B: 多奈哌齐

C: 艾地苯醌

D: 阿尼西坦

答案: D

73. 属于贝丁酸类调节血脂药是()。

A: 阿昔莫司

B: 依折麦布

C: 阿托伐他汀

D: 非诺贝特

答案: D

74. 其缓释片剂应与食物同服的是

A: 氨曲南

B: 阿奇霉素

C: 克拉霉素

D: 红霉素

答案: C

75. 下列哪种药物属于抑菌药

A: 四环素

B: 庆大霉素

C: 青霉素 G

D: 头孢氨苄

答案: A

76. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。

A: 胶体果胶铋胶囊

B: 克拉霉素

C: 阿莫西林

D: 埃索美拉唑

答案: A

77. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

A: 能有效地抑制夜间基础胃酸分泌

B: 抑酸作用强大，持续时间长

C: 停药后复发率低

D: 很少发生耐药

答案: A

78. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和 () 联合有协同作用。

A: β 受体阻断剂

B: 噻嗪类利尿剂

C: 留钾利尿剂

D: 人促红素

答案：A

79. 强心苷的心脏毒性反应中最常见的心律失常是

A: 房颤

B: 房性期前收缩

C: 二联律

D: 室性期前收缩

答案：D

80. 可降低外周血管阻力, 还可减轻前列腺增生症状的药物是()

A: 哌唑嗪

B: 格列吡嗪

C: 利血平

D: 坎地沙坦

答案：A

81. 抑制绦虫细胞内线粒体的氧化磷酸化过程, 高浓度时可抑制虫体呼吸并阻断对葡萄糖的摄取, 从而使之发生变质的是

A: 氯硝柳胺

B: 三苯双脒

C: 葡萄糖酸锑钠

D: 伯氨喹

答案：A

82. 甲状腺功能亢进症的内科治疗宜选用()

A: 甲状腺素

B: 吡格列酮

C: 小剂量碘剂

D: 甲巯咪唑

答案: D

83. 有关维生素 K 的描述，错误的是

A: 维生素 K

B: 天然维生素 K 为脂溶性

C: 参与凝血因子的合成

D: 对于应用链激酶所致出血有特效

答案: D

84. 哮喘急性发作首选的药物是

A: 孟鲁司特片

B: 布地奈德福莫特罗吸入剂

C: 羧甲司坦口服液

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案: D

85. (2019 年真题) 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是 ()

A: 苄星青霉素

B: 甲硝唑

C: 呋喃妥因

D: 庆大霉素

答案: B

86. 属于甲状腺激素类药的是

A: 生长抑素

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 醋酸去氨加压素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/115342003132012033>