

## 病理学(医学高级)：局部血液循环障碍

姓名：\_\_\_\_\_ 年级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、多项选择题：大手术后形成血栓的原因是( )A. 血流缓慢

B. 静脉受压


C. 纤维蛋白原、凝血酶原增加

D. 血小板数量增加、粘性增高

E. 血浆中凝血因子含量增加

2、单项选择题：死者，女性，30岁，急性肺炎合并败血症而亡。尸检时全身皮肤黏膜大量淤血点，多脏器出现梗死灶。

肺脏见一梗死灶(如图)，该病变属于( )



A. 出血性梗死

B. 贫血性梗死

C. 凝固性坏死

D. 液化性坏死

E. 以上都不是

3、单项选择题：血栓中的纤维蛋白被溶解称为( )A. 血栓再通

B. 溶解吸收

C. 血栓机化

D. 血栓钙化

- E. 血栓栓塞
- 4、单项选择题：脂肪栓塞患者死亡的最常见原因是（ ）。A. 急性左心衰竭  
B. 急性右心衰竭或窒息  
C. 中毒性休克  
D. 肾功能衰竭  
E. 脑出血
- 5、单项选择题：一患者主诉心悸气短，两下肢水肿入院，查体：颈静脉怒张，心尖区可闻及舒张期杂音，肝肋缘下3cm，轻度压痛，AFP正常。患者的肝脏可能出现下列哪一种病变（ ）。A. 肝细胞癌  
B. 慢性肝淤血  
C. 肝脂肪变性  
D. 慢性肝炎  
E. 肝硬化
- 6、多项选择题：可以引起槟榔肝的疾患有（ ）。A. 上腔静脉受压  
B. 门静脉高压症  
C. 肺源性心脏病  
D. 三尖瓣狭窄  
E. 缩窄性心包炎
- 7、单项选择题：下述哪种因素与血栓形成无关（ ）。A. 血管内膜损伤  
B. 血流缓慢  
C. 血小板数量增多  
D. 癌细胞崩解产物  
E. 纤维蛋白溶酶增加
- 8、单项选择题：肝淤血的形成原因是（ ）。A. 肝小叶间静脉淤血和结缔组织增生  
B. 肝脏出血和肝细胞坏死  
C. 肝细胞坏死和结缔组织增生  
D. 中央静脉及肝窦淤血和肝细胞脂肪变性  
E. 小胆管和结缔组织增生
- 9、多项选择题：内皮细胞具有防止心血管内血液凝固的功能是因为（ ）。A. 它是一个单细胞屏障  
B. 分泌凝血酶调节蛋白  
C. 合成组织型纤溶酶原活化因子  
D. 分泌ADP酶  
E. 合成蛋白S
- 10、配伍题：侧支循环的建立（ ）淤血（ ）A. 急性阑尾炎  
B. 伤寒  
C. 肝硬化时食管静脉曲张  
D. 雷诺氏病  
E. 槟榔肝
- 11、单项选择题：胸部手术时要注意防止（ ）A. 脂肪栓塞  
B. 肿瘤细胞栓塞  
C. 气体栓塞  
D. 羊水栓塞  
E. 血栓栓塞

12、多项选择题：破裂性出血可见于( )A. 再生障碍性贫血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/116012013010010125>