

全科医学住院医师：内科主要疾病考试试题（强化练习）

1、单选 男性，20岁，周身水肿半个月，近日来出现呼吸困难，少尿。BP170/120mmHg，全身高度水肿，并伴有右侧胸腔及腹腔积液，在外院诊断肾病综合征。此患者首选治（江南博哥）疗药物应是哪一种（）。

- A. 雷公藤多苷
- B. 阿司匹林
- C. 青霉素注射
- D. 双嘧达莫
- E. 泼尼松

正确答案：E

2、填空题 肺功能检查的主要项目有（）、（）、（）、（）、（）。

正确答案：肺通气功能测定；肺容量测定；肺换气功能测定；呼吸力学参数；气道反应性测定

3、单选 男性，35岁，半年来逐渐贫血，不发热，无出血症状，尿呈浓茶色，巩膜可见轻度黄染，肝、脾不肿大，血红蛋白82g/L，白细胞 $5.6 \times 10^9 / L$ ，血小板 $93 \times 10^9 / L$ ，网织红细胞0.05，为确诊应首选哪项检查（）。

- A. 血清铁适量
- B. 骨髓穿刺
- C. 尿含铁血黄素
- D. 抗人球蛋白试验
- E. 酸化血清溶血试验

正确答案：E

4、单选 引起继发性甲状腺功能减低症最常见的病因是（）。

- A. 希恩综合征
- B. 缺碘性地方性甲状腺肿
- C. 慢性淋巴性甲状腺炎
- D. 先天性甲状腺发育不良
- E. 甲状腺大部切除术后

正确答案：A

5、单选 高血压急症不宜的是（）。

- A. 利血平
- B. 硝普钠
- C. 硝酸甘油
- D. 地尔硫卓
- E. 速尿

正确答案：E

6、单选 慢性再生障碍性贫血患者出现酱油色尿，下列哪项检查最具有诊断意义（）。

- A. 热溶血试验
- B. 蔗糖溶血试验
- C. 酸溶血试验
- D. 荧光斑点试验
- E. 抗人球蛋白试验

正确答案：C

参考解析：慢性再生障碍性贫血患者出现酱油色尿应考虑合并阵发性睡眠性血红蛋白尿（PNH）。确诊首选酸溶血试验（Ham 试验），特异性高。热溶血试验和蔗糖溶血试验因特异性差，常作为筛选方法。

7、单选 男，×岁，受凉后咳嗽，咳少量黏液脓痰，伴发热，右侧胸痛并右肩及右上腹痛；查体：体温 39.1℃，脉搏 96 次 / 分，呼吸 24 次 / 分；右侧胸廓呼吸动度减弱，语颤增强，右肺下叩诊浊音，可听到支气管呼吸音并响亮的中等湿啰音；血常规化验：白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性 0.90 该患者的中等湿啰音产生原理是（）。

- A. 气体通过气管、支气管内的液体，形成水泡随即破裂而产生的声音
- B. 气体通过狭窄的气管、支气管腔产生震动引起的声音
- C. 炎症侵入胸膜，引起脏、壁层胸膜粗糙、摩擦而产生的声音
- D. 是肺部炎症时，实变部分传音良好，支气管呼吸音经肺实变部分传到胸壁的声音
- E. 是病人无力排痰，气体通过分泌物积聚的大气道所产生的声音

正确答案：A

8、单选 小儿腹部巨大肿块为（）。

- A. 肾结核的主要临床表现
- B. 肾结石的主要临床表现
- C. 膀胱癌的主要临床表现
- D. Wilms 瘤的主要临床表现
- E. 前列腺增生症的主要临床表现

正确答案：D

9、单选 α -葡萄糖苷酶抑制剂的最佳服用时间是（）。

- A. 晨起空腹时
- B. 餐前半小时
- C. 与进餐同时
- D. 餐后半小时
- E. 任何时间

正确答案：C

参考解析：

α -葡萄糖苷酶抑制剂是影响碳水化合物吸收的药物，主要降糖机制为：能抑制小肠刷状缘上各种 α -葡萄糖苷酶，使淀粉类分解为麦芽糖进而分解为葡萄糖的速度和蔗糖分解为葡萄糖的速度减慢，其中对葡萄糖淀粉酶的抑制作用最强。

α -葡萄糖苷酶抑制剂主要副作用为胃肠道反应，具体表现有腹胀、胃胀、上腹部灼痛、腹泻或便秘。故服药宜从小剂量开始，逐渐增量，最佳服药时间为进餐前即刻或开始吃第一口饭时嚼碎吞服。

10、单选 男性，30岁。活动后心悸气短3年，腹胀，浮肿1个月。查体：心界扩大，心尖部舒张期奔马律，心音低钝。心电图：低电压，多发多源室性期前收缩。超声：左室内径64mm，呈大心腔小瓣口征，室壁运动减弱。诊断是（）。

- A. 冠心病、心律失常、心衰
- B. 风湿性心脏病联合瓣膜病
- C. 扩张型心肌病
- D. 心包积液
- E. 先心病、房缺

正确答案：C

11、单选 属于 α_1 受体阻滞剂的降压药是（）。

- A. 卡托普利
- B. 硝苯地平
- C. 维拉帕米
- D. 阿替洛尔
- E. 哌唑嗪

正确答案：E

参考解析：主动脉狭窄多数为先天性血管畸形，少数为多发性大动脉炎所引起，特点为上肢血压增高而下肢血压不高或降低，呈上肢血压高与下肢血压不高或降低的反常现象。在肩胛间区、胸骨旁、腋部可有侧支循环动脉的搏动和杂音或腹部听诊有血管杂音。胸部X线摄影可显示肋骨受侧支动脉侵蚀引起的切迹。主动脉造影可确定诊断

12、单选 男性，18岁，3周前咽痛，近1周面部浮肿、尿少，尿蛋白（++），尿红细胞 $10\sim 20/HP$ ，红细胞管型 $0\sim 1/HP$ ，颗粒管型 $0\sim 1$ 个/HP，诊断为（）。

- A. 慢性肾炎急性发作
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 急性肾炎
- D. 隐匿性肾炎
- E. 急性前列腺炎

正确答案：C

13、单选 男，46岁。自发性或运动后心慌、出汗、饥饿伴精神症状8个月，

严重时曾发生昏迷，进糖水后清醒，发作时血糖 1.8~2.2mmol/L。身高 172cm，体重 91kg。发生该情况最可能的原因是（）。

A. 自主神经功能紊乱

- B. 1 型糖尿病
- C. 2 型糖尿病
- D. 胰岛素瘤
- E. 反应性低血糖

正确答案： D

14、单选 急性早幼粒细胞白血病（ ）。

- A. 可见 Auer 小体
- B. 红细胞大小不等，中心淡染区扩大
- C. 细胞中含粗大嗜清颗粒比例 $\geq 30\%$
- D. 骨髓增生低下，造血细胞减少
- E. 红细胞中有染色质小体

正确答案： C

15、单选 高血压伴有低血钾应首先考虑（ ）。

- A. 主动脉缩窄
- B. 原发性醛固酮增多症
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 继发于慢性肾炎的高血压
- E. 肾动脉狭窄

正确答案： B

参考解析： 原发性醛固酮增多症是由于肾上腺皮质病变致醛固酮分泌增多，肾素-血管紧张素活性受抑，临床表现为高血压、低血钾、碱血症、碱性尿为特征的一组继发性高血压。对同时有高血压、低血钾患者应疑为原发性醛固酮增多症。如有高血压、低血钾、高尿钾、碱血症、碱性尿、醛固酮分泌增高和血浆肾素、血管紧张素活性受抑，则可确诊

16、单选 甲亢内科治疗停药首选实验室检查（ ）。

- A. TT4、FT4
- B. TT3、TT3
- C. TRAb
- D. rT3
- E. 甲状腺摄 ^{131}I

正确答案： C

参考解析： 高功能甲状腺腺瘤多为单发结节或囊肿，伴有血清 T3、T4 升高，核素显像为：单发热结节影像。

17、单选 全血细胞减少、骨髓增生低下、造血细胞减少，这样的血象骨髓象不见于（ ）。

- A. 再障
- B. 低增生性白血病
- C. 溶血性贫血

D. PNH

E. 骨髓纤维化

正确答案：B

18、单选 男性，16岁，近半个月全身水肿。检查尿蛋白（++++），透明管型2~3个/HP，血红蛋白120g/L，血压120/80mmHg，血BUN5mmol/L，血肌酐178 μ mol/L。出现蛋白尿的主要原因是（）。

A. 肾小球滤过膜的屏障作用受损

B. 蛋白质的摄入量不足

C. 肝脏合成蛋白质的不足

D. 肾小管重吸收蛋白质障碍

E. 白蛋白分解代谢增强

正确答案：A

19、单选 血清铁减低、总铁结合力增高及转运铁蛋白饱和度减低见于（）。

A. 感染性贫血

B. 海洋性贫血

C. 缺铁性贫血

D. 再生障碍性贫血

E. 铁粒幼细胞性贫血

正确答案：C

20、单选 男性，30岁，主诉乏力3个月，伴左上腹饱胀感，体检：浅表淋巴结未及，肝未及，脾肋下5cm，Hb90g/L，白细胞 $170 \times 10^9/L$ ，血小板 $300 \times 10^9/L$ 。原粒细胞0.01，晚幼粒细胞0.4，杆粒细胞0.34，分叶粒细胞0.1，嗜碱粒细胞0.02，NAP（-）。最有希望达到根治的治疗方法是（）。

A. 同种异基因骨髓移植

B. 干扰素

C. 脾移植

D. 脾切除

E. 维A酸

正确答案：A

21、单选 女性，24岁，尿频、尿痛1年余，用一般消炎药不见好转，有米汤尿和终末血尿史。为了确诊哪样检查意义大（）。

A. B超

B. IVU

C. 膀胱镜

D. CT

E. 肾图

正确答案：B

22、单选 女性，20岁，病史10天，发热，贫血，出血，肝、脾轻度肿大，颈部淋巴结肿大，伴关节痛，血红蛋白60g/L，白细胞 $35 \times 10^9/L$ ，血小板 $80 \times 10^9/L$ ，首先考虑（）。

- A. 病毒感染
- B. 风湿热
- C. 急性白血病
- D. 淋巴病
- E. SLE

正确答案：C

23、单选 男，36岁，5天前发热、咽疼，应用抗生素治疗无效，颈部浅表淋巴结肿大，咽部充血。扁桃体II度肿大，下肢少许瘀斑。白细胞 $16.6 \times 10^9/L$ ，原始细胞0.60，血红蛋白80g/L，血小板 $34 \times 10^9/L$ 。为明确诊断应做的检查是（）。

- A. 血小板抗体
- B. 血清铁蛋白
- C. 骨髓扫描
- D. 淋巴结活检
- E. 骨髓涂片细胞学检查

正确答案：E

24、单选 男性，68岁。心悸气短、腹痛下肢浮肿2周入院，诊断为扩张型心肌病，心功不全。在住院治疗过程中出现洋地黄中毒。首选哪种药物以增强心肌收缩力（）。

- A. 异丙肾上腺素
- B. 多巴酚丁胺
- C. 多巴胺
- D. 硝普钠
- E. ACEI

正确答案：B

25、单选 男性，25岁，反复间断水肿5年，近日来出现恶心、呕吐，头痛，呼吸困难，BP240/140mmHg，心前区可听到广泛的心包摩擦音，发热，尿常规示尿比重1.010，Hb60g/L，BUN40mmol/L，Cr1890 $\mu\text{mol/L}$ 。一年前患者血液透析治疗，现停止血透1个月。此患者病情危重的表现是（）。

- A. 贫血
- B. 心包摩擦音
- C. 高血压
- D. 少尿
- E. 内分泌失调

正确答案：B

26、单选 男性，25岁，背部刀伤，伤口流血2小时。查体：神志尚清楚，诉口渴，皮肤苍白、稍冷，脉搏110次/分，血压12.9.33kPa（90.70mmHg），脉压小，表浅静脉塌陷，尿少。此患者失血量约占全身血容量的多少（）。

- A. 20%
- B. <20%
- C. 20%~40%
- D. 40%左右
- E. 50%左右

正确答案：C

27、单选 女性，20岁，劳累后心悸、气短5年。查体：心尖部有抬举感，BP120/50mmHg，肱动脉可及枪击音，股动脉处可闻及Duroziez杂音。X线片示左房、左室大，最可能的诊断是（）。

- A. 风湿性心脏病，二尖瓣狭窄兼关闭不全
- B. 风湿性心脏病，二尖瓣狭窄
- C. 风湿性心脏病，二尖瓣狭窄合并主动脉瓣关闭不全
- D. 风湿性心脏病，主动脉瓣关闭不全
- E. 扩张型心肌病

正确答案：D

28、单选 男，54岁，2型糖尿病15年，长期口服格列本脲，10mg/d。查体：血压140/90mmHg，心、肺和腹部检查未见异常，双下肢无水肿。眼底检查：视网膜病变III期。空腹血糖6.8mmol/L，餐后2h血糖10.6mmol/L，血尿素氮6.2mmol/L，血肌酐92.5mmol/L。尿常规检查尿糖5.0mmol/L，蛋白阴性。糖尿病治疗应选择（）。

- A. 磺脲类降血糖药加量
- B. 双胍类降血糖药
- C. α -葡萄糖苷酶抑制剂
- D. 噻唑烷二酮类
- E. 胰岛素

正确答案：E

29、单选 糖尿病患者胰岛素治疗最主要的不良反应是（）。

- A. 注射处红肿疼痛
- B. 注射处脂肪萎缩
- C. 发生低血糖
- D. 荨麻疹样皮疹
- E. 过敏性休克

正确答案：C

参考解析：胰岛素的主要不良反应是低血糖，与药物剂量过大和（或）饮食失调有关，多见于重型病人，尤其接受强化治疗者。胰岛素过敏反应可表现为局

部（荨麻疹样皮疹）或严重反应（血清病、过敏性休克），均罕见。

30、单选 某男，54岁，高血压病史2年，属低肾素型高血压，首选方案为（）。

- A. 利尿剂合钙拮抗剂
- B. 以上都不是
- C. 利尿剂合ACEI
- D. β 受体阻滞剂合ACEI
- E. β 受体阻滞剂合钙拮抗剂

正确答案：A

31、单选 高血压合并糖尿病患者，血压应控制在（）。

- A. <130/80mmHg
- B. <130/85mmHg
- C. <135/85mmHg
- D. <140/90mmHg
- E. <150/90mmHg

正确答案：A

32、单选 抑制前列腺素作用的药物是（）。

- A. 布洛芬
- B. 卡托普利
- C. 泼尼松
- D. 阿司匹林
- E. 苯丙酸诺龙

正确答案：A

33、单选 螺内酯、呋噻米属于（）。

- A. 利尿剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. 钙通道阻滞剂
- D. ACEI
- E. 降压中成药

正确答案：A

34、单选 男性，56岁，左颈淋巴结肿大，伴发热。检查为弥漫性混合性细胞淋巴瘤，左腹股沟淋巴结2cm×2cm大小，无压痛，脾肋下2cm，骨髓淋巴瘤细胞0.12，诊断属何期（）。

- A. IIA
- B. IB
- C. IIIB
- D. IVA
- E. IVB

正确答案：E

35、单选 女性，76岁，因反复晕厥伴抽搐半天入院，既往有高血压病史20年。查体：血压200/50mmHg，心率慢，律齐，心尖部第一心音强弱不等，心底部有2/6级喷射样收缩期杂音。此患者反复晕厥，抽搐的原因可能是（）。

- A. 高血压脑病
- B. 高血压危象
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 完全性房室传导阻滞心室率过缓，致阿-斯发作
- E. 肥厚型梗阻性心肌病一

正确答案：D

36、单选 病变肺部叩诊浊音，语颤增强，闻及支气管呼吸音，常见于（）。

- A. 支原体肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 慢性支气管炎急性发作期
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管扩张症

正确答案：B

参考解析：支气管哮喘发作时胸部呈过度充气状态，有广泛的哮鸣音，呼气音延长。但在轻度哮喘或非常严重哮喘的发作时，哮鸣音可不出现。慢支合并哮喘可闻及广泛哮鸣音并伴呼气期延长。早期或干性支气管扩张症可无异常肺部体征，病变重或继发感染时常可闻及下胸部、背部固定而持久的局限性粗湿啰音，有时可闻及哮鸣音。

37、单选 体内缺铁初期的最早最可靠的诊断依据是（）。

- A. 血清总铁结合力增高
- B. 典型的小细胞低色素性贫血血象
- C. 血清铁减低
- D. 骨髓储存铁减少或缺乏
- E. 血清转铁蛋白饱和度下降

正确答案：D

38、单选 男性，58岁，进行性贫血。消瘦、乏力半年。有时右腹隐痛，无腹泻。查体：右中腹部扪及肿块，肠鸣音活跃。下列各项检查可明确诊断的是（）。

- A. 纤维结肠镜
- B. CEA
- C. CT
- D. B超
- E. X线钡餐检查

正确答案：A

39、单选 男性，54岁。胸闷、劳累后胸痛4年，疑诊肥厚型心肌病来诊。

诊断肥厚型梗阻性心肌病时在心脏听诊上不需和下列哪种疾病相鉴别（）。

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 风湿性二尖瓣关闭不全
- C. 先天性主动脉瓣口狭窄
- D. 室间隔缺损
- E. 陈旧性心肌梗死

正确答案：A

40、填空题 急性胆囊炎按病理可分为（）、（）、（）。

正确答案：急性单纯性胆囊炎；急性化脓性胆囊炎；急性坏疽性胆囊炎

41、单选 在心肺复苏期间，对于难治性室速和室颤，建议应用（）。

- A. 肾上腺素（0.5~1.0mg）
- B. 阿托品（0.6~2.0mg）
- C. 胺碘酮 [150~500mg 静脉滴注，10mg/（kg·D. 静脉滴注）]
- D. 10%葡萄糖酸钙 5~10ml 静脉滴注
- E. 异丙基肾上腺素（15~20 μg / min）

正确答案：C

42、单选 用药治疗4周尿蛋白减少见于（）。

- A. 肾病综合征对激素高度敏感
- B. 肾病综合征对激素敏感
- C. 肾病综合征对激素低敏感
- D. 肾病综合征对激素耐药
- E. 肾病综合征对激素依赖

正确答案：B

43、单选 男性，63岁，因渐进性排尿困难、夜尿增多就诊，医生询问病史后给患者做检查。该患者需测残余尿，下列方法中哪项损伤小，最简便并可反复测定（）。

- A. 膀胱镜检查
- B. 排尿后B超
- C. 排尿后导尿
- D. 膀胱造影
- E. 排尿性尿路造影

正确答案：B

44、单选 如果普遍而急剧的脑小动脉粥样硬化，使毛细血管壁缺血，同时通透性增加，可导致（）。

- A. 高血压脑病
- B. 腔隙性脑梗塞
- C. 脑血栓形成
- D. 脑出血

E. 脑水肿

正确答案： C

45、填空题 冠心病主要分为（）、（）、（）、（）、（）。

正确答案： 心绞痛；心肌梗死；隐性或无症状性冠心病；缺血性心肌病及心力衰竭；猝死

46、单选 女性，48岁，行胃大部分切除术，输血150ml后，出现寒战，肌肉注射异丙嗪25mg，继续输血，半小时后，体温39.7℃，血压70.60mmHg，脉搏160次/分，发绀，意识不清，烦躁不安，可能原因是（）。

- A. 发热反应
- B. 输血后出血倾向
- C. 溶血反应
- D. 细菌污染反应
- E. 输血传染疟疾

正确答案： D

47、单选 女性，38岁，诊断风湿性心脏病二尖瓣狭窄（中度），突发心悸2天，伴呼吸困难，不能平卧，查体：BP95/75mmHg，口唇发绀，双肺较多湿啰音，心率150次/分，第一心音强弱不等，节律绝对不规则，心尖部舒张期隆隆样杂音，肝不大，下肢无水肿。触诊桡动脉搏动最可能有（）。

- A. 短绌脉
- B. 奇脉
- C. 水冲脉
- D. 交替脉
- E. 以上均不是

正确答案： A

48、单选 男性，15岁，全身高度水肿，尿蛋白（++++），管型少许，血浆清蛋白15g/L，血胆固醇10mmol/L，用泼尼松60mg/d治疗1周，病情无好转，此时应采用下列哪项措施（）。

- A. 使用地塞米松
- B. 停用泼尼松
- C. 继续用泼尼松原剂量
- D. 加用ACTH
- E. 加用环磷酰胺

正确答案： C

49、单选 FAB分类，哪项POX反应、非特异酯酶均阴性（）。

- A. M2a
- B. ALL-L3
- C. M3b
- D. M5

E. M4E0

正确答案：B

50、单选 肺末梢组织充气过度导致（）。

- A. 肺气肿
- B. 肺不张
- C. 肺水肿
- D. 肺脓肿
- E. 肺褐色硬化

正确答案：A

参考解析：急性左心衰时心脏收缩力突然严重减弱，心排血量急剧减少，左室舒张末压迅速升高，肺静脉回流不畅，肺静脉压力快速升高，肺毛细血管压随之升高，使血管内液体渗入到肺间质和肺泡内，形成急性肺水肿

51、填空题 内分泌系统的激素分泌方式有（）、（）、（）、（）。

正确答案：内分泌；自分泌；旁分泌；胞内分泌

52、填空题 流式细胞术检测（）、（）为诊断阵发性睡眠性血红蛋白尿提供直接的证据。

正确答案：CD55；CD59

53、填空题 核素心肌显像检查以（）和（）标记的放射性药物显像剂为最常用。

正确答案：99mT；201Tl

54、单选 女性，32岁。因不明原因发热2周来院门诊，查体示心脏有杂音。拟诊感染性心内膜炎入院。感染性心内膜炎，最常发生于下列哪种情况（）。

- A. 先心病室间隔缺损
- B. 心脏正常的吸毒者
- C. 先心病房缺
- D. 肺源性心脏病
- E. 风湿性瓣膜病

正确答案：E

55、单选 男性，29岁，低热、酱油色尿2个月，体检巩膜黄染，贫血面容，肝、脾不肿大，血红蛋白73g/L，血小板 $100 \times 10^9/L$ ，白细胞 $4.4 \times 10^9/L$ ，网织红细胞计数0.15，尿隐血阴性。为明确诊断应做哪项检查（）。

- A. 骨髓检查
- B. 血红蛋白电泳
- C. Coombs 试验
- D. 外周血涂片观察红细胞形态
- E. Ham 试验

正确答案：E

56、单选 男性，30岁，右下肢近腘窝处被刀刺伤后出现搏动性肿块，逐渐增大伴右下肢麻木，查体见右下肢苍白，腘窝部搏动性肿块大小为5cm×4cm，附近有收缩期杂音，诊断为（）。

- A. 动脉闭合性损伤
- B. 动脉开放性损伤
- C. 动静脉瘘
- D. 动脉假性动脉瘤
- E. 以上都不是

正确答案：D

57、填空题 溃疡病患者上腹痛的特征有（）、（）、（）。

正确答案：慢性；周期性；节律性

58、单选 女性，36岁，主诉头晕、乏力，3年来月经量多，浅表淋巴结及肝、脾未触及，血红蛋白58g/L，白细胞 $8 \times 10^9/L$ ，血小板 $185 \times 10^9/L$ ，血片可见红细胞中心淡染区扩大，网织红细胞计数0.00577。对上述治疗效果反应最早的指标是（）。

- A. 血红蛋白含量
- B. 白细胞数量
- C. 网织红细胞计数
- D. 叶酸、维生素B12含量
- E. 铁蛋白浓度

正确答案：C

59、填空题 在甲亢危象中，抗甲状腺药物必须先于碘剂的应用，其理由为（）。

正确答案：先用碘而后用抗甲状腺药物，碘很快被甲状腺摄取并被氧化为活性元素碘，以供甲状腺合成甲状腺素，从而延长甲亢被控制的时间

60、填空题 糖尿病高渗性昏迷时。大多不出现酮症酸中毒，其根本原因是（）。

正确答案：胰岛细胞残留有分泌一定量胰岛素功能

61、单选 梅毒性心脏病（）。

- A. 肝脏收缩期搏动
- B. Crahan-Steell杂音
- C. Austin-Flint杂音
- D. 收缩中晚期喀喇音
- E. 胸骨左缘2肋间连续性机器样杂音

正确答案：C

62、单选 女性，30岁，因右肾结石行ESWL治疗3天后排出结石，两周复查右肾结石已排净，结石成分分析为磷酸盐结石，预防磷酸盐结石的方法是（）。

- A. 口服别嘌呤醇

B. 口服维生素 B6 或氧化镁

- C. 碱化尿液，口服卡托普利
- D. 碱化尿液，少食动物内脏
- E. 控制感染，口服氢氧化铝凝胶

正确答案：E

63、单选 女性，25岁，低热，便秘腹泻交替3年。查体：右下腹5cmx5cm肿块，质中等，较固定，轻压痛。该病人最有效的治疗方法是（）。

- A. 用棉线束带或绷带压迫内环口
- B. 禁烟、控制呼吸道感染
- C. 注射硬化剂
- D. 疝修补术
- E. 疝囊高位结扎术

正确答案：D

64、单选 内分泌功能减退性疾病常用的替代治疗是给予（）。

- A. 生理剂量的靶腺激素
- B. 药理剂量的靶腺激素
- C. 药理剂量的促垂体激素
- D. 药理剂量的垂体激素
- E. 调节神经递质或受体的药物

正确答案：A

参考解析：对于内分泌功能减退类型，主要采用：①有关缺乏激素的替代治疗或补充治疗，激素替代治疗一般均为生理剂量的靶腺激素替代；②内分泌腺组织移植，提供身体的需要，如胰岛细胞或胰腺移植、甲状旁腺组织移植等。

65、单选 男性，48岁，慢性肾盂肾炎，尿培养为变形杆菌，尿沉渣白细胞5~10个/HP，经内科治疗症状暂时缓解，但实验室检查尿仍然无好转。下一步的治疗应该用什么措施（）。

- A. 做尿细菌的高渗培养后用药
- B. 继续更换抗生素抗炎治疗
- C. 做结核菌培养后用药
- D. 再次做尿细菌培养用药
- E. 做静脉肾盂造影了解是否有梗阻

正确答案：E

66、单选 男性，43岁。活动后胸痛3年，曾诊为肥厚型心肌病，要求明确诊断。肥厚型梗阻性心肌病诊断最有意义的是（）。

- A. IVS：左室后壁 $\geq 1.5: 1$ ，二尖瓣前叶收缩期向前移动
- B. 胸骨左缘3~4肋间有响亮的收缩期杂音
- C. 站立后易晕厥
- D. 用力后心前区闷痛
- E. 左室流出道存在压力阶差

正确答案：A

67、单选 男，70岁，高血压病30年，夜间阵发性呼吸困难10年，间断双下肢水肿、少尿5年。近1个月上述症状加重，伴厌食和腹胀。查体：BP180/100mmHg，端坐位，心界向两侧扩大。心率110次/分，心律绝对不齐。双下肺可闻及中小水泡音。肝肋下4cm，质软，有压痛，移动性浊音阳性。肝颈静脉回流征阳性。双下肢有可凹性水肿。该患者最恰当的心功能评价为（）。

- A. 全心衰竭
- B. 右心衰竭，失代偿
- C. 心功能II级（NYHA分级）
- D. 心功能III级（NYHA分级）
- E. 心功能IV级（NYHA分级）

正确答案：E

参考解析：美国纽约心脏病学会（NYHA）分级是按诱发心力衰竭症状的活动程度将心功能的受损状况分为四级。I级：患者患有心脏病，但日常活动量不受限制，一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。II级：心脏病患者的体力活动受到轻度的限制，休息时无自觉症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。III级：心脏病患者体力活动明显受限，小于平时一般活动即引起上述症状。IV级：心脏病患者不能从事任何体力活动。休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重。根据题述，患者在休息状态下出现心衰症状，考虑为NYHA分级心功能IV级。注意题干问题是心功能的评价而不是诊断

68、单选 男性，68岁，因患前列腺增生症排尿困难，需手术治疗。最好采用哪种治疗（）。

- A. 药物治疗
- B. 经尿道切除前列腺
- C. 膀胱造瘘
- D. 热疗
- E. 经膀胱耻骨上前列腺切除术 **正确答案：E**

69、单选 女，29岁，颈前区肿块4年，近年来易出汗、心悸，渐感呼吸困难。体检：晨起心率105次/分，BP120/70mmHg；无突眼，甲状腺III度肿大，结节状，心电图示：窦性心律不齐。最佳的治疗方法是（）。

- A. 内科药物治疗
- B. 甲状腺大部切除术
- C. 甲状腺全切术
- D. 同位素治疗
- E. 外放射治疗

正确答案：B

70、填空题 军团菌肺炎的治疗首选（），疗程是（）周。

正确答案：大环内酯类抗生素；2~4

71、单选 红细胞分化、成熟障碍所造成的贫血不包括（）。

- A. 地中海贫血
- B. 遗传性球形细胞增多症
- C. 再生障碍性贫血
- D. 巨幼细胞性贫血
- E. 缺铁性贫血

正确答案：B

参考解析：再生障碍性贫血是骨髓造血功能衰竭，巨幼细胞性贫血、缺铁性贫血是生成红细胞的原料缺乏，地中海贫血是珠蛋白数量异常，四者均能引起红细胞分化、成熟障碍。遗传性球形细胞增多症是红细胞膜异常导致的形状改变，不影响红细胞的生成、成熟以及功能，只是极易在通过脾脏时被破坏。

72、填空题 心功能不全是指在静脉回流正常的情况下，（）。

正确答案：心脏排出的血液不足以维持组织代谢需要的一种病理状态

73、单选 男性，16岁，着凉感冒后心悸气短、乏力、食欲不振。查体：心率快，心律不齐，心音低钝，肝大。心电图：ST抬高。X线片：心影轻大。经治疗无好转，出现阿-斯发作电复律转复，可能的诊断为（）。

- A. 重症心肌炎
- B. 急性感染性心内膜炎
- C. 急性心包炎
- D. 急性心梗
- E. 急性克山病

正确答案：A

74、单选 男性，42岁，心悸气短，有时心前区疼痛，查体示胸骨左缘第3肋间粗糙喷射样收缩期杂音。心电图： $v_1 \sim V_3$ T波倒置。超声：室间隔肥厚。该患者易发生（）

- A. 心包缩窄
- B. 心脏破裂
- C. 感染性心内膜炎
- D. 猝死
- E. 脑栓塞

正确答案：D

75、填空题 肥厚性梗阻型心肌病（IHSS）患者的听诊发现，主要为在（）部位闻及（）期粗糙杂音；触诊常可于该区扪及（）期（）。

正确答案：胸骨左缘3~4肋间；收缩期；收缩期；震颤

76、单选 下列哪项符合单纯性甲状腺肿特点（）。

- A. 甲状腺弥漫性肿大
- B. 甲状腺结节性肿大

- C. 吸 I 率正常的甲状腺肿大
- D. 甲状腺功能正常的甲状腺肿大
- E. 慢性甲状腺炎引起的甲状腺肿大

正确答案：D

参考解析：单纯甲状腺肿是指非炎症和肺肿瘤原因，不伴有临床甲状腺功能异常的甲状腺肿。单纯性甲状腺肿是机体缺碘、存在致甲状腺肿物质，以及甲状腺激素合成酶缺陷而引起代偿性甲状腺增生肿大，一般无甲状腺功能异常。病人无甲亢症状，吸 ¹³¹I 率可升高，但高峰不前移，T₃ 抑制试验正常，激素测定正常。

77、单选 男性，28 岁。心悸、气短 10 年，胸闷胸痛，活动中晕厥发作，下肢浮肿。查体：心脏大，心尖部舒张期杂音，胸骨左缘第 3 肋间 3/6 级收缩期杂音，肝大，下肢水肿。心电图：Af。超声：二尖瓣、主动脉瓣增厚，开放受限。本例诊断是（）。

- A. 扩张型心肌病
- B. 感染性心内膜炎心衰
- C. 风湿性心脏病，二尖瓣狭窄并主动脉瓣狭窄
- D. 风湿性心脏病，二尖瓣窄漏并主动脉瓣窄漏
- E. 风湿性心脏病，二尖瓣狭窄并主动脉瓣关闭不全

正确答案：C

78、单选 男性，15 岁，3 周前发热、咽痛，1 周来眼睑轻度水肿，一天前突然剧烈头痛，全身抽搐，意识不清，数分钟后意识清醒，自述头痛，既往无高血压史，BP170/110mmHg，血红蛋白 120g/L，尿常规示蛋白（++），RBC20~30 个/HP，颗粒管型 2~3 个/HP，尿比重 1.025；BUN13.3mmol/L，眼底视乳头轻度水肿，出现抽搐。出现高血压的原发病是（）。

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 慢性肾炎急性发作
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 急进性肾小球肾炎
- E. 肾结核

正确答案：A

79、单选 男性，34 岁，诊断急粒白血病 M₃，化疗时突发 DIC，并迅速发展至消耗性低凝期。下列检查结果，哪项是不符合的（）。

- A. 纤维蛋白原浓度降低
- B. 凝血酶原时间缩短
- C. 血小板数明显减少
- D. 血小板因子 4 水平增高
- E. 抗凝血酶 III 水平减低

正确答案：B

80、单选 男性，22岁，胸痛，同时伴发热、气急，心界明显扩大，心尖搏动位于心浊音界左缘内侧约2cm，肝肋下5cm，心电图示窦性心动过速，低电压，最可能的诊断是（）。

- A. 感染性心内膜炎
- B. 急性心包炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 扩张型心肌病
- E. 病毒性心肌炎

正确答案：B

81、填空题 左房黏液瘤最有特异性的诊断方法是（）。

正确答案：超声心动图

82、单选 糖尿病的诊断是糖尿病症状加上随机血糖（）。

- A. $\geq 7.0\text{mmol/L}$
- B. $\geq 7.8\text{mmol/L}$
- C. $\geq 10.0\text{mmol/L}$
- D. $\geq 11.1\text{mmol/L}$
- E. $\geq 13.9\text{mmol/L}$

正确答案：D

参考解析：糖尿病的诊断标准为：糖尿病症状加任意时间血浆葡萄糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ (200mg/dl)，或FPG $\geq 7.0\text{mmol/L}$ (126mg/dl)，或OGTT2hPC $\geq 11.1\text{mmol/L}$ (200mg/dl)。需重复一次确认，诊断才能成立。

83、单选 患者，女，31岁，受凉后发热咳嗽、咳痰一周气促3天，意识模糊1小时，查体：T39.5℃，血压70/50mmHg，口唇发绀，双肺可闻及较多湿啰音，心率115/分，未闻及杂音，四肢冷，血常规WBC $21 \times 10^9/\text{L}$ ，N0.90。该患者右上肺叩诊音可能出现（）。

- A. 清音
- B. 浊音
- C. 实音
- D. 鼓音
- E. 过清音

正确答案：B

84、单选 随着抗生素广泛应用，引起细菌性肺炎的病原体最主要的变化是（）。

- A. 肺炎球菌肺炎不断增加
- B. 革兰阴性杆菌肺炎不断增加
- C. 军团菌肺炎的发病率逐年下降
- D. 葡萄球菌肺炎很少发生
- E. 支原体肺炎很少发生

正确答案：B

参考解析：目前细菌性肺炎仍是最常见的肺炎，但随着抗生素的广泛应用，以及部分人群免疫防御功能的变化，引起肺炎的病原体有了较大变化，肺炎球菌的比例不断下降，革兰阴性杆菌感染所致肺炎的比例却不断增加，且新的病原体（如军团菌）肺炎的发生率亦逐年增加，故本题选 B。

85、单选 男，42 岁，轻度肥胖，无明显口渴、多饮和多尿现象，空腹血糖 6.9mmol/L。为确定是否有糖尿病，应检查（）。

- A. 糖基化血红蛋白
- B. 24 小时尿糖定量
- C. 口服葡萄糖耐量试验
- D. 复查空腹血糖
- E. 餐后 2 小时血糖

正确答案：C

参考解析：空腹血糖 6.8mmol/L 为空腹血糖受损，宜作口服葡萄糖耐量试验。口服葡萄糖耐量试验是检测葡萄糖代谢功能的试验，主要用于诊断症状不明显或血糖升高不明显的可疑糖尿病。糖基化血红蛋白主要用于糖尿病患者长期血糖控制状态的检查；24 小时尿糖定量是判断糖尿病治疗效果的一项指标；餐后 2 小时血糖临床上用于筛选和发现空腹血糖正常的糖尿病患者的最常用方法。测定餐后 2 小时血糖的意义，一是用于诊断，二是观察糖耐量的恢复情况，借以反映胰岛的功能状态；空腹血糖在 6.1~6.9 之间为空腹血糖受损， ≥ 7.0 考虑糖尿病。故选项为 C。

86、单选 慢性淋巴性甲状腺炎出现甲状腺功能减退替代治疗的原则（）。

- A. 由大剂量开始，逐渐递减到合适剂量
- B. 从小剂量开始，逐渐递增到合适剂量
- C. 甲减越严重，起始剂量应越大
- D. 间断用药有利于预防心绞痛
- E. 待甲状腺功能正常后可停用

正确答案：B

参考解析：不论何种原因甲减，均需甲状腺素替代治疗，除了药物性甲减等暂时性甲减，永久性甲减需终身服药。长期维持剂量根据甲状腺激素和 TSH 测定结果，均从小剂量开始、逐渐递增到合适量。甲减越严重，起始剂量越小，递增越慢，每 2~4 周增加一次。递增太快，易发生心绞痛甚至心肌梗死。

87、单选 男性，67 岁，渐进性排尿困难 3 年，夜尿 5~6 次，直肠指检：前列腺 III，光滑弹性硬，中间沟消失，血 Cr $100\mu\text{mol/L}$ 。B 超：残余尿 200ml，前列腺侧叶增大，中叶无明显增长，心脏、肝功正常，尿常规正常。此患者治疗应采用（）。

- A. 膀胱造瘘术
- B. 经耻骨后前列腺切除术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/116122243240010132>