专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024河南省魏都区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题完整题库带答案（综合卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.巨幼红细胞性贫血应首选

A：维生素B

B：叶酸+维生素B

C：亚叶酸钙

D：维生素B

答案：B

2.作用于DNA拓扑异构酶Ⅱ的抗肿瘤药物是

A：紫杉醇

B：顺铂

C：来曲唑

D：依托泊苷

答案：D

3.噻嗪类利尿药的作用部位是

A：远曲小管近端

B：Na+-K+-2Cl-同向转运子

C：磷酸二酯酶

D：Na+-Cl-共转运子

答案：A

4.作用更为持久和抑制新骨形成的作用极低，可长期滞留于骨组织中，半衰期最长可达300日的第二代钙代谢调节药是

A: 唑来膦酸

B: 依替膦酸二钠

C: 帕米膦酸二钠

D: 阿仑膦酸钠

答案：C

5.作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

A: 克拉维酸

B: 亚胺培南

C: 阿莫西林

D: 氨曲南

答案：D

6.其他 β-内酰胺类抗生素的主作用靶位是

A: 细菌核蛋自体50S亚基

B: 细菌胞浆膜上特殊蛋白PBPs

C: 二氢叶酸合成酶

D: DNA螺旋酶

答案：B

7.镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是（）

A: 重症肌无力

B: 低蛋白血症

C: 癫痫

D: 糖尿病

答案：A

8.属于利胆类保肝药的是

A: 还原型谷胱甘肽

B: 甘草酸二铵

C: 熊去氧胆酸

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：C

9.能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中,渗入结核菌体,在菌体内特定酶的作用下化,且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是()

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 吡嗪酰胺

D: 链霉素

答案：C

10.属于必需磷脂类的保肝药是

A: 还原型谷胱甘肽

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 甘草酸二胺

D: 联苯双酯

答案：B

11.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

A: 选择注射给药

B: 选择短期口服给药

C: 选择长期口服给药

D: 选择注射与口服并用

答案：B

12.可用于骨和关节感染的药物是()

A: 四环素

B: 万古霉素

C: 林可霉素

D: 青霉素

答案：C

13.服用5型磷酸二酯酶抑制剂可导致

A: 肾功能异常

B: 视物模糊、复视

C: 刺激性干咳

D: 高血压

答案：B

14.患者，女性，62岁，有高血压病史14年，伴变异性心绞痛，最近频繁发生阵发性室上性心动过速，宜选用

A: 普萘洛尔

B: 尼莫地平

C: 维拉帕米

D: 硝苯地平

答案：C

15.头孢唑林

A：肾毒性较大

B：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

C：用于非典型病原体感染

D：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

答案：A

16.华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是()。

A：依诺肝素

B：维生素B

C：维生素B

D：维生素B

答案：A

17.（2015年真题）患者，女，45岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是（）。

A：雷尼替丁

B：硝苯地平

C：格列齐特

D：双氯芬酸

答案：D

18.患者，男，35岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A：叶酸

B：蔗糖铁

C：硫酸亚铁

D: 琥珀酸亚铁

答案：B

19.治疗良性前列腺增生症宜选用

A: 坦洛新

B: 利血平

C: 托特罗定

D: 尼莫地平

答案：A

20.（2018年真题）属于膨胀性泻药的是（）

A: 乳果糖

B: 聚乙二醇4000

C: 蓖麻油

D: 硫酸镁

答案：B

21.索他洛尔最严重的不良反应是

A: 呼吸困难

B: 头晕

C: 尖端扭转型室速

D: 心动过缓

答案：C

22.高钠血症是指

A: 血钠＞130mmol/L

B: 血钠＞135mmol/L

C: 血钠＞145mmol/L

D: 血钠＞140mmol/L

答案：C

23.用于肾移植的排异反应和类风湿关节炎的是()

A: 甲泼尼龙

B: 环磷酰胺

C: 硫唑嘌呤

D: 环孢素

答案：C

24.抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是

A: 多柔比星

B: 环磷酰胺

C: 博来霉素

D: 长春新碱

答案：B

25.克罗米通乳膏用于治疗

A: 疥疮

B: 体、股癣

C: 蛲虫感染

D: 寻常痤疮

答案：A

26.西沙必利的典型不良反应是

A: 恶心、呕吐

B: 嗜睡、倦怠等锥体外系反应

C: Q-T间期延长

D: 肝肾功能损害

答案：C

27.下列不属于中效利尿药的是

A: 氢氯噻嗪

B: 氨苯蝶啶

C: 吲哒帕胺

D: 氢氟噻嗪

答案：B

28.与吲达帕胺合用，可导致心律失常的是

A: 考来烯胺

B: 胺碘酮

C: 拟交感药

D: 多巴胺

答案：B

29.高浓度溶液对皮肤和黏膜产生刺激性灼伤，形成一疼痛“白痂”

A: 羟甲唑啉

B: 硼酸

C: 克罗米通

D: 过氧化氢

答案：D

30.下述药物用于治疗消化性溃疡时，不属于抑制胃酸分泌的药物是

A: 雷尼替丁

B: 奥美拉唑

C：氢氧化铝

D：泮托拉唑

答案：C

31.选择性抑制二氢叶酸还原酶，作用于叶酸合成第二步的是

A：甲氧苄啶（TMP）

B：莫西沙星

C：替硝唑

D：磺胺甲噁唑（SMZ）

答案：A

32.患者，男，68岁。发热伴咳嗽1周，表情淡漠、气急。近2天全身散在出血点及淤斑，血压60/40mmHg，血红蛋白120g/L，白细胞12×10

A：维生素C

B：鱼精蛋白

C：维生素K

D：低分子量肝素

答案：B

33.（2015年真题）使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是（）。

A：硫酸镁

B：氯化钙

C：氯化钾

D：果糖

答案：B

34.下列属于二磷酸腺苷P2Y12受体阻断药的是()

A：氯吡格雷

B：阿司匹林

C：阿替普酶

D：双嘧达莫

答案：A

35.主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

A：阿德福韦酯

B：拉米夫定

C：利巴韦林

D：更昔洛韦

答案：C

36.曲妥珠单抗的适应证是

A：转移性结直肠癌

B：人表皮生长因子受体-2（HER-2）过度表达的乳腺癌

C：表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

D：晚期恶性黑色素瘤

答案：B

37.下列关于胺碘酮的叙述错误的是

A：可以用于窦房传导阻滞

B：对室上性和室性心律失常均有效

C：促心率失常反应少

D：适用于合并器质性心脏病的心率失常

答案：A

38.增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性而降低血糖的是()

A：瑞格列奈

B：那格列奈

C：阿卡波糖

D：罗格列酮

答案：D

39.地高辛的中毒血清浓度为()

A：>20ng/ml

B：>2ng/ml

C：>50ng/ml

D：>5ng/ml

答案：B

40.对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

A：第三代头孢菌素

B：第一代头孢菌素

C：第四代头孢菌素

D：第二代头孢菌素

答案：A

41.酰胺醇类药的主要作用靶点是

A：细胞内膜PBP

B：细胞壁丙氨酰丙氨酸

C：核糖体的30S亚基

D：核糖体的50S亚基

答案：D

42.用于治疗疥疮的药物有()

A：克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

B：林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

C：克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维A酸软膏

D：硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比泰芬软膏

答案：B

43.（2021年真题）患者，男，54岁。拟行膝关节置换术，围手术期宣选用的预防用抗菌药物（）

A：头孢曲松

B：头孢唑林

C：头孢他啶

D：头孢噻肟

答案：B

44.患者，男，55岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生与用药相关的不良反应是()。

A：性欲减退

B：脱发

C：体位性低血压

D：心悸

答案：A

45.促使脓性痰中DNA分解，使脓痰黏度下降的药物是

A：氨溴索

B：表面活性剂

C：乙酰半胱氨酸

D：糜蛋白酶

答案：D

46.（2017年真题）属于中枢和外周多巴胺D2受体阻断剂,具有镇吐、刺激泌乳素释放的促胃肠动力药是（）

A: 莫沙必利

B: 多潘立酮

C: 甲氧氯普胺

D: 昂丹司琼

答案：C

47.中毒症状主要表现为胃肠道反应、中枢神经系统反应和心脏毒性三个方面的是

A: 氨氯地平

B: 哌唑嗪

C: 地高辛

D: 卡托普利

答案：C

48.利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

A: 螺内酯

B: 氢氯噻嗪

C: 呋塞米

D: 乙酰唑胺

答案：D

49.早产系指妊娠在多少周之间结束者

A: 18~37周

B: 28~38周

C: 28~37周

D: 25~37周

答案：C

50.促进大脑对磷脂和氨基酸的利用，增加蛋白质合成，改善脑缺氧和脑损伤的是

A: 银杏叶提取物

B: 多奈哌齐

C: 胞磷胆碱钠

D: 吡拉西坦

答案：D

51.对于万古霉素，描述错误的是

A: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

B: 快速静滴会出现红人综合征

C: 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用

D: 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

答案：C

52.需停5周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

A: 文拉法辛

B: 吗氯贝胺

C: 吡拉西坦

D: 氟西汀

答案：D

53.下列药物中不用于抗心律失常的是

A: 美西律

B: 胺碘酮

C: 比索洛尔

D: 单硝酸异山梨酯

答案：D

54.早产儿、新生儿出血宜选用()

A: 尿激酶

B: 维生素K

C: 叶酸

D: 肝素

答案：B

55.特比萘芬属于

A: 丙烯胺类

B: 唑类

C: 吗啉类

D: 抗生素类

答案：A

56.（2021年真题）抗原性及变态反应风险最高的溶栓药物是（）

A: 尿激酶

B: 重组链激酶

C: 替奈普酶

D: 瑞替普酶

答案：B

57.属于还原酶抑制剂的是()

A: 他达拉非
B: 度他雄胺
C: 西地那非
D: 坦洛新
答案：B

58.布美他尼的利尿作用部位在()
A: 集合管
B: 远曲小管初段
C: 髓袢升支粗段
D: 肾小球
答案：C

59.左旋多巴除了用于抗震颤麻痹外，还可用于
A: 肝性脑病
B: 脑膜炎后遗症
C: 心血管疾病
D: 乙型肝炎
答案：A

60.抗菌谱广，对厌氧菌也有强大抗菌活性，对 β-内酰胺酶高度稳定的药物是()
A: 氨曲南
B: 克拉维酸
C: 他唑巴坦
D: 美罗培南
答案：D

61.以下关于非磺酰脲类促胰岛素分泌药使用的叙述，错误的是

A：常见不良反应是低血糖和体重增加

B：对磺酰脲类敏感性差或效果不佳者可换此类药物，也可与磺酰脲类联合应用

C：可以作为初始治疗，用于不能耐受二甲双胍或磺酰脲类药物或存在使用这些药物的禁忌证患者，尤其是有低血糖风险的慢性肾脏病患者

D：瑞格列奈无肾脏功能不全者使用的禁忌，在体内无蓄积，适用于老年和糖尿病肾病者

答案：B

62.多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

A：增加心脏毒性

B：增加肝毒性

C：易产生沉淀

D：导致坏死性结肠炎

答案：C

63.甲羟孕酮口服用于功能性闭经的用法用量是

A：于月经后半周期(撤药性出血的第16～25日)开始口服，一次10mg，一日1次，连用10～14日，酌情应用3～6个周期

B：口服，一次10～20mg，每4～8小时一次，连用2～3日；血止后每隔3日递减1/3剂量，直至维持量每日100mg，连续用药至血止后21日停药

C：口服一日4～8mg，连服5～10日

D：一日30mg，连服6个月

答案：C

64.青霉素G

A：对支原体有效

B：对G+、G-球菌及螺旋体等有效

C：对G+、G-球菌，特别是对G-杆菌有效

D：抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

答案：B

65.抑制心肌收缩力、延长APD及ERP的药物是()

A：奎尼丁

B：美西律

C：苯妥英钠

D：利多卡因

答案：A

66.奎宁或氯喹日剂量超过1g或连续长时间应用，可见耳鸣，头痛、视力与听力减退等，停药后常可恢复，临床称谓

A：神经毒性反应

B：赫氏反应

C：双硫仑样反应

D：金鸡纳反应

答案：D

67.下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

A：酮康唑为咪唑类抗真菌药

B：环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药

C：奈替芬是丙烯胺类抗真菌药

D：阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药

答案：D

68.稳定型和不稳定型心绞痛都可选用

A：普萘洛尔

B：维拉帕米

C：硝苯地平

D：地尔硫

答案：B

69.（2018年真题）关于钙通道阻滞剂（CCB类）药物的说法，错误的是（）

A：对既往有脑卒中病史的老年高血压患者,优先选择CCB类降压药

B：红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度

C：CCB类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效

D：CCB类主要扩张小动脉,对小静脉和毛细血管作用较小,可导致下肢或脚踝水肿

答案：C

70.（2016年真题）长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是

A：苯巴比妥

B：地西泮

C：佐匹克隆

D：唑吡坦

答案：A

71.患儿，男，7岁。长期偏食。近1个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下4cm，脾肋下1cm。血常规：Hb70g／L，RBC3.0×1012／L，Ret2.0%，WBC、Plt均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

A: 血小板数量

B: 网织红细胞计数

C: 血红蛋白测定

D: 血清铁蛋白

答案：A

72.下述属于外周性多巴胺D2受体阻断剂的是

A: 甲氧氯普胺

B: 西沙必利

C: 莫沙必利

D: 多潘立酮

答案：D

73.噻嗪类利尿药中，属于水溶性的药物是()

A: 苄噻嗪

B: 氢氯噻嗪

C: 氯噻嗪

D: 氢氟噻嗪

答案：C

74.监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是()。

A: 尿淀粉酶

B: 碱性磷酸酶

C: 肌酸激酶

D: 乳酸脱氢酶

答案：C

75.纳洛酮治疗的疾病或症状有

A：惊厥

B：剧烈疼痛

C：失眠

D：阿片中毒

答案：D

76.患者，女，55岁，临床诊断为2型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

A：若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水

B：服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

C：可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀

D：服药过程中适当补充维生素B

答案：A

77.高血压合并脑血管功能不全不宜选用

A：胍乙啶

B：普萘洛尔

C：肼屈嗪

D：氢氯噻嗪

答案：A

78.属于超长效胰岛素/胰岛素类似物的是

A：门冬胰岛素

B：甘精胰岛素

C：普通胰岛素

D：精蛋白锌胰岛素

答案：B

79.治疗青光眼宜选用

A：复方托吡卡胺滴眼液

B：碘苷滴眼液

C：毛果芸香碱滴眼液

D：左氧氟沙星滴眼液

答案：C

80.下列药物中，与甲氨蝶呤长期大量合用，可引起膀胱移行细胞癌的是

A：抗生素

B：维生素类

C：抗病毒药物

D：糖皮质激素

答案：D

81.常引起体位性低血压的是

A：哌唑嗪

B：十一酸睾酮

C：普适泰

D：非那雄胺

答案：A

82.成人使用乙胺嘧啶用于疟疾的预防，服用的时间是

A：应于进入疫区前1～2周开始服用，一般宜服至离开疫区后6～8周

B：应于进入疫区前6～8天开始服用，一般宜服至离开疫区后6～8天

C：应于进入疫区前1～2天开始服用，一般宜服至离开疫区后1～2天

D：应于进入疫区前1～2周开始服用，一般宜服至离开疫区后1～2周

答案：A

83.布地奈德的作用特点是

A：适用于轻度持续型（2级以上）哮喘的长期治疗

B：不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于18个月的婴幼儿和大多数儿童有效

C：10μg/ml为有效治疗浓度，15-20μg/ml以上会出现毒性毒性反应

D：舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿

答案：A

84.妊娠糖尿病患者，为控制血糖，主张使用

A：胰岛素

B：瑞格列奈

C：格列苯脲

D：二甲双胍

答案：A

85.关于NSAIDS类药物所致不良反应的说法，正确的是()

A：选择性COX-2抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性NSAIDS类药物

B：NSAIDs类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见

C：非选择性NSAIDS类药物导致的心血管风险高于选择性COX-2抑制剂

D：非选择性NSAIDS类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险

答案：D

86.可用于防治泌尿系统结石的是

A：氯化钙

B：氯化钠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/116145014054011030