

2024 年广东省《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库（精练）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. (透析患者常用药物)服用何种药物可以减轻透析患者出现骨和关节的疼痛或头痛

- A: 铁剂
- B: 乳果糖
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 阿法骨化醇

答案：C

2. 属于苯二氮革类药物的是

- A: 艾司唑仑
- B: 阿米替林
- C: 舍曲林
- D: 丁螺环酮

答案：A

3. 服用西咪替丁等 H₂ 受体阻断剂、地西泮等苯二氮革类药物应该禁用的是

- A: 食醋
- B: 浓茶
- C: 烟
- D: 酒

答案：C

4. 应贮存在阴凉处的药物是

- A: 重组人促红细胞生成素
- B: 头孢拉定
- C: 硫酸亚铁片
- D: 托烷司琼注射剂

答案：B

5. 硝酸甘油

- A: 血小板减少
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 中性粒细胞减少
- D: 血红蛋白量增多

答案：D

6. 下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法, 错误的是()

- A: 口服后 30 分钟内应保持立位或坐位
- B: 随餐服用, 并大量饮水, 可增加吸收、减少胃肠道刺激
- C: 食管炎为典型不良反应
- D: 应避免同时使用两种双膦酸盐

答案：B

7. 少数患者在口服时可出现前庭神经紊乱(如头晕、眩晕)的痤疮治疗药是

- A: 过氧化苯甲酰
- B: 维 A 酸
- C: 米诺环素
- D: 口服短效避孕药

答案：C

8. 患者，男性，45 岁，无痛性肉眼血尿 6 个月来诊，患者于 6 个月前无意中发现排尿全程尿色发深，呈酱油色，无腰痛，尿频，排尿困难，排尿后尿不尽，结合尿常规检查，诊断为良性前列腺增生。

- A: 非那雄胺
- B: 奥昔布宁
- C: 坦索罗辛
- D: 特拉唑嗪

答案：A

9. 在氯化钠注射液中可形成胶状不溶物是

- A: 红霉素
- B: 氯化钾
- C: 苯妥英钠
- D: 青霉素

答案：A

10. 可以迅速缓解哮喘症状，起效快的药品是

- A: 非甾体抗炎药
- B: 短效 β_2 -受体激动剂
- C: 吸入型糖皮质激素
- D: β -受体阻断剂

答案：B

11. (2017 年真题) 高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是 ()

- A: 维 A 酸片

B: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

C: 非洛地平片

D: 左旋多巴片

答案: D

12. (2019 年真题) 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1，主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体：咽红，听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

A: 胃溃疡

B: 心绞痛

C: 胃食管反流病

D: 支气管哮喘

答案: C

13. 目前推荐治疗失眠的一线药物为 ()

A: 多塞平

B: 硝西泮

C: 佐匹克隆

D: 艾司唑仑

答案: C

14. 10 岁以上的儿童 2 型糖尿病患者适宜选择的降糖药是

A: 格列美脲

B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: 瑞格列奈

答案：C

15. 下列药物中，有效治疗浓度范围与中毒浓度范围相接近的是

- A: 地高辛
- B: 四环素
- C: 氯噻嗪
- D: 阿托品

答案：A

16. 患者，女，30 岁，妊娠 7 个月，既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物多，有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状，疗效较好，今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是（）

- A: 利巴韦林滴眼液
- B: 硫酸锌滴眼液
- C: 磺胺醋酰钠滴眼液
- D: 酞丁安滴眼液

答案：B

17. 属于新型抗凝药物的是

- A: 胺碘酮
- B: 氯吡格雷
- C: 达比加群酯
- D: 美托洛尔

答案：C

18. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

- A: 伪麻黄碱
- B: 右美沙芬
- C: 愈创木酚甘油醚
- D: 苯海拉明

答案：D

19. 冠心病患者如不能耐受 ACEI，可考虑给予

- A: AR
- B: β 受体激动剂
- C: 地高辛
- D: α 受体拮抗剂

答案：A

20. 遭遇蛇类咬伤，最应首先采取的应急措施是

- A: 就地取材在伤口的远心端捆扎
- B: 用布带等在伤口的近心端 5Cm 处捆住
- C: 就地取材将伤口捆扎
- D: 用绳索等在伤口的近心端捆扎

答案：B

21. 患者，男，60 岁。因面部出现慢性湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是

- A: 他克莫司软膏
- B: 特比萘芬乳膏
- C: 10% 樟脑软膏
- D: 利巴韦林软膏

答案：A

22. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 维生素 C 片
- B: 葡萄糖酸锌口服液
- C: 头孢克洛干混悬剂
- D: 感冒清热冲剂

答案：C

23. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

- A: 坦索罗辛
- B: 索利那新
- C: 米多君
- D: 非那雄胺

答案：D

24. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物药动学的机制是

- A: 抑制 CYP3A4
- B: 抑制 CYP2C9
- C: 抑制 CYP1A2
- D: 诱导 CYP3A4

答案：A

25. 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()

- A: 西地碘片
- B: 乳酶生片

C: 硫普罗宁片

D: 双歧三联活菌胶囊

答案: D

26. 妊娠 5 个月后用何种抗菌药物会使婴儿牙釉质发育不全、牙齿黄染

A: 四环素类

B: 大环内酯类

C: 青霉素

D: 氟喹诺酮类

答案: A

27. 因可抑制前列腺内双氢睾酮水平而用于前列腺增生症治疗的药物是

A: 非那雄胺

B: 前列康

C: 黄酮哌酯

D: 特拉唑嗪

答案: A

28. 可诊断男性高尿酸血症的是

A: 血尿酸为 $200 \mu\text{mol/L}$

B: 血尿酸为 $270 \mu\text{mol/L}$

C: 血尿酸为 $420 \mu\text{mol/L}$

D: 血尿酸为 $380 \mu\text{mol/L}$

答案: C

29. (2018 年真题) 患者, 男, 57 岁, 化验结果: TC 4.6mmol/L (参考值 $<5.2\text{mmol/L}$), TG 1.0mmol/L (参考值 $0.56\text{---}1.70\text{mmol/L}$) 尿酸 $508\mu\text{mol/L}$ (参考值 $<420\mu\text{mol/L}$), 应首选的调脂药物为 ()

- A: 依折麦布
- B: 非诺贝特
- C: 考来烯胺
- D: 烟酸

答案：B

30. 治疗真菌性阴道炎首选的非处方药是

- A: 硝酸咪康唑栓
- B: 甲硝唑栓
- C: 聚甲酚磺醛栓
- D: 克霉唑栓

答案：A

31. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据是

- A: 尿沉渣结晶
- B: 尿沉渣管型
- C: 尿沉渣磷酸盐
- D: 尿沉渣白细胞

答案：B

32. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

- A: 扩容
- B: 降压
- C: 脱水
- D: 止血

答案：C

33. 用前摇匀，尽量将痰液咳出、口内的食物咽下，含激素类制剂用后以温水漱口

- A: 泡腾片
- B: 阴道栓剂
- C: 膜剂
- D: 气雾剂

答案：D

34. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法正确的是（）

- A: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑
- B: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋
- C: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋
- D: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑

答案：B

35. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

- A: 1%氯化钠
- B: 3%过氧化氢
- C: 1%硫酸铜
- D: 1%硫酸镁

答案：D

36. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

- A: 氯吡格雷

B: 阿司匹林

C: 吲哚美辛

D: 萘普生

答案：A

37. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是

A: 处方点评

B: 处方审核

C: 药物信息服务

D: 参与健康教育

答案：C

38. 对混合型血脂异常，必须联用他汀类和贝特类，最佳的给药方案是

A: 早晨用他汀类，晚上用贝特类

B: 晚上联合服用他汀类和贝特类

C: 早晚联合服用他汀类和贝特类

D: 早晨用贝特类，晚上用他汀类

答案：D

39. 大剂量可导致 Q-T 间期延长的是

A: 莫沙必利

B: 多潘立酮

C: 甲氧氯普胺

D: 西沙必利

答案：D

40. 妥布霉素可导致

A: 不可逆性肾小管坏死

- B: 肾小球滤过率下降
- C: 结晶沉积
- D: 前列腺素合成障碍

答案：B

41. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 <7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 <5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 50 μmol / L(正常参考范围 45~84 μmol / L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 依那普利
- B: 复方利血平
- C: 氢氯噻嗪
- D: 特拉唑嗪

答案：A

42. 可能诱发心血管脑病、引起肝癌、肾癌的是

- A: 肽激素类
- B: 易制毒药品
- C: 蛋白同化制剂
- D: 精神刺激剂

答案：C

43. 患者，女，68 岁，因哮喘急性发作就医。医师处方：雾化吸入沙丁胺醇、异丙托溴铵、布地奈德混悬液，同时静脉注射氨茶碱、氢化可的松琥珀酸钠。患者用药后 3h 出现骨骼肌震颤。实验室检查：血钾 2.7mmol/L （正常参考范围 $3.5\sim 5.5\text{mmol/L}$ ）。引起患者不良反应的药物应该是

- A: 布地奈德
- B: 异丙托溴铵
- C: 氨茶碱
- D: 沙丁胺醇

答案：D

44. 可作为轻度痤疮治疗单独一线用药的是

- A: 夫西地酸乳膏
- B: 过氧化苯甲酰凝胶
- C: 维 A 酸凝胶
- D: 水杨酸软膏

答案：C

45. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo 、瑞格列奈片 1mg tidpo 、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 瑞格列奈片应于餐前服用
- B: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等
- C: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用
- D: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

答案：C

46. 用于消渴的中成药中可能添加的化学药成分是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 苯巴比妥

B: 格列本脲

C: 吲哚美辛

D: 阿卡波糖

答案: B

47. 耳蜗神经损伤及耳毒性

A: 庆大霉素

B: 米诺环素

C: 氯霉素

D: 阿奇霉素

答案: A

48. 针对儿童用药的一般原则，下列叙述不正确的是()。

A: 要根据儿童特点选择适宜的给药方案

B: 要按规定用量服药

C: 明确诊断，严格掌握适应证

D: 根据儿童的不同阶段严格掌握用药剂量

答案: B

49. 一般情况下，容易透过透析膜被清除的药物是

A: 低水溶性的药物

B: 分布容积小的药物

C: 血浆蛋白结合率高的药物

D: 分子量大于 500 的药物

答案: B

50. 患者，女，57 岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足 5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西洋片： $5\text{mg} \times 20 / 5\text{mgqd}$

- A: 坚持每晚服用 1 片
- B: 每周给药 2~3 次
- C: 服药后第二天上班禁止开车
- D: 要防止晨起跌倒

答案：A

51. 新生儿体内水溶性药物排出较慢、容易中毒，其主要机制是患儿总体液量占体重的

- A: 65%~70%
- B: 70%~75%
- C: 75%~80%
- D: 80%~85%

答案：C

52. 地西洋中毒的解救药物是()

- A: 氟马西尼
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 阿托品+碘解磷定
- D: 硫代硫酸钠

答案：A

53. 血红蛋白检查结果低于正常值即提示贫血。下列检测值可提示“极重度贫血”的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: <30g / L

B: >90g / L

C: 30~60g/L

D: 60~90g/L

答案：A

54. 血管紧张素转化酶抑制剂

A: 阿利吉仑

B: 阿米洛利

C: 雷米普利

D: 依普利酮

答案：C

55. 维持心脏、神经及消化系统正常功能所必需，缺乏可出现脚气病的是

A: 维生素 B1

B: 维生素 A

C: 维生素 C

D: 维生素 D

答案：A

56. 隔日 1 次用药的外文规范缩写是

A: qh

B: qod

C: qd

D: qn

答案：B

57. 半衰期 150-200h，属于长效磺胺类药物是

A: 磺胺嘧啶

B: 磺胺甲噁唑

C: 替硝唑

D: 磺胺多辛

答案: D

58. 鼻腔黏膜上有丰富的血管、黏液腺的纤毛，鼻中隔前下部也有纤密的毛细血管网，当受到刺激、过敏、感染时，鼻黏膜血管迅速扩张和肿胀，出现鼻塞。其常见病因有：感冒、慢性单纯性鼻炎、慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎等。

A: 氯雷他定

B: 氯苯那敏

C: 伪麻黄碱

D: 泼尼松

答案: C

59. 杨某，女，19岁，淋雨受凉后咳嗽、咯脓性痰并伴有胸痛，体温39℃，听诊肺部有湿啰音。WBC $12 \times 10^9 / L$ 。该患者对青霉素过敏。

A: 支气管炎

B: 肺结核

C: 社区获得性肺炎

D: 哮喘

答案: C

60. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

A: 奥美拉唑

B: 克拉维酸钾

C: 苯丝肼

D: 叶酸

答案: A

61. 应提示患者服用后舌苔、大便可呈灰褐色的是

- A: 米索前列醇
- B: 氟西汀
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 胰岛素注射剂

答案：C

62. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdp0 等药物治疗。

- A: 停用阿托伐他汀钙片
- B: 停用瑞格列奈片
- C: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- D: 停用二甲双胍肠溶片

答案：A

63. 减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻

- A: 度他雄胺
- B: 特拉唑嗪
- C: 哌唑嗪
- D: 索利那新

答案：B

64. 在审核处方用药适宜性时，应特别注意是否有潜在临床意义的相互作用和配伍禁忌。下列联用药物中有潜在不良相互作用的是

- A: 甲氧氯普胺和氯丙嗪
- B: 苄丝肼和左旋多巴

C: 阿莫西林和克拉维酸钾

D: 头孢哌酮和舒巴坦

答案: A

65. 原发性蛛网膜下腔出血的最常见的病因是

A: 高血压

B: 颅内动脉瘤

C: 脑血管畸形

D: 动脉硬化

答案: B

66. 滴虫性阴道炎宜选用

A: 甲硝唑

B: 庆大霉素

C: 制霉菌素

D: 林可霉素

答案: A

67. 溶栓治疗

A: 阿替普酶

B: 巴曲酶

C: 低分子肝素

D: 阿司匹林

答案: A

68. 饮食对粪外观的影响, 肉食

A: 酱色

B: 暗绿色

C: 黑褐色

D: 红色

答案: C

69. 选择的前提是

A: 药物治疗的规范性

B: 药物治疗的方便性

C: 药物治疗的有效性

D: 药物治疗的安全性

答案: D

70. 以下所列药品中，进餐时服用可减少脂肪吸收的药品是

A: 阿昔莫司

B: 苯扎贝特

C: 吉非贝齐

D: 奥利司他（减肥药）

答案: D

71. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件，具有

A: 技术性、有效性和经济性

B: 经济性、法律性和合理性

C: 法律性、技术性和经济性

D: 技术性、经济性和合法性

答案: C

72. 药物相互作用有发生在体内的药动学、药效学方面的作用；亦有发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 红霉素
- D: 伊曲康唑

答案：A

73. 提示：可能引起咳嗽，是针对

- A: 氟西汀
- B: 氯苯那敏
- C: 铋制剂
- D: 卡托普利

答案：D

74. （单纯疱疹病毒的分型）主要在幼年感染是（）

- A: HSV-I 型
- B: HSV-II 型
- C: HSV-IV 型
- D: HSV-III 型

答案：A

75. 影响维生素 B12 吸收的药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 二甲双胍
- C: 苯妥英钠
- D: 苯巴比妥

答案：B

76. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌 (LES) 压力 $<6\text{mmHg}$ ，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 戒烟酒
- B: 控制体重
- C: 餐中多饮水
- D: 避免高脂饮食

答案：C

77. 能够影响叶酸利用障碍的药物有

- A: 甲氨蝶呤
- B: 秋水仙碱
- C: 苯乙双胍
- D: 二甲双胍

答案：A

78. 可引起血肌酐增高的是

- A: 急性胰腺炎
- B: 胃溃疡
- C: 严重肝病
- D: 肾衰竭

答案：D

79. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 克拉霉素 500mgbid+左氧氟沙星 200mgbid+甲硝唑 400mgqid+艾司奥美拉唑 20mgbid，疗程 2 周

B: 左氧氟沙星 500mgqd+呋喃唑酮 100mgbid+四环素 500mgqid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

C: 阿莫西林 1000mgbid+克拉霉素 500mgbid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

D: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

答案：D

80. （2019 年真题）下列药物中，使用前无需皮试的是

A: 抗狂犬病血清注射剂

B: 苄星青霉素注射剂

C: 抑肽酶注射剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 紫杉醇注射剂

答案: D

81. 可引起血小板减少症的抗肿瘤药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 阿洛司琼
- C: 阿昔洛韦
- D: 利巴韦林

答案：A

82. 饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

- A: 血压升高
- B: 低血糖反应
- C: 血糖升高
- D: 过敏反应

答案：B

83. 在流行期间多见于小儿及老年体弱者

- A: 胃肠型
- B: 肺炎型
- C: 病毒型
- D: 神经型

答案：B

84. 患者，男，60岁，呈典型的"面具脸"，"慌张步态"及"小字症"表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是()

- A: 司来吉兰
- B: 多奈哌齐

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 普拉克索

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/116221235101011030>