专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2023-24年山东省莱阳市《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题真题汇编

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.高钠血症是指

A：血钠＞140mmol/L

B：血钠＞145mmol/L

C：血钠＞135mmol/L

D：血钠＞130mmol/L

答案：B

2.可能导致牙龈增生的药物是

A：普伐他汀

B：拉西地平

C：依诺肝素

D：普萘洛尔

答案：B

3.抗心绞痛的首选联合治疗方案是()

A：维拉帕米+氢氯噻嗪

B：短效硝酸酯类+螺内酯

C：维拉帕米+普萘洛尔

D：长效硝酸酯类+普萘洛尔

答案：D

4.对丙咪嗪过敏的患者禁用

A: 丙戊酸钠

B: 卡马西平

C: 苯妥英钠

D: 氨已烯酸

答案：B

5.呋喃妥因主要用于

A: 呼吸道感染

B: 全身感染

C: 消化道感染

D: 尿路感染

答案：D

6.氨基苷类通过下列哪种屏障比较容易

A: 血脑屏障

B: 血睾屏障

C: 黏液屏障

D: 胎盘屏障

答案：D

7.适宜餐前整片(粒)吞服，不可咀嚼或压碎的抑酸剂是()。

A: 泮托拉唑

B: 雷尼替丁

C: 乳酸菌素

D: 前列地尔

答案：A

8.（2015年真题）对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是（）。

A: 泼尼松龙

B: 左氧氟沙星

C: 多索茶碱

D: 羧甲司坦

答案：D

9.属于雌激素类退乳药的是()

A: 睾酮

B: 他莫昔芬

C: 己烯雌酚

D: 甲羟孕酮

答案：C

10.氟胞嘧啶为

A: 抗滴虫病药

B: 抗血吸虫病药

C: 抗真菌药

D: 抗病毒药

答案：C

11.袢利尿药主要作用于髓袢升支粗段，利尿作用强，其代表药物是()

A: 托拉塞米

B: 布美他尼

C: 呋塞米

D: 依他尼酸

答案：C

12.应用本品时可能发生耐药菌的过度繁殖的药物是()

A：多西环素

B：青霉素

C：四环素

D：氯霉素

答案：A

13.以下通过增加组织与肝脏对胰岛素的敏感性而降糖的是()

A：二甲双胍

B：利拉鲁肽

C：吡格列酮

D：瑞格列奈

答案：C

14.与长春新碱合用可增强第Ⅷ对脑神经障碍

A：替尼泊苷

B：铂类

C：非格司亭

D：异烟肼

答案：B

15.酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是()

A：血压升高

B：骨髓抑制

C：痤疮样皮珍

D：心肌损伤

答案：C

16.下述药物中用于缓解鼻黏膜充血肿胀引起的鼻塞的是

A：盐酸麻黄碱滴鼻液

B：硼酸

C：利巴韦林滴鼻液

D：链霉素溶剂

答案：A

17.主要结构与雄激素颇为相似，但雄性化作用甚弱，蛋白同化作用很强，临床上可作为升白药物使用的是

A：鲨肝醇

B：维生素B4

C：小檗胺

D：丙酸诺龙

答案：D

18.作用机制是竞争雌激素受体的是

A：枸橼酸他莫昔芬

B：巯嘌呤

C：紫杉醇

D：吉非替尼

答案：A

19.氯霉素的抗菌作用机制()

A：影响胞浆膜通透性

B：与核糖体30S亚基结合，抑制蛋白质的合成

C：与核糖体50S亚基结合，抑制移位酶的活性

D：作用于细菌70S核糖体的50S亚基，抑制转肽酶

答案：D

20.（2020年真题）消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

A: 吲哚美辛

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 塞来昔布

答案：D

21.患者，女，72岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

A: 氯吡格雷

B: 奥美拉唑

C: 双氯芬酸

D: 华法林

答案：D

22.促进钙剂吸收可选用

A: 阿法骨化醇

B: 葡萄糖酸钙

C: 依降钙素

D: 阿仑膦酸钠

答案：A

23.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)高检出率的医疗机构,进行人工瓣膜置换术时,为预防MRSA感染,可选用()

A: 青霉素G

B: 头孢唑林

C: 万古霉素

D: 氨曲南

答案：C

24.皮肤寄生虫感染治疗药的禁忌证，叙述错误的是()

A: 有癫痫病史患者禁用苯甲酸苄酯

B: 中枢神经系统器质性病变者禁用苯甲酸苄酯

C: 妊娠及哺乳期妇女禁用林旦

D: 18岁以下儿童禁用林旦

答案：D

25.作用于对青霉素敏感的革兰阳性菌以及部分革兰阴性杆菌的药物是()

A: 氨曲南

B: 阿莫西林

C: 克拉维酸

D: 亚胺培南

答案：B

26.以下关于硫酸阿托品眼用凝胶的叙述，不正确的是

A: 为散瞳药

B: 用于虹膜睫状体炎

C: 青光眼禁用

D: 前列腺肥大病人慎用

答案：D

27.属于超长效胰岛素/胰岛素类似物的是

A: 普通胰岛素
B: 精蛋白锌胰岛素
C: 甘精胰岛素
D: 门冬胰岛素
答案：C

28.大剂量碘剂
A: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
B: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状
C: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
D: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成
答案：A

29.患者，女，67岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前12小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第7天出院。
A: 氯吡格雷
B: 替格瑞洛
C: 双嘧达莫
D: 利伐沙班
答案：D

30.抗心绞痛药物的主要目的是()
A: 降低心肌耗氧量
B: 扩张冠状动脉
C: 缩小心室容积
D: 减慢心率
答案：A

31.可增高甲氨蝶呤血浆浓度的药物不包括

A：碳酸氢钠

B：水杨酸类

C：氯霉素

D：磺胺类

答案：A

32.糖皮质激素的药理作用不包括

A：抗炎

B：免疫抑制

C：抗休克

D：抗病毒

答案：D

33.局麻药吸收过量所引起的症状，错误的是

A：心缩力增强

B：先兴奋，后抑制

C：血压下降

D：心律失常

答案：A

34.可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

A：他莫昔芬

B：红霉素

C：氯丙嗪

D：维生素C

答案：A

35.大剂量糖皮质激素冲击疗法用于()

A: 湿疹

B: 抑制器官移植急性排斥危象

C: 肾病综合征

D: 变态反应性疾病

答案：B

36.属于保钾利尿药的是

A: 呋塞米

B: 氢氯噻嗪

C: 甘露醇

D: 螺内酯

答案：D

37.下述利尿药中，可导致血钾升高的是()

A: 乙酰唑胺

B: 氨苯蝶啶

C: 呋塞米

D: 氢氯噻嗪

答案：B

38.仅用于皮下注射，激动胰高糖素样多肽一1受体降糖()

A: 二甲双胍

B: 格列本脲

C: 艾塞那肽

D: 阿卡波糖

答案：C

39.（2016年真题）鼻减充血药所致的典型不良反应是

A：血管舒张

B：心率减慢

C：共济失调

D：血压升高

答案：D

40.孟鲁司特的作用机制是

A：阻断M受体

B：阻断 α 受体

C：阻断白三烯受体

D：抑制磷酸二酯酶

答案：C

41.癫痫持续状态选用

A：苯巴比妥

B：苯妥英钠

C：乙琥胺

D：丙戊酸钠

答案：B

42.使用氨基已酸可导致

A：肺动脉高压

B：高胆红素血症

C：支气管痉挛

D：血栓形成

答案：D

43.硫脲类药物用于甲状腺功能亢进内科治疗的正确给药方式是

A：开始给小剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

B：开始给大剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

C：开始给治疗量，基础代谢正常后继续给3～6个月停药

D：开始给小剂量，以后逐渐加大剂量，直至基础代谢率正常，改用维持量

答案：B

44.急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是

A：利多卡因

B：地高辛

C：苯妥英钠

D：胺碘酮

答案：A

45.与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是

A：非那雄胺

B：硝酸甘油

C：甲睾酮

D：丙酸睾酮

答案：B

46.与卡比马唑合用应谨慎的是

A：甲状腺素

B：放射性碘

C：丙硫氧嘧啶

D: 糖皮质激素

答案：B

47.胃肠道不良反应较轻的是

A: 硫酸亚铁糖浆

B: 琥珀酸亚铁胶囊

C: 硫酸亚铁缓释片

D: 硫酸亚铁片

答案：C

48.与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是()

A: 三磷酸腺苷

B: 二磷酸果糖

C: 碳酸钙

D: 葡萄糖

答案：D

49.可用于慢性支气管炎引起的痰液稠厚、呼吸困难的是

A: 右美沙芬

B: 乙酰半胱氨酸

C: 羧甲司坦

D: 氨溴索

答案：C

50.治疗膀胱过度活动症宜选用

A: 尼莫地平

B: 托特罗定

C: 利血平

D：坦洛新

答案：B

51.巴比妥类药物急性中毒致死的直接原因是

A：高钾血症

B：深度呼吸抑制

C：肝脏损害

D：胃、十二指肠溃疡

答案：B

52.（2019年真题）同时抑制5-HT及去甲肾上腺素（NE）再摄取而起到抗抑郁作用的药物是（）

A：帕罗西汀

B：马普替林

C：吗氯贝胺

D：度洛西汀

答案：D

53.属于广谱抗心律失常药物

A：地高辛

B：利多卡因

C：苯妥英钠

D：胺碘酮

答案：D

54.复方地芬诺酯是

A：吸附剂

B：抗动力药

C：微生态制剂

D：抗分泌药

答案：B

55.属于长效糖皮质激素的药物是

A：醋酸可的松

B：地塞米松

C：曲安西龙

D：氢化可的松

答案：B

56.甲状腺功能亢进症的内科治疗宜选用()

A：吡格列酮

B：甲状腺素

C：小剂量碘剂

D：甲巯咪唑

答案：D

57.甲羟孕酮口服用于功能失调性子宫出血(功血)止血的用法用量是

A：于月经后半周期(撤药性出血的第16～25日)开始口服，一次10mg，一日1次，连用10～14日，酌情应用3～6个周期

B：口服一日4～8mg，连服5～10日

C：一日30mg，连服6个月

D：口服，一次10～20mg，每4～8小时一次，连用2～3日；血止后每隔3日递减1/3剂量，直至维持量每日100mg，连续用药至血止后21日停药

答案：D

58.关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的错误的是

A：面部、阴部和皱褶部分的湿疹，需长期使用强效制剂

B：未控制的细菌或真菌感染不宜使用

C：若继发细菌或真菌感染，可与抗菌药或抗真菌药联合使用

D：可用于过敏性皮炎的治疗

答案：A

59.（2015年真题）阿片类镇痛药与阿托品合用，可抑制胃肠蠕动，导致的不良反应是（）。

A：低血压

B：胆绞痛

C：躁狂

D：便秘

答案：D

60.应用强心苷或停用后7日内禁用

A：氯化钙

B：枸橼酸钾

C：氯化钠

D：氯化钾

答案：A

61.单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

A：氯丙嗪

B：甲氧氯普胺

C：帕洛诺司琼

D：劳拉西泮

答案：D

62.（2018年真题）对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是（）

A：乙酰唑胺

B：依他尼酸

C：依托塞米

D：布美他尼

答案：B

63.()与利福平合用时，在用利福平前和疗程中不需调整剂量

A：糖皮质激素

B：氨茶碱

C：氯霉素

D：地高辛

答案：D

64.ACEI与其联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用的是()

A：噻嗪类利尿药

B：留钾利尿药

C：人促红素

D：β受体阻断药

答案：C

65.抗阿米巴原虫药的药物是()。

A：甲硝唑

B：伯氨喹

C：氯喹

D: 奎宁

答案：A

66.具有心脏毒性的抗肿瘤药物

A: 长春新碱

B: 博来霉素

C: 紫杉醇

D: 柔红霉素

答案：D

67.易致血糖异常的药物是

A: 加替沙星

B: 青霉素

C: 红霉素

D: 氯霉素

答案：A

68.抑制绦虫细胞内线粒体的氧化磷酸化过程，高浓度时可抑制虫体呼吸并阻断对葡萄糖的摄取，从而使之发生变质的是

A: 三苯双脒

B: 伯氨喹

C: 葡萄糖酸锑钠

D: 氯硝柳胺

答案：D

69.（2017年真题）眼部病毒感染宜选用（）

A: 氯霉素滴眼剂

B: 托吡卡胺滴眼剂

C：碘苷滴眼剂

D：拉坦前列素滴眼剂

答案：C

70.患者，男，62岁。高血压病史10年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压162/80mmHg，心率72次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙D。

A：氨基葡萄糖

B：辛伐他汀

C：碳酸钙D

D：双氯芬酸

答案：D

71.用药期间可引起眼泪、尿、粪、痰等呈橘红色的药物是

A：异烟肼

B：链霉素

C：乙胺丁醇

D：利福平

答案：D

72.（2018年真题）属于胆固醇吸收抑制剂的调节血脂药是（）

A：依折麦布

B：烟酸

C：非诺贝特

D：辛伐他汀

答案：A

73.作用机制是抗代谢的是

A：紫杉醇

B：枸橼酸他莫昔芬

C：吉非替尼

D：巯嘌呤

答案：D

74.肝素的抗凝作用特点

A：仅在体内有效

B：必须有维生素K辅助

C：仅在体外有效

D：体内、体外均有效

答案：D

75.小剂量孕激素用于

A：绝经期综合征

B：回奶

C：再生障碍性贫血

D：痛经

答案：D

76.疗效高，生效快，主要用于

A：乙胺嘧啶

B：氯喹

C：甲氟喹

D：伯氨喹

答案：B

77.（2021年真题）患者，女，70岁，BMI21kg/m^2，45岁时绝经，10年前开始，经常出现腰背部疼痛，活动后加重，但未就诊，平日外出活动较少，近5年身高降低，驼背明显。10天前患者不慎摔倒，上肢活动受限、疼痛，就诊后检查结果:血钙1．97mmol/L,血磷1．7mmol／L，右上肢X光检查提示:右桡骨远端骨折。骨密度检查结果:T值（-2．9）。

A: 秋水仙碱

B: 地塞米松

C: 对乙酰氨基酚

D: 双醋瑞因

答案：C

78.与多柔比星合用或配伍可增加肝毒性的药物是

A: 利福平

B: 阿糖胞苷

C: β 受体阻断剂

D: 甲氨蝶呤

答案：A

79.不可用于治疗白细胞减少的药物是

A: 利可君

B: 腺嘌呤

C: 糖皮质激素

D: 利伐沙班

答案：D

80.关于地西泮的叙述，错误的是

A: 在临床上可用于缓解炎症引起的反射性肌肉痉挛

B：抗癫痫作用强，可用于治疗癫痫小发作

C：抗焦虑作用时间长，是临床上常用的抗焦虑药之一

D：是一种长效镇静催眠药物

答案：B

81.使用环磷酰胺化疗，以下检查结果可能升高的是

A：血尿酸

B：血小板计数

C：白细胞计数

D：血红蛋白

答案：A

82.可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

A：利妥昔单抗

B：贝伐单抗

C：西妥昔单抗

D：英夫利昔单抗

答案：A

83.对多巴胺描述正确的是()

A：对洋地黄和利尿药无效的心功能不全，多巴胺也无效

B：是磷酸二酯酶抑制剂

C：可用于充血性心力衰竭等引起的休克综合征

D：对其他拟交感胺类药物高度敏感的患者应该使用多巴胺

答案：C

84.胺碘酮抗心律失常的作用机制是()

A：提高窦房结和普肯耶纤维的自律性

B: 阻滞心肌细胞的Na

C: 缩短心房和普肯耶纤维的动作电位时程、有效不应期

D: 加快普肯耶纤维和窦房结的传导速度

答案：B

85.具有缩小皮脂腺，抑制皮脂腺活性，减少皮脂分泌的药物()

A: 阿达帕林

B: 壬二酸

C: 维A酸

D: 异维A酸

答案：D

86.判断华法林维持量是否足够，需观察的时间是

A: 2～3日

B: 12～15日

C: 5～7日

D: 8～10日

答案：C

87.患者，男，62岁。高血压病史10年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压162/80mmHg，心率72次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙D。

A: 特拉唑嗪

B: 双氯芬酸

C: 氢氯噻嗪

D: 美托洛尔

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/117136156056010024