

视网膜脱离术后护理业务查房

目录


- 视网膜脱离术后护理概述
- 视网膜脱离手术过程
- 视网膜脱离术后护理要点
- 视网膜脱离术后并发症及处理
- 视网膜脱离术后复查与康复
- 视网膜脱离术后护理业务查房总结与展望

01

视网膜脱离术后护理概述



视网膜脱离的定义




- 视网膜脱离是指视网膜的神经上皮层与色素上皮层之间的分离，导致视力受损甚至失明。





视网膜脱离的原因



遗传因素




部分视网膜脱离病例与遗传因素有关，家族中有视网膜脱离病史的人患病风险较高。



眼部疾病



如高度近视、眼外伤、眼底病变等，均可导致视网膜脱离。




外部创伤



眼部受到外部冲击或钝器伤，也可能引起视网膜脱离。




视网膜脱离的后果




视力下降

视网膜脱离后，光线无法正常投射到视网膜上，导致视力下降或失明。



视野缺损

视网膜脱离会影响光线的接收，导致视野出现缺损或暗区。



眼球萎缩

长期未治疗的视网膜脱离，可能导致眼球萎缩，影响外观和功能。

02

视网膜脱离手术过程



手术前的准备

评估患者情况

对患者的病史、眼部状况、全身状况等进行全面评估，确定手术适应症和手术方案。



术前准备

告知患者手术注意事项，如术前禁止吸烟、停用某些药物等；进行手术区域的清洁和消毒，确保手术顺利进行。



术前检查

进行必要的术前检查，如视力检查、眼压测定、眼底检查、眼球运动检查等，以了解患者的眼部状况和手术风险。





手术过程

麻醉

根据患者的具体情况选择合适的麻醉方式，如局部麻醉或全身麻醉。



手术操作

根据患者的病情和手术方案，进行视网膜脱离复位、玻璃体切除、填充物植入等手术操作。



术中监测

在手术过程中持续监测患者的生命体征、眼压、眼球运动等指标，确保手术安全。





手术后处理

术后护理

定期进行眼部检查和护理，观察患者的恢复情况，及时处理并发症。




药物治疗

根据患者的具体情况，给予必要的药物治疗，如抗生素、抗炎药等。

康复训练

指导患者进行必要的康复训练，如眼球运动训练、视力训练等，促进术后恢复。



生活指导

告知患者术后注意事项，如避免剧烈运动、保持眼部卫生等，帮助患者养成良好的生活习惯。

03

视网膜脱离术后护理要点



眼部护理



眼部清洁

保持眼部清洁，防止感染。可用无菌棉签轻轻擦拭眼部分泌物，但避免用力擦拭或触及手术伤口。



眼药水使用

遵医嘱使用眼药水，每次使用前应核对药名和有效期，避免使用过期眼药水。



眼部不适处理

如出现眼部疼痛、异物感、流泪等症状，应及时告知医生，以便及时处理。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/11714102220006046>